

*O P E R E*  
**CHIRURGICHE**

---

**TOMO TERZO.**

f

# O P E R E CHIRURGICHE

D I

PIETRO PAOLO TANARON

*Dottore di Medicina, Professore di Chirurgia,  
e Chirurgo del primo Reggimento di S.M.I.  
in Toscana.*

T O M O T E R Z O

*Che contiene*

LA SECONDA PARTE DEL MANUALE  
D' OPERAZIONI DI CHIRURGIA

SECONDO IL METODO DE' PIU' CELEBRI PROFESSORI DI  
QUEST' ARTE . IL TUTTO SOSTENUTO , E PROVATO  
CON FATTI DI PRATICA , E CON OSSERVAZIONI AU-  
TENTICHE, ED INCONTRASTABILI; CON UNA SERIE DI  
OSSERVAZIONI MOLTO CURIOSI , E ISTRUTTIVE PER  
LA PRATICA DELLA MEDESIMA .

*Rivista, corretta, e considerabilmente accresciuta*


A cui si aggiungono due Trattati  
DEL SALASSO, E DELLE FASCIATURE.



IN LUCCA MDCCLXIV.

PER GIUSEPPE ROCCHI  
CON LICENZA DE' SUPERIORI.







# MANUALE D' OPERAZIONI

DI CHIRURGIA

PARTE SECONDA.



## CAPITOLO I.

*Dell' Operazione della Litotomia,  
o Cystotomia.*



A Litotomia è una Operazione di Chirurgia, per mezzo della quale si estraggono fuori della vescica le pietre, che ivi sono contenute. Questa è una delle più grandi, e delle più difficili della Chirurgia; ed IPPOCRATE la trovò sì pericolosa, che egli giurò di non farla mai più, ed alla sua imitazione, la maggior parte de' Chirurghi di oggi giorno ricusano di farla, lasciando eseguire questa operazione a coloro, che ne fanno la loro unica oc-

Tom. III.

A

ca

operazione, e che pe' loro studj particolari, possono rendersi abili .

Convien confessare, che la pietra nella vescica è un de' più formidabili mali , che sian usciti dal vaso di *Pandora* ; egli è un male di lunga durata , e rinnovasi il più delle volte , dopo esserne stato liberato una volta .

Molte sono le maniere di far quest' operazione , e ogn' una ha i suoi partitanti ; cioè , il piccolo apparato , il grand' apparato , l' apparato laterale , l' alto apparato , e il nuovo metodo del Sig. FOUBERT Chirurgo del Re di Francia alla sua Corte del Parlamento ec. Non staremo a descrivere il manuale di quest' ultimo metodo , perchè trovasi nell' Accademia Reale di Chirurgia Tom. 1. Part. 111. pag. 255.

Per far quest' operazione con perizia , e buon metodo , cinque circostanze han da osservarsi . La prima , di scegliere il tempo più favorevole , che suol essere la Primavera , o l' Autunno , quando la necessità permetta di differirla . La seconda , di disporre il malato co' rimedj generali . La terza , di fissare il metodo da tenersi nell' operazione fra tutti quelli sopra proposti . La quarta , di disporre l' apparecchio in qualunque de' metodi , che si farà fissato per operare . E la quinta , di situare il malato in una buona positura .

Prima di procedere all' operazione è di grandissima importanza di disporre il malato , con una , o due cavate di sangue , secondo le di lui forze , con dargli molti cristeri , e purgandolo due volte , se si stima bene : imperciocchè il buon esito dell' operazione suol ordinariamente dipendere dall' aver ben disposto il malato . Deve osservarsi ancora di non far l' operazione il giorno , in cui si è dato il purgante , e nemmeno il giorno seguente , per timore di non esser frastornati in tempo dell' operazione da qualche residuo del lassativo , che venisse ad uscir fuori in quel tempo . Si descriverà il manuale di ciascun metodo , secondo la loro anzianità .

*Del Piccolo Apparato , o  
Hypokysteo - romia .*

Questo metodo di estrarre le pietre dalla vescica è più antico di tutti gli altri . Egli è stato anche praticato , ma con poco successo , prima di *Ippocrate* , che viveva quattro secoli almeno avanti l'Era Cristiana , essendo in quel tempo imperfettissimo ; il che fece giurare all' istesso di non mai fare quest' operazione , e di lasciarla ( come si è già detto ) a quelli , che ne facessero la loro unica occupazione , affinchè co' loro studj , colle lor meditazioni , ed esperienze reiterate , potessero perfezionarla , e con tal mezzo renderla utile a' malati , che son forzati a sottoporvifi .

Secondo *CELSE* , *Ammonio* famoso Chirurgo di *Alessandria* , Professore di Chirurgia in Egitto , circa l' anno 3800. della creazione del Mondo , fu soprannominato *Litotomo* , cioè a dire *Tagliatore di pietre* , perchè fu il primo a tentare di rompere nella vescica le pietre , che per la loro grossezza non potevano uscire dalla piccola apertura , che costumavano fare in essa in quel tempo . Il suo metodo era di prendere la pietra con un uncino per impedirle di rientrare nella vescica ; e indi con un istrumento convenevole , che portava perpendicolarmente sulla pietra , la tagliava a più pezzi , badando di non offendere la vescica coll' istrumento , o colle scheggie della pietra .

*CELSE* , che viveva sotto il Regno di *Augusto* , e di *Tiberio* , un secolo in circa dopo *Ammonio* , perfezionò molto sì nella teoria , che nella pratica quest' operazione , e fu per questa ragione chiamata *Metodo di Celso* , conosciuta sotto il nome di *Incisione sopra la Pietra* . Ma dopo *GIO. DE ROMANIS* , ella è stata chiamata *Litotomia al Piccolo Apparato* , per distinguerla dal suo nuovo metodo , che a ragione del gran numero di istrumenti , che vi si impiegano , è nominato *Litotomia al grand' Apparato* .

Per far l' operazione al piccolo apparato , il malato sarà situato sulla sponda del letto ; come nell' apparato laterale , e la prima cosa che fa l' operatore è di

intignere l' indice , e il medio della man sinistra nell' olio , e di introdurli nell' ano più dentro che può ; indi porterà l' estremità delle dita finchè restando dietro alla pietra l' accostino talmente al perineo , che venga a farvi una prominenza . Allora l' operatore prende coll' altra mano il Litotomo fermato sopra il suo manico con una fasciuolina , e mettendo la punta , ed il taglio di quest' istrumento sulla parte superiore della detta prominenza , taglierà accanto alla rima del perineo tutto ciò che copre la pietra , e dopo averla scoperta lascerà il litotomo , e prenderà un istrumento a guisa di uncino , che fa passare dietro la parte superiore della pietra , per tirarla a se , e farla uscire : qualche volta ancora , fatta l' incisione , esce ella da se medesima senza altro .

Quest' operazione si costuma pel solito ne' ragazzi . L' apparecchio , e la cura sono i medesimi , che nell' apparato laterale , che descriveremo in appresso .

### *Del Grand' Apparato , o Urethro - tomia .*

Questo metodo fu inventato , e praticato in Roma l' anno 1520. da GIO. DE ROMANIS Medico di Cremona , e pubblicato l' anno 1524. dal suo discepolo *Marianus Sanctus Barletitanus* . Quest' operazione ha avute in diversi tempi , e fra differenti nazioni , delle varietà considerabili in certi punti , e particolarmente in quanto all' uso di certi istrumenti .

E' questa un' operazione , per mezzo della quale si leva la pietra dalla vescica , con un taglio , che si fa al lato della rima del perineo . Vien chiamata *Litotomia* , *al Grand' Appurato* , dal gran numero d' istrumenti , che vi son necessari ; cioè , un siringone di acciaio massiccio di una grande incurvatura , con un beccuccio lungo , e incavato sul lato convesso , come si vede molto bene rappresentato nel Trattato degl' Istrumenti di Chirurgia del Sig. de Carengeot Tom. 1. pag. 290. un gammaut dritto fermato sul manico per mezzo di una piccola fasciuolina , il quale alcuni chiamano *Litotomo* ; de' conduttori , maschio , e femmina , una guida , delle tanaglie dritte , e cur-

curve ; un altro istrumento chiamato *Bottone* ; e un piccolo uncino .

Tutti questi istrumenti messi in ordine sopra un piatto , si fa situare il malato , e si lega nella maniera medesima , che nell' apparato laterale , e con cinque astanti nell' istesso modo disposti .

L' operatore dopo aver introdotto il siringone nella vescica , e tenendolo ben volto verso la pelle del perineo , prende da uno degli astanti il *Litoromo* , mettendolo in bocca , in tanto che coll' indice della man destra va tastando il luogo , che corrisponde sulla convessità del siringone per trovarne l' incavatura . Allora prendendo il *gammaut* a guisa di una penna da scrivere , l' introduce leggiermente nell' incavatura del siringone , facendo l' incisione come si deve , e secondo tutte le circostanze che ella richiede ; allora l' operatore prende dall' astante il conduttore maschio bagnato prima nell' olio , come deono essere tutti gli istrumenti , che hanno da entrar nella vescica , nascondendo le branche di quest' istrumento nella palma della mano , e appoggiando il dito indice lungo il corpo dell' istrumento , l' introduce coll' ajuto del *gammaut* nell' incavatura del siringone , indi levando via il *gammaut* conduce quest' istrumento nella vescica ; quando ei riconosce di averlo introdotto , e ciò dall' orine tinte di sangue , che n' escono , ritira allora il siringone , e poi prendendo colla sinistra il *Conduttore Maschio* slarga il taglio , introducendo l' indice della man destra fino nella vescica . Fatta questa dilatazione , rivolta il *Conduttore Maschio* , ed introduce nella vescica il *Conduttore Femina* , guidandolo sulla prominenza del *Conduttore Maschio* . Quando questi sono nella vescica , di maniera che tenendosene le branche , formino queste una croce nella mano fra l' indice , e il medio della sinistra , e tenendo la mano situata in maniera che le dita siano più alte del polso , prende le tanaglie , o curve , o dritte , secondo che stima meglio ; le fa passare fra l' indice , e il medio , e fra i due conduttori , spingendole col mezzo di questi istrumenti nella vescica .

Il fu Sig. MARECHAL Scudiere , Consigliere , e primo Chirurgo del Re di Francia , non si serviva de' *Conduttori* ; ma introduceva in cambio loro nella vescica la *Guida* . Vedetene la figura nel Trattato degl' istrumenti

del Sig. de Garengeot Tom. 1. pag. 290. e lungo quest' istrumento introduceva le tanaglie ; la vera figura di esse è disegnata nel medesimo Trattato pag. 302., e 303. Quando queste sono introdotte nella vescica , l' operatore le tiene colla man sinistra tanto che ritiri i due conduttori, levando prima la *Femmina* ; indi prendendo con ambedue le mani le tanaglie pe' loro manichini, e spingendole verso il fondo della vescica , e slargando i due manichini prende la pietra .

Se questa fosse tanto grossa , che facesse slargar troppo i manichini delle tanaglie , si introduce allora l' istrumento , che chiamasi *Bottone* , per rivoltarla per un altro verso , specialmente se fosse ovale . Levata la pietra , se ella è liscia , e che si giudichi esservene dell' altre , si introduce nella vescica quest' ultimo istrumento cioè , il *Bottone* , e coll' ajuto della sua fessura si introduce un paio di tanaglie più piccole , il che si replica tante volte, quante vi son pietre da estrarre, supponendo però sempre, che il malato sia forte bastantemente per resistere . In quanto all' apparecchio, e alla cura, sono gli stessi, che negli altri merodi .

Il gran numero di istrumenti, che siamo necessitati a impiegare in quest' operazione , servendo per solito di imbarazzo all' operatore , e a render più lunga , e più laboriosa , ed in conseguenza più dubbiosa ancora l' operazione , è convenuto pensare a renderla più semplice col risparmiar molti istrumenti piuttosto nocevoli , che utili .

A quest' effetto, dopo aver posto il malato nell' istessa situazione , che nell' *Apparato Laterale* , l' operatore prende un siringone di acciaio molto curvo , e incavato dalla sua parte convessa , e dopo averlo bagnato nell' olio si introduce nella vescica , facendolo tenere a un asta alquanto piegato dal lato sinistro della rima del perineo ; indi prende da un altro asta il *Litotomo* fermato sul manico con una piccola fasciolina , e comincia a incidere gli integumenti lungo l' incavatura del siringone immediatamente sotto lo scroto , che si farà tenere sollevato dallo stesso, che tien il siringone , continuando a tagliare fino a due dita distante dall' ano , ma per parte . Indi l' operatore conduce il *Litotomo* sull' incavatura del siringone molto avanti , e viene a ta-  
glia-

gliare il bulbo dell' uretra , tanto che il taglio si accosti più che si può al collo della vescica . Siccome nel far questo taglio vi è da temere di intraccar l' intestino retto , si può per evitarlo , voltar dalla parte del retto la costola del litotomo , e terminar l' incisione di dentro in fuori . Se si venisse a tagliar qualche vaso considerabile , converrebbe farne la legatura prima di avanzarsi più oltre . Indi l' operatore , prendendo colla man destra la guida , l' introduce nella vescica , e per far ciò con più sicurezza , quando la linguetta della guida è dentro l' incavatura del siringone , prende egli da se colla man sinistra il siringone ; perchè , se nel tenerlo l' assistente venisse a piegarne troppo il manico , o a cedere alla pressurà della guida nell' atto di introdurla , quest' istrumento potrebbe uscir fuori dell' incavatura del siringone , e sdrucchiolar fra la vescica , ed il retto , il che produrrebbe de' pericolosi inconvenienti . Introdotta che abbia la guida nella vescica , l' operatore leva via il siringone , e prendendo colla sinistra la guida , coll' indice della man destra allarga l' uretra , e lo sfintere della vescica , e dopo questo prende le tanaglie , e l' introduce nella vescica per estrarne la pietra .

*Del l' Apparato Laterale , o  
Urethro - Kysteo - tomia .*

Questo metodo fu nel suo cominciamento assai imperfetto . Un Religioso de' Minori Osservanti di S. Francesco , nominato *Fra Jacopo Beauliere* , nativo della Città di *Besanzone* nella *Franca Contea* ne fu l' inventore nel 1697 . Dipoi il Sig. *RAU* famoso Professore di Chirurgia nell' Università di *Leiden* , dopo morto il Celebre *BIDLOO* , l' ha perfezionato ; ed in seguito il Sig. *ALBINUS* (1) successore del Sig. *RAU* , nell' Accademia di *Leiden* , e professore di Anatomia , e di Chirurgia , pubblicò un eccellente Trattato di quest' operazione , ed il Sig. Dottor *DOUGLAS* ne ha data ultimamente una Dissertazione del Sig. *CHESELDEN* , famoso Chirurgo di *Lon-*

A 4

*dra,*

(1) *Index Supellectilis Anatomica* , *Vol.* 1725.

*dra* , a cui restiamo molto obbligati ; come anche al Sig. MORAND celebre Professore di Chirurgia , e Segretario perpetuo dell' Accademia Reale di Chirurgia in Parigi, per averla ridotta al grado di perfezione , in cui si trova presentemente .

Per far quest' operazione , dopo aver disposto il malato , e osservate tutte le debite circostanze , e dopo esserci assicurati della necessità dell' operazione , si comincerà a mettere una tavola bene stabile in un luogo molto arioso . Questa tavola farà alta di due piedi , e mezzo in circa , con una materassa sopra , e due guanciali ; uno per posarvi le natiche , e l' altro il capo del malato , coprendo il tutto con un lenzuolo a più doppi . Negli Spedali vi suol' essere il letto apposta per quest' operazione . Vi si mette sopra il malato , legandolo con due lacci di seta , o di filo larghi quattro dita , e lunghi cinque braccia , i quali si piegano in mezzo , e nel luogo della piegatura si cuciono insieme in maniera , che vengano a far quattro capi .

Prima di cominciare a legare il malato , conviene , che le natiche sian alquanto sollevate , e la testa , e il corpo piegati in dietro ; indi mettendogli il luogo cucito della fascia dietro al collo , se ne fanno passare due capi sovra ciascheduna spalla ; indi l' operatore prende i due capi di un lato , e i due altri facendogli prendere a un assistente , mettendosi indi tutti due in faccia al malato , se gli fanno appoggiare i piedi contro di loro ; di più l' operatore , e l' assistente prendendo i capi de' lacci , che sono sulle spalle , ognuno dalla sua parte ne fa passare uno per dinanzi sopra la clavicola , e l' altro per di dietro sopra la scapula , per incrociarli tutti due sotto l' ascella , e dando ad essi poscia tre , o quattro giri , come per attortigliarli . Indi si fan piegar le ginocchia al malato , e si fa passare un capo di questi lacci alla parte interna della coscia , e l' altro all' esterna , per venire ad incrociarli con due giri alla parte posteriore , e media della medesima , facendo lo stesso l' assistente dalla sua parte . In oltre si accostano i calcagni del malato verso le natiche , e si fa passare un capo della fascia alla parte interna , ed inferiore della gamba , e l' altro all' esterna , si incrociano sul collo del piede , e si conducono interiormente , ed esteriormente sotto la  
pian-

### *Dell' Apparato laterale.*

pianta del piede, dove si fanno passare l' uno sopra l' altro; dopo di che si fanno mettere le mani del malato verso i malleoli esterni, colle quattro dita sotto la pianta del piede, e col pollice sulla parte superiore. Allora co' due capi della fascia se gli lega le mani in quella positura, fermandogli il pugno alla parte inferiore della gamba, e le dita al piede. Legato in questa guisa il malato, si mettono due astanti, un di quà, e un di là, per tenere le ginocchia, e i piedi alquanto slargati, ed un altro sulla tavola per poter tenere il malato appoggiandogli le mani sulle spalle, perchè non possa muoversi in conto alcuno; la situazione stabile, ed immobile, essendo assolutamente necessaria in quest' operazione.

Un quarto astante, che esser deve il più disinvolto, e sul quale più che su tutti gli altri può contare l' operatore, sarà posto dietro a quello, che tien la coscia sinistra per esser meglio a portata di tenere il siringone, e di sollevar lo scrotó; e finalmente un quinto astante posto comodamente per essere a portata di dare all' operatore gli istrumenti, che gli saranno necessari via via che andrà operando. Quindi l' operatore stando in faccia al malato prende un siringone d' acciaio ben temprato, ben curvo, e incavato profondamente sulla sua curvatura, col beccuccio molto lungo, e che dal suo manico, ove egli è piatto, sia molto grande per tenerlo più fermo. Ne bagnerà il beccuccio nell' olio, e l' introdurrà nella vescica nella maniera, che abbiamo detto nell' operazione del *Cateterismo*.

Fatto questo, ne piega leggermente la parte piatta, o sia il manico, che tiene colla man sinistra verso l' inguine destro, mentre col' indice della man destra va tastando fra la rima del perineo, e la tuberosità sinistra dell' ischio, per sentire se ritrova la convessità del siringone, che parte è nell' uretra, e parte nella vescica.

L' operatore terrà l' istrumento in maniera, che la parte convessa descriva una linea obliqua dall' arco dell' osso del pube sino alla tuberosità dell' ischio, anche alquanto al di sopra di questa tuberosità. Osserverà altresì, che il beccuccio del siringone non tocchi per l' appunto la superficie interna dell' ischio, non solamente per evitar  
di

di offendere la vescica, ma ancora per lasciare al litotomo la libertà di scorrere sull' incavatura del siringone quanto lo stima a proposito. Farà indi tenere il siringone dal suo astante senza che lo smuova in conto alcuno; al qual' effetto prende il siringone dalla mano dell' operatore pel manico colla man destra, mentre colla sinistra solleva leggermente lo scroto portandolo lateralmente verso l' inguine destro, e osservando, che la pelle della tuberosità dell' ischio sia distesa verso la rima del perineo. Indi il quinto astante alla destra dell' operatore gli porgerà il gammaur, o sia il litotomo, che egli terrà fra il pollice, e il medio della man destra, di maniera che l' estremità del manico posi sul muscolo Tenare, e l' indice si slunghi sulla costola dell' istrumento. Fa la sua prima incisione tenendo l' indice della sinistra sulla rima del perineo, ed anche un po più a sinistra distende la pelle, tenendola ebbliquamente, e comincia la sua incisione un dito distante dalla rima del perineo, e una linea più alto dal luogo il più eminente del siringone, e porta l' incisione fino alla tuberosità dell' ischio, fra i muscoli erettore, e acceleratore sinistri, e accanto al retto; osservando di tagliare più, o meno profondamente, secondo la complessione del malato; e secondo questa altresì si determinerà, se la prima incisione abbia a farsi in un solo, o pure in due, o tre colpi; come ancora la grossezza maggiore, o minor della pietra, determinerà quanto lunga abbia da essere l' incisione. Del rimanente facendo l' incisione più grande alla pelle, ed alla sostanza adiposa, si fa l' operazione più agevolmente, e con maggior successo, che quando si fa piccola l' incisione. Ma un Chirurgo, che ha sempre il capo a segno, ha le sue regole fisse, da cui dipendono queste varietà.

Fatta questa prima incisione; si mette l' indice della man sinistra in mezzo al taglio per cercare l' incavatura del siringone quanto più oltre potrà sentirsi per bene assicurarsene; e raccomandar il siringone in caso che si fosse sviato, appoggiando, se si voglia, uno, o due dita della man sinistra sul retto spingendolo in giù per non intaccarlo nel fare la seconda incisione. Si rinnovano allora l' istanze a tutti gli astanti di badar ciascuno al suo impiego, e specialmente a quello, che tie-

ne il siringone, ed al malato altresì di non muoversi in nessun conto; si taglia in seguito l'uretra, la parte sinistra della glandula prostatica, il collo della vescica, ed un dito traverso del di lei corpo.

A quest' effetto avendo l'operatore l'indice della man sinistra sulla parte laterale del luogo membranoso dell'uretra, conduce coll'ajuto dell'ungghia del suo dito il litotomo, che ei tiene colla man destra, ne introduce leggiermente la punta, finchè sia arrivata all'incavatura del siringone; taglia in seguito l'uretra per lo lungo quanto un dito grosso almeno; indi alzando il pugno fa in maniera, che il suo istrumento resti a piombo sull'incavatura del siringone, e in quest'attitudine introduce l'istrumento, conducendolo ancor molto avanti nella vescica. Fatto questo, può, ritirandolo con cautela, scostarlo quasi una linea dal siringone per incidere con più sicurezza la vescica; e il di lei sinteri, e questo moto fatto con giudizio, e sapere, produce una assai grand'apertura per estrar con poco sforzo la pietra. Cavato fuori che è il litotomo, lo lascia senza levare il dito della man sinistra di sopra l'incavatura del siringone, e prendendo colla destra una guida, conduce la linguetta di quest'istrumento sull'ungghia del dito, che è posato sull'incavatura del siringone, e la fa entrare dentro l'istessa incavatura. Dopo di che levandolo il dito prende coll'istessa mano il manico del siringone, che faceva tenere da un assistente, osservando di non ismuovere punto la guida, e di tener sempre la sua linguetta dentro l'incavatura del siringone.

L'operatore tenendo in tal guisa il siringone da una mano, e la linguetta della guida dall'altra dentro l'incavatura del siringone, introduce la guida nella vescica, facendola sdrucciolare dolcemente lungo l'incavatura del siringone; si riconosce subito, che ella è nella vescica dall'uscire, che fa l'orina dal suo gocciolatojo.

Allora l'operatore leva il siringone dalla vescica facendogli fare un mezzo giro, e prende colla man sinistra la guida; indi introduce l'indice della man destra nel gocciolatojo della guida, fin dentro la vescica, per far la strada alle tanaglie, allargandola leggiermente. Fatto questo, prende colla man destra le tanaglie, che

che deono aver le loro branche alquanto più lunghe di quelle, che servono pel grande apparato, e coll' ajuto del gocciolatojo della guida, le introduce nella vescica; e cavando allora la guida, che teneva colla man sinistra, prende la pietra, che sente immediatamente, e fermandola colle tanaglie, le quali tiene in mano, come un pajo di cesoje, cava facilissimamente la pietra. Levata che sia, introduce l' indice della man sinistra nella vescica per sentire, se vi sian rimaste altre pietre.

Basta guardar la pietra, secondo alcuni litotomi, per conoscere se nella vescica ve ne possono esser dell' altre. Le pietre, dicono essi, che chiamansi *Murali* per riguardo del color nero che hanno, e delle scabrosità, che lor sono intorno, van di rado accompagnate; ma quelle, in cui si scuoprano una, o più superficie lisce, e pulite, son quasi sempre accompagnate da alcune altre. In questo caso coll' ajuto del dito, che si è messo dentro alla vescica, vi si introducono di nuovo le tanaglie, e si estrarono le altre pietre, come si è fatto della prima.

Se vi fosse qualche vaso considerabile aperto nella sostanza adiposa, conviene farne la legatura; ma se questo vaso si trovasse molto profondo per non poterlo allacciare, converrebbe fermarne il sangue per mezzo di uno stuello imbevuto in qualche stitico.

Si generano alcune volte nella vescica delle pietre di una grossezza straordinaria.

## OSSERVAZIONE I.

**I**L Sig. PALFIN (1) ha veduto estrarre una pietra dalla vescica del cadavere di un Religioso del peso di 16. once. Il Sig. TOLET (2) dice di averne veduta una del peso di 28. once, e un' altra di 31. once. Il Sig. DODART presentò all' Accademia Reale delle Scienze l' anno 1689. una pietra di una grossezza prodigiosa estratta dalla vescica di un uomo dopo la sua mor-

(1) Palf. *Anat. Chirurg.*

(2) Tolet, *Traité de la Lithotomie* &c.

morte del peso di 33. once ; e se ne conserva una di una mole eccessiva , che ognano può vedere nello Spedale della Carità degli uomini a *Parigi* del peso di 51. once . Tutte queste pietre sono state cavate dopo morte de' cadaveri , essendo impossibile di estrarle per mezzo dell' operazione , allorchè sono di una sì enorme grossezza .

Si son però veduti de' malati radicalmente guariti dopo aver loro estratto delle pietre grosse quanto un uovo di oca , le quali meritavano certamente il nome di grosse .

## O S S E R V A Z I O N E II.

**I**L Sig. LE DRAN ha estratto parecchie volte delle simili pietre nello Spedale della Carità degli uomini a *Parigi* , e fra le altre , due principalmente nel mese di Maggio dell' anno 1728. con un felice successo pe' due malati , l' uno in età di 35. anni in circa , e l' altro di 45. anni .

Sebbene i litoromi non trovino il più delle volte , se non una sola pietra nella vescica , succede loro nondimeno qualche volta di trovarvene molte , e molte .

## O S S E R V A Z I O N E III.

**I**L Sig. RUYSCHIO dice averne trovate 24. nella vescica di una donna di 81. anno , e tutte assai grosse di una figura angolare ; ed il Sig. SAVIARD (1) ne ha cavate a varie riprese più di 300. grosse quanto un pisello , ad un contadino del villaggio di *Fontenay* sopra il bosco di *Vincennes* , e il malato guarì .

Si trovano ancora alcune volte delle pietre inviluppate in un *Kysto* , cioè in un sacco , e aderenti alla vescica ; sebbene i Sigg. COLOR , TOLET , e altri celebri litoromi ne neghino l' esistenza , e soprattutto delle aderenti ; ma le osservazioni seguenti ne faranno una prova , incontestabile .

OS.

(1) *Novv. Rec. d' Obs. Chir. Observ.* CVIII. pag. 443.

## OSSERVAZIONE IV.

**IL** Sig. **HOUSTET** (1) famoso Chirurgo di Parigi racconta, che il Sig. *le Page* ufficiale invalido, in età di 75. anni, robusto, e di buon temperamento, lo consultò il 25. di Giugno dell' anno 1729. intorno a certi dolori acerbissimi, che ei si sentiva nella regione del perineo. V' introdusse egli agevolissimamente la siringa, finchè fu arrivata presso l' orifizio della vescica; allora fu arrestato il suo istrumento da un ostacolo sì considerabile, che si trovò necessitato a volgerlo in varie maniere, e così ristando coll' istrumento, scoperse, che tutto l' ostacolo veniva dal collo della vescica, che era estremamente stretto; ebbe nulladimeno la fortuna di superarlo, e di sentirvi una pietra. Il malato desiderava con impazienza, che se gli facesse l' operazione per levargliela; e più prontamente che si potè, vi fu preparato, ed il Sig. **HOUSTET** medesimo l' intraprese il 7. di Luglio in presenza del Sig. **BOUQUOT** Chirurgo Maggiore del detto spedale, e de' Sigg. **MORAND**, e **DU VERNEY**. Scoperse il medesimo ostacolo col siringone, e nella medesima maniera che di sopra introdusse il suo istrumento fino alla pietra.

Dopo la solita incisione introdusse con grande stento il conduttore maschio, e femina nella vescica, e indi le tanaglie, colle quali toccò distintamente la pietra. Il Sig. **HOUSTET** procurò di afferrarla, e allargando i manichi delle tanaglie, credè di averla presa; ma stringendo le tanaglie, si accorse, che quel che avea preso, era un corpo morbido, e cedente, non altrimenti una pietra. Fece dell' altre ricerche per trovar la pietra, e il medesimo corpo morbido restò di nuovo fra le tanaglie; il Sig. **HOUSTET** risolvè allora di estrarlo, e cavato che l' ebbe, vide esser un' escrescenza carnosà; introdusse un' altra volta le tanaglie nella vescica, e ne estrasse un altro corpo simile, e levati questi potè con somma facilità afferrare tre pietre, che cavò in tre volte; ma il malato avendo mol-

to

(1) *Mem. de l' Acad. Roy. de Chir. Tom. 1. par. II. pag. 269.*

to patito in questa lunga operazione, malgrado tutte le premure necessarie, non si potè esentare da molti brividi, che si fecero sentire il giorno appresso, e che furono accompagnati ne' dì seguenti da una febbre ardente, e da una soppressione di urina; il ventre diventò teso, il quarto giorno sopravvenne il delirio, e il quinto dopo l'operazione il malato se ne morì.

Nell'aprire il cadavere furon trovate delle cose notabilissime, tanto nella vescica, che nelle altre parti dipendenti di questo viscere, che ne sarebbe troppo lungo il dettaglio, lasciando a' curiosi di soddisfarlene leggendo la detta osservazione nel luogo citato, dov'è ancora rappresentata la figura della vescica, dell'escrescenze carnose, e delle pietre estratte.

#### OSSE R V A Z I O N E V.

**T**ORNAMIRA (1) parla di un uomo, che morì di mal di pietra, e gli furono trovate nella vescica 14. pietre, fra le quali ve n' erano delle galleggianti, altre involte in un *Kysto* doppio; cioè a dire, in due membrane ben distinte.

#### OSSE R V A Z I O N E VI.

**H**OLLIER (2) racconta di un Mercante, che sebbene avesse tutti i segni della pietra, non fu mai possibile di assicurarsene per mezzo della siringa.

Morì egli, e aperro il Cadavere, furono trovate due pietre involtate ciascuna in un *Kysto*, del peso di due once, e mezza l'una.

#### OSSE R V A Z I O N E VII.

**O**RAZIO AUGENIO (3) dice aver veduto un uomo, da cui fu estratta una pietra del peso di due once, involtata in un *Kysto*.

OS.

(1) *Comment. ad Cap. 75. Rhafis ad Almans.*

(2) *De Morb. intern. lib. 1. Cap. 49. Scholiograph.*

(3) *Lib. 14. Epistol. 11.*

## O S S E R V A Z I O N E VIII.

**S**CHENKIO (1) fa menzione di un Infermo, che aveva tutti i contraffegni della pietra, eccettuati quelli, che somministra la siringa. Gli fu fatta l' operazione della *Litosomia*, ma non gli si trovò alcuna pietra; morì, e nell' aprire che si fece il Cadavere, se gli trovarono nella vescica 32. pietre, involuppate ciascuna in una membrana particolare, le quali riempivano tutta la cavità della vescica, non lasciando, che un piccolo passaggio per l' orina. L' Autore ha ricavata questa osservazione da *Martino Holstapfelle* Dottore di Medicina.

**MERCURIALE** (2) dice esser certo, che la pietra si insinua talvolta nell' increspature della vescica, e inganna spesso volte tutte le ricerche dell' Operatore.

**PAREO** (3) dice, che vi son delle pietre aderenti alle pareti della vescica, e ricoperte di una membrana, e che se il Chirurgo intraprende di volerle estrarre per mezzo degl' istrumenti, non potendo far di meno, che di strappar la vescica, farà morire il malato per gli accidenti, che sopraggiungeranno in conseguenza.

**TULPIO** (4) racconta un esempio funesto di una pietra ankystica nella vescica.

Il Sig. **LITTRE** (5) diede nel 1702. una memoria all' Accademia Reale delle Scienze sopra le pietre, che passano dall' uretere fra le membrane della vescica.

Il Sig. **EISTERO** (6) dà la storia di una vescica, nella quale si trovarono molte loggie, che contenevano delle pietre. Veggasi la figura di detta vescica nel luogo citato.

Nel *Commercium Literarium* (7) si parla di una pietra, che era medeuimamente involta in una membrana.

**TUL-**

(1) *Obs. Med. lib. III. de Vessica urinar. Calcul.*

(2) *Consult. xxxvi.*

(3) *Lib. xvii. Cap. xxxvi.*

(4) *Obs. Med. Lib. III. Cap. III.*

(5) *Mem. de l' Acad. Roy. des Sc. ann. 1702.*

(6) *Insl. Chirurg. pag. 1016.*

(7) *Comm. Litterar. pag. 402.*

TULPIO (1) dice, che si trovarono nella vescica di un Senatore di *Amsterdam* 29. pierre unite, lisce, e sì somigliantri alle pierre Belzuar, che i più abili droghieri si sarebbero ingannati.

Non si finirebbe mai, se si volessero riportare tutte le osservazioni, che provano l' esistenza di simil sorta di pierre; è tempo di ripigliare il Manuale di quest' operazione.

Fatta l' operazione, e sciolto il malato, si rimette nel suo letto, con sotto delle lenzuola a più doppi, e prima di medicarlo se gli mette il *Collare di Misericordia*, e la fasciatura a T doppio. Indi si leva la compressa, che si suppone essersi posta sul taglio immediatamente dopo l' operazione, per impedire l' ingresso dell' aria nella vescica, e in cambio di essa, si mettono sull' incisione due piumaccioli ricoperti di medicamenti astringenti, e un cerotto in forma di ferro da cavallo, e sopra una compressa a più doppi. Indi si fanno delle unzioni con olio rosato allo scroto, alla verga, e sul ventre, mettendovi sopra una compressa chiamata *la Ventriera*, e un' altra compressa alquanto lunga, per tener sollevato lo scroto, ambedue bagnate nella polca, sostenendo il tutto colla fasciatura a T doppio, che abbiain descritta nell' operazione della *Kistektomia*, o della punzione al perineo.

Dopo questo, se gli legano le gambe con una piccola fascia chiamata la giarrettiere, perchè non possano slargarsi l' una dall' altra, e riaprire il taglio; si mette indi un capezzale sotto le ginocchia per tenerle alquanto sollevate. Dopo aver medicato l' infermo, se gli dà qualche confortativo per rimetter le forze abbattute.

Non istardò a parlare in questo luogo degli accidenti che alcune volte succedono a quest' operazione, nè della cura, che osservar conviene per ottenerne una perfetta guarigione, giacchè un volume intero non basterebbe a farne il dettaglio. Quelli, che vorranno instruirsene, posson consultare gli Autori, che hanno trattato a fondo questa materia, come sarebbero, i Sigg. *Tuler, Collar,*

Tom. III.

B

The-

(1) *Lib. III. Observ. 17.*

Thevenin , Thibaut , Mery , Douglas , Perchet , Dionis , de Garengot , le Dran , &c.

### *Dell' alto Apparato , o Epi-Kystico - tomia .*

Questo metodo fu pubblicato per la prima volta nel 1560. da PIETRO FRANCO Chirurgo Provenzale , che nel suo trattato dell' ernie , dice aver praticato con prospero successo quest' operazione sovra un bambino di *Lozzana* in età di due anni ; ma nell' istesso tempo consiglia di abbandonarla intieramente . Dopo di lui il ROUSSET Medico Francese la raccomandò fortemente nel suo libro intitolato *Partus Cesareus* stampato nel 1591. confessando però di non averla fatta giammai ; e TOLET dice , che è stata fatta nel grande Spedale di Parigi , e che avendovi trovato molti inconvenienti , fu per questo abbandonata . Ma verso l' anno 1710. il Sig. DOUGLAS celebre Chirurgo Inglese la praticò il primo in Inghilterra felicissimamente .

Siamo dunque obbligati al Sig. DOUGLAS , per averla rimessa in uso con molto successo , e per averne fatto un eccellente trattato . Il Sig. MORAND fece stampare nel 1729. un trattato della litotomia all' alto apparato , dove si trovano delle dotte riflessioni , coll' aggiunta di un estratto di quanto è stato scritto di più importante su tal soggetto .

Sebbene l' origine di questo metodo venga dalla Francia , i Francesi , che per loro sciagura sono naturalmente gelosi del merito de' lorò concittadini , in vece di impiegarsi a perfezionare quest' operazione , la screditarono , e ne abbandonarono la gloria agli stranieri . Ma ( come abbiain detto ) il Sig. MORAND ben cognito pel suo zelo del ben pubblico l' ha fatta rinascere coll' eccellente Trattato , che ha messo alla luce . Egli dice averlo praticato , e benchè il successo ne sia stato infelice , lo riferisce nulladimeno senza timore di screditarlo ; imperocchè fu verificato , che l' infermo morì il quattordecimo giorno dell' operazione per colpa sua . Egli dà altresì la storia di quest' operazione fatta felicemente sovra un bambino di 4. anni dal Sig. *Berrier* Chirurgo di *S. Germa-*

no in Laya . Questo medesimo Chirurgo ha praticato una seconda volta quest' operazione con prospero successo sopra un ragazzo di 13. a 14. anni, di cui ne daremo in appresso l' osservazione .

Per far con successo quest' operazione convien prima di ogni altra cosa aver piena cognizione di come sia situata la vescica , e della struttura del peritoneo . In quanto alla situazione della vescica si sa da gran tempo esser questa fuori del ventre , cioè a dire fuori del peritoneo . Ma tale cognizione non serve per far l' operazione con successo , convien sapere ancora come il peritoneo vada ad investir la vescica ; per istruirsi su tal proposito, leggesi l' esposizione anatonica del Sig. WINSLOW , poichè non conosciamo alcun' Autore , che con più di esattezza , di chiarezza , e di precisione , abbia dimostrate tutte le dipendenze del peritoneo , di quel che abbia fatto questo celebre Notomista .

Dopo aver acquistato una piena cognizione della situazione della vescica , della struttura , e de' limiti del peritoneo , si può confessare , che per certi riguardi quest' operazione è eccellente : e se dagli antichi , che la praticavano è stata abbandonata , non è per altro se non perchè non avendo una perfetta cognizione dell' anatomia , in conseguenza della situazione , e struttura del peritoneo , era seguita da tanti accidenti , che spaventavano l' operatore .

Per far dunque quest' operazione , supponendo che sian fatti prima tutti i preparativi convenienti per intraprenderla , si può lasciare stare il malato nel suo letto mettendogli sotto delle lenzuola a più doppi per ricevere l' acqua , che si spargerà . Il paziente farà coricato sulla schiena con un guanciale sotto il capo , ed un altro sotto le natiche , affinchè il mezzo del corpo restando avvallato , i muscoli retti dell' addome vengano a star lenti , e gl' intestini vadano verso il diaframma .

Il malato tenuto fermo da alcuni assistenti , non avrà bisogno di esser legato . L' operatore introdurrà nella vescica una siringa , colla quale vi schizzerà leggermente una sufficiente quantità di acqua tiepida , per riempierla , e farà con una piccola fascia una legatura alla verga , per impedir che non esca . Fatto questo , prenderà un gammant dritto , e sul luogo più eminente

te della vescica , farà un' incisione longitudinale , tagliando solo gl' integumenti per iscuoprire il fondo della vescica . Scoperta che l' avrà , vi introdurrà un gaminau per farvi un' apertura , nella quale introdurrà immediatamente l' indice della man sinistra torcendolo verso il fondo della vescica in guisa di gancio per tenerla sollevata , nel tempo che ei starà per dilatare l' incisione secondo il bisogno : vi introdurrà indi le tanaglie , ovvero due dita , ed estrarrà la pietra .

Fatta l' operazione , il taglio degl' integumenti si guarisce facilmente , col far stare il malato quasi ritto sul letto , perchè l' orina che va continuamente nella vescica , non possa arrivare al luogo dell' incisione , per impedir , che si riunisca , come accade negli altri metodi di operare , e di più , l' orina ha sempre il suo scolo libero . Se il taglio fosse troppo grande , sicchè si credesse non poterli agevolmente risaldare , vi si farà un punto di sutura con un ago curvo infilato con un' filo di refe incerato , mettendo sul taglio un piumacciuolo coperto di balsamo di Arceo , indi un cerotto , una compiessa sopra , e il tutto sostenuto da una fasciatura *da Corpo* , fatta con una salvietta , e sostenuta dallo *Scapolare* .

Convien confessare la *Litosomia* all' alto apparato , e fatta bene , essere una eccellente operazione ; ma il metodo all' apparato laterale è il più sicuro di tutti , onde consigliamo i giovani Chirurghi a metter tutto il loro studio in ben farla . Quest' operazione all' alto apparato può aver luogo nel caso di una pietra assai grossa .


Termineremo questo Capitolo nel dare la storia dell' operazione all' alto apparato fatta con successo dal Sig. *Berrier* in presenza de' Sigg. *Fleuzio* primo Medico , e *la Fosse* primo Chirurgo della Regina di Francia il dì 26. Settembre 1728.

#### OSSERVAZIONE I. .

**I**L Sig. *BERRIER* fece ( come abbiain già detto ) l' operazione all' alto apparato sopra un giovane in età di 13. in 14. anni , il dì 26. Settembre l' anno 1728. ed ecco in qual maniera la fece . Egli introdusse primie-

mieramente una siringa nella vescica, la di cui curvatura era stabile, ed il suo tubo flessibile; rovescò in appresso la verga, e la siringa fra le coscie del malato tenutivi fermo da un assistente. Indi fece un' incisione fra i muscoli dritti, penetrante sino nel pelvi; allora mise il dito indice della man sinistra nel pelvi, ed avendo fatto alzare la siringa, e la verga dell' infermo schizzettò per mezzo della siringa 4. o 5. once di acqua tiepida, che bastò per formare un ondeggiamento sensibile avendo lasciata la siringa nella vescica, sull' unghia del dito indice, col quale tirava la parte superiore della vescica verso gl' intestini, immerse nel corpo della vescica colla man destra un gammaut mezzo curvo, tondo, e tagliente alla sua estremità, allargando l' incisione sotto il pube; portò indi l' indice della man sinistra nella vescica, per cercare la pietra, e la trovò aderente alla parte superiore della vescica verso il suo fondo: non potendo farla scendere col dito verso il suo collo, portò di nuovo il gammaut nella vescica, per aggrandire l' incisione di basso in alto, e con tal mezzo pervenne a staccarla con facilità; ma non avendo potuto estrarla colle dita per via della sua grossezza, la tirò colle tanaglie: era questa una pietra di quelle, che chiamansi *Murali* molto scabra, della grossezza di un uovo di gallina, e del peso di nove dramme.

Il malato fu per la prima volta medicato con delle fila asciutte, e fu messo nel suo letto, gli fu cavato sangue un' ora dopo l' operazione, si medicò in appresso con un piumacciuolo coperto di un semplice digestivo, gli si fecero sul ventre dell' embrocazioni con olio rosato, e l' *Album Reafis*, e sopra delle compresse imbevute in un fomento fatto con assenzio, con camomilla, e con ipericon, bollite nell' acqua. Si medicò il malato ogni sei ore, sino al nono giorno dell' operazione, il qual tempo si passò senza febbre, e quest' operazione ebbe un successo felicissimo, e la ferita esteriore fu perfettamente cicatrizzata in capo a 18. giorni.



## CAPITOLO II.

*Della maniera di estrarre il Calcolo fuori dell' Uretra.*

**Q**Uando una persona si trova incomodata dalla pietra, o dalla renella, avviene alcune volte, che un calcolo non potendo uscire dall'uretra, è ritenuto in questo canale, e vi cagiona non solamente degli acerbi dolori, ma ancora una gran difficoltà di orinare, ed anche una total ritenzione di urina. Un malato in un così deplorabile stato non manca di chiamare il Chirurgo al suo soccorso per liberarlo.

Molti sono i luoghi dell' uretra, ove il calcolo fermar si può; trovasi qualche volta situato dietro lo scroto, nel principio dell' uretra, nel collo, o sia sfintere della vescica; altre volte si trova fermato davanti lo scroto nel mezzo dell' uretra; ed alcune volte all' estremità di questo canale. Può ancora trovarsi in una dilatazione, o sacco particolare dell' uretra. Si legge nelle Osservazioni Chirurgiche del Sig. le DRAN Tom. II. Osserv. 79. un caso simile a quell' ultimo; come anche nella Chirurgia del Sig. DIONIS.

Dal dolore, o per mezzo del tatto, o coll' istrumento si viene a riconoscere il luogo, dove si trova il calcolo, e per procurarne l' estrazione si metteranno in uso i rimedj capaci di spingerlo per mezzo delle urine, applicando nell' istesso tempo esteriormente de' cataplasmi, e delle fomenta sulla parte; si adopreranno ancora i bagni, i cristalli ec. Se coll' uso di tutti questi rimedj, il calcolo non esce fuori dell' uretra, e che al contrario la difficoltà di orinare sia diventata maggiore; conviene in tal caso ricorrere a' mezzi più efficaci.

A quest' effetto, se il calcolo è ritenuto nel collo della vescica, si farà un' incisione al perineo nel luogo dove si sente il calcolo per estrarlo, osservando di introdurre nell' ano due dita della man sinistra tinte nell' olio, per impedire, che il calcolo non retroceda. Se il calcolo è fermato a' contorni del glande, si lubrichi, e

Si rilasci il canale dell' uretra con delle reiterate iniezioni di olio, avendo prima fatta una legatura alla verga con una fasciolina al di sopra del calcolo, questa legatura impedisce, che l' iniezione non spinga all' indietro il calcolo; ed in appresso si premerà dolcemente il calcolo colle dita, per avvicinarlo all' orifizio dell' uretra: e indi se ne proverà l' estrazione, soprattutto se egli è un bambino, col far succhiare l' uretra da una guardia, o dalla nutrice; con questo mezzo si eviterà ogni incisione, cicatrice, e fistola. Ma se questo mezzo sia stato insufficiente, bisogna estrarlo con un istrumento a guisa di uncino, o colle mollette.

Se l' infiammazione, o la grossezza del calcolo non permise di mettere in uso questi mezzi; TULPIO, ed il Sig. de GARENGEOT consigliano l' incisione; quest' ultimo apre speditamente l' estremità del glande colle cesoje, ed introducendo una tenta, o un uncino nell' incisione ne cava il calcolo, lava indi il taglio col vin caldo, e lo medica con qualche balsamo glutinoso disteso sul panno lino.

Ma può accadere, che il successo de' metodi precedenti riesca invano, soprattutto quando il calcolo è rimasto nel mezzo dell' uretra, nella qual circostanza è da temere, che i violenti sforzi, che fa il malato per urinare, la difficoltà, che proverà, e i dolori, che ne seguiranno, gli cagionino la morte. Il sol rimedio, che vi sia in simil caso, è di far un' incisione al luogo del pene, ove il calcolo si è fermato, e con questo mezzo estrarlo nella maniera seguente.

Senza stare a esporre i metodi raccomandati da CELSO, da ALBUCASIS, e da altri, ci contenteremo di descrivere quello inventato dal Sig. THIBAUT, celebre Chirurgo di Parigi, e praticato dal Sig. de GARENGEOT. Si prende il pene colla man sinistra, tirandone la pelle in su verso il pube, indi con un gammaut vi si fa un' incisione laterale, si separa poi il corpo cavernoso dell' uretra, alla quale si fa un' incisione longitudinale, nel luogo, ove il calcolo si trova alloggiato; cioè a dire, ordinariamente sotto il corpo cavernoso. Fatto ciò, si estrae il calcolo colle mollette, o con un uncino; si unge in appresso il taglio con qualche balsamo glutinoso, e si cuopre con un piomacciuolo ricoperto del me-

desimo balsamo , e sopra delle compresse sostenute con una fasciatura convenevole .

Quando il calcolo si trova involupato in un sacco particolare , convien fare un' incisione laterale , nel luogo il più proprio per estrarlo , e porre speditamente nella cavità del sacco un digestivo , si medica in appresso con de' corrosivi per consumare il detto sacco , e di poi si mondifica , s' incarna , e si cicatrizza , come se fosse una semplice ferita .

### C A P I T O L O III.

#### *Della maniera di estrarre la Pietra alle Donne.*

**L**E donne son meno che gli uomini soggette alla pietra , per avere il canale dell' uretra men curvo , e più largo di essi . Per quest' istesso è più facile introdurre la siringa , che negli uomini . Oltre il canal dell' uretra , chiamato il *Meato urinario* , vi è ancora un altro dutto , che va alla matrice , che si nomina la *Vagina* ; è questo molto largo , specialmente nelle donne , che hanno avuto , o molti figli , o de' cattivi parti . Egli è situato più basso , che l' uretra , che va alla vescica , il quale è più stretto . I giovani Chirurghi debbono saper ben distinguere ambedue questi dutti quando si tratta di introdurre la siringa nella vescica , per non cadere nel medesimo fallo , che in simile occasione commise un Chirurgo , come vedrassi dalla seguente osservazione .

#### O S S E R V A Z I O N E I.

**I**L Sig. PALFIN (1) racconta , che nell' anno 1720. sul fine del mese di Agosto , fu chiamato a visitare una giovane , che aveva una soppressione di urina , da cui era incomodata per più di 24. ore , coll' *Ipogastro* molto enfi-

(1) Palfin, *Anatomia Chirurgicale*.

fiato, teso, e con dolore. Un Chirurgo della Città di Gand, che era stato chiamato prima del Sig. PALFIN, la siringò, e non vedendo uscir l' orina, giudicò non esservene nella vescica, e consigliò l' inferma a confessarsi, e a dispor le sue cose. Arrivato il Sig. PALFIN, quel Chirurgo gli confermò l' istesso, e in prova di quel che ei diceva, siringò di nuovo l' inferma alla di lui presenza; ed in fatti non uscì l' orina, perchè le aveva introdotta la siringa nella vagina, il che vedendo il Sig. PALFIN, senza opporsi, introdusse immediatamente la siringa, in presenza di quell' ignorante, nel *Meato urinario*, e ne cavò circa un boccale di orina con gran sollievo dell' inferma, e con gran sorpresa di quel Chirurgo, che fu obbligato a confessare di essersi ingannato nell' introdur la siringa.

Le osservazioni seguenti non essendo fuor di proposito, ci sarà permesso di qui inferirle.

## OSSE R V A Z I O N E II.

**I**L Sig. de MARCHETTI (1) Medico Italiano, e altre volte celebre Professore di Anatomia a Padova, racconta, che fu un giorno chiamato a visitare una donna, che il Chirurgo curante diceva avere una fistola nella vulva. Quando si venne a visitare il male, questo ignorante mostrò al Medico il *Meato urinario*, che egli aveva preso per una fistola, e nel quale aveva introdotto una tasta ben lunga ricoperta di medicamenti corrosivi per distruggere il callo, come ei diceva, e guarir la fistola. Il Sign. de MARCHETTI non restò poco sorpreso dall' ignoranza di colui; ma per non pregiudicargli, si contentò di ordinargli in presenza dell' inferma di levar via quella tasta, e di metterne un' altra piccola con dell' unguento di Cerusa canforato, e di lasciarvela due, o tre giorni, per rimediare alle escoriazioni, che avevano cagionate alla parte i medicamenti corrosivi. Dopo di che, essendo uscito con esso, l' avvertì a solo a solo del suo sbaglio, sopra di che fu egli obbligato a scusarsi col

(1) De March, *Obs. Medic. Chirurg. rarior.*

vol dire, di non aver mai veduto innanzi le parti naturali della donna.

### OSSERVAZIONE III.

**N**ELL' anno 1749. accadde ad un principiante di uno Spedale Militare della Guarnigione di Livorno, che essendo stato chiamato a visitare una donna, che lamentavasi pe' gran dolori alla vulva, nel visitarla per riconoscere il male, dilatando colle sue dita le gran labbra, venne a scoprire le prominenze, che formano la clitoride, le ninfe, e le caruncole mirtiformi, che egli prese per escrescenze carnosae non naturali; onde credendosi di averne scoperto con ciò la causa vera del male, prese immediatamente le cesoje, e dopo un esame, quale poteva permettergli la sua ignoranza, tagliò animosamente le sopradette parti; onde ne venne una emorragia considerabile: trovandosi in tal caso molto imbrogliato, non sapendo come farsi per fermare il sangue, chiese delle stoppe, colle quali turò fortemente la vagina, e vedendo, che non ostante una sì gran quantità, che ne aveva impiegate, il sangue continuava sempre a colare, e non avendone più per continuare a turare la vagina, e la vulva, si determinò a mettersi il lembo del lenzuolo; ma senza successo, poichè la compressione, che le stoppe, ed il lenzuolo procuravano, era altrove, che sopra gli orifizj de' vasi aperti: finalmente non sapendo più come fare, prese partito di andarsene, dicendo di ritornare fra momenti. Uscito appena di casa dell' inferma, trovò per fortuna uno de' Chirurghi della Guarnigione, e raccontogli il caso, pregandolo di andar egli a veder l' inferma, insegnandogli la casa, senza arrischiarsi di ritornarvi. Restò sorpreso il Chirurgo nel vedere, che l' emorragia era cagionata dall' amputazione delle suddette parti, la quale egli fermò con applicarvi i rimedi convenevoli, e una fasciatura adattata alla parte.

Queste osservazioni servono a mostrar la necessità, in cui sono i giovani Chirurghi, di avere una esatta cognizione della struttura delle parti naturali della donna, per non essere esposti a commettere simili errori massicci, e talvolta ancora pericolosi, quando hanno fra le

ma-

mani qualche infermità da curare in queste parti. Ritorniamo al nostro proposito.

Per siringare le donne, si fanno coricare a sponda di letto a colce larghe, slargando le ninfe, e sollevando alquanto la clitoride, e allora si introduce nel meato orinario una siringa dritta, e solamente alquanto piegata all' estremità, che senza trovare alcun ostacolo si insinua agevolmente nella vescica.

Quando è sicuro, per mezzo della siringa, esservi nella vescica la pietra, sia la paziente, o fanciulla, o donna, si fa mettere nella medesima positura, che l' uomo, e legata nell' istessa maniera. Indi l' operatore dispone intorno ad essa gli astanti, per far quasi gli stessi uffizi, che per l' uomo.

Per cominciar l' operazione, l' astante, che nell' uomo era destinato a sollevar lo scroto, quivi slargherà le ninfe coll' indice di ambedue le mani, e l' operatore sollevando alquanto la clitoride, introdurrà nell' uretra il conduttore maschio, bagnandolo prima nell' olio, e lo farà passare nella vescica, col quale appena introdotto, cercherà di assicurarsi della pietra, introducendo nella vescica il conduttore femmina, bagnato prima anch' esso nell' olio, facendo entrare la cresta del conduttore maschio nella fessura dell' altro. Il che fatto gli scosti l' uno dall' altro, ( come abbiamo detto, parlando del grande Apparato ) affine di dilatar l' uretra, per introdurvi le tanaglie, e tenendo i due conduttori fra l' indice, ed il medio della man sinistra introduca le tanaglie nella vescica fra le dette due dita, e fra i conduttori. Indi cavando ambidue i conduttori, prima la femmina, e poi il maschio, prende colle tanaglie la pietra, e l' estrae; mette immediatamente una compressa sull' apertura del canale dell' uretra per impedir l' ingresso dell' aria nella vescica, e di poi scioglie l' inferma, e la rimette nel suo letto.

Uno deve servirsi tanto più di questo metodo, cioè a dire, della dilatazione senza far alcuna incisione, che si fa per esperienza, che il collo della vescica della donna può esser disteso in una maniera presso che incredibile, senza che ne resulti alcun danno: il che è sufficientemente provato, non solo dagli esempi di molte donne, che hanno reso naturalmente delle pietre assai  
gros-

grosse; ma ancora dalle testimonianze di un gran numero di Medici , di Chirurghi , e di celebri Litotomi , come sono i Sigg. *Itiano* , *Tolet* , *Greenfield* , *Alghisi* , ed altri .

Si legge nelle *Miscell. Natur. Curios. Obs. Dec. 2. ann. 20.* che una donna fu felicemente liberata dalla sola dilatazione dell' uretra di una pietra situata nel collo della vescica , che pesava 5. once , e mezza . Si veggono nelle *Trasfazioni Filosofiche num. 202. 236.* e altrove , molti esempj rimarcabili del successo di questo metodo tanto nelle femmine giovani , che nelle vecchie , benchè generalmente riesca più facile nelle prime , che nelle ultime .

L' apparecchio è alquanto differente da quello degli uomini ; ma i medicamenti sono gli stessi , se non , che in luogo del cerotto in forma di ferro da cavallo , si adopra un *Cuopri-Vagina* semplice , o uno doppio , della figura , come di un astuccio da occhiali , e un cerotto della medesima figura .

Quest' operazione può farsi ancora nella maniera seguente ; dopo aver situata l' inferma nella maniera stessa , che sopra si disse ; l' operatore prende colla man destra un siringone dritto , e incavato , introducendolo pel meato orinario fin nella vescica : dopo di che prende il siringone colla man sinistra , e lungo l' incavatura di esso , introduce la guida , indi leva il siringone , e prende la guida colla man sinistra , e lungo il gocciolatojo della guida introduce le tanaglie per prender la pietra , il che si eseguisce molto agevolmente , per esser l' uretra della donna molto elastica , e cortissima .

Se la pietra fosse straordinariamente grossa , e che senza cagionare una gran lacerazione , e nella vescica , e nell' uretra , non potesse farsi l' estrazione ; tornerebbe meglio in tal caso fare col gammaut un taglio al collo della vescica sopra la pietra , come nel piccolo apparato , accostandola più che si può al collo della vescica per mezzo dell' indice , e del medio della man sinistra , che si faranno introdotti nell' ano , se si tratti di una piccola ragazza , o nella vagina in una donna , il che non solo rende più facile l' estrazione , ma ancora meno pericolosa .

Quasi in tutte le donne, dopo che loro si è fatta l' operazione, rimane uno scolo involontario di orina, specialmente quando loro si è cavata una grossa pietra, perchè essendo obbligato a slargare molto il canale dell' uretra per estrarla, si sforza, e si rompe l' elatere delle fibre dell' uretra, e dello sfintere della vescica.

Per evitar un sì grande inconveniente, converrebbe far loro la *Litosomia* all' alto apparato; questo metodo di estrar la pietra, riuscendo felicemente negli uomini, non dubitiamo punto, che non sia per riuscire nelle donne ancora; ed il Sig. DOUGLAS è di questo parere.

#### OSSERVAZIONE IV.

**I**LDANO (1) dice di aver cavata una pietra dalla vescica per la vagina coll' occasione di un' ulcera cagionata non tanto dal peso, quanto dalla superficie scabrosa della pietra, la disugualità della quale scoperse tanto bene, quanto la pietra stessa, con un dito, che introdusse nella vagina. Cominciò a dilatar l' ulcera col dito, indi con un piccolo gammaut, e poi con altri istrumenti convenevoli introdotti nella vescica, ne estrasse una pietra della grossezza di un uovo di gallina.

#### CAPITOLO IV.

##### *Dell' Operazione della Nefrotomia.*

**L**A *Nefrotomia*, o piuttosto secondo SCHURRIGIO (2) la *Nefrolitosomia*, è un' operazione, per la quale si estrae una, o diverse pietre, per mezzo di un' incisione fatta nella regione lombare, e che penetra fino nella cavità della pelvi del rene.

La

(1) *Cent. 1. Obs. LXVIII.*

(2) *Litholog. Hist. Medic. Cap. XIII. §. 1.*

La maggior parte degli Autori, che hanno scritto sopra questa materia, considerano la *Nefrotomia*, come impraticabile, perciò l' hanno assolutamente rigettata; però abbiain molti esempi di persone guarite di piaghe nella regione de' reni, che penerravano fino in questi organi, il che sarà provato dalle seguenti osservazioni.

### OSSERVAZIONE I.

L' Anno 1735. un uomo fu ferito al dorso nella regione del rene destro; uscì dalla ferita, e dall' uretra del sangue, e dell' orina sanguinosa per alcuni giorni; il successo di questa cura fu felicissimo. Dal che ne segue adunque, che delle ferite de' reni, soprattutto di quelle fatte nel dorso, e che non penetrano nella cavità del basso ventre, se ne può ottenere la guarigione. E benchè IPPOCRATE proibisca a' suoi allievi il praticare la *Litotomia*, nulladimeno nel suo libro de *intern. affect.* Tom. 7. Cap. 15. ove tratta delle malattie de' reni, dice: *cum autem intumuerit & elevatus fuerit, sub id tempus juxta renem secato, & extracto pure, arenam, per urinam cientia, sanato: si enim scetus fuerit, fugae spes est; sin minus, morbus homini commoritur.* Egli consiglia di fare un' incisione sul rene, quando vi è tumore, per farne uscire la marcia, ed evatuare di poi il calcolo per mezzo de' diuretici; perchè, dice egli, questa incisione può conservare al malato una vita, la quale non mancherebbe di perdere senza di essa. Vuole ancora nel luogo citato Tom. 7. Cap. 16. pag. 650. che quando il rene viene a suppurare, e a gonfiarsi vicino alla spina del dorso, si faccia un' incisione profonda sopra il tumore dirimpetto al rene, o nel rene stesso; donde pare, che le ferite di questi organi non gli siano parute così pericolose, quanto le crediamo.

Il Sig de VAN - SWIETEN (1) fa osservare in quest' occasione, che IPPOCRATE raccomanda espressamente di fare allora un' incisione molto profonda, poichè ella deve penetrare la pelle, il grasso, e de' muscoli grossi,

(1) *Comm. in Aphor. Boerb. de cogn. & cur. morb.* Tom. 3. §. 1001. pag. 241.

fi, avanti che l'istrumento possa arrivare fino al rene.

ROUSSETO, (1) e RIOLANO (2) sono persuasi, che si può con successo praticare la *Nefrotomia*, facendo l'incisione sopra la pietra del rene, purchè ella si faccia sentire al tatto, avendo cura però di non offendere l'arteria, nè la vena emulgente, nè l'uretere, e di non penetrare nella cavità dell'addome. Questo consiglio pare ad un tratto singolarissimo, e non si può che appena immaginarsi, come mai la pietra può esser toccata colle dita a traverso gl'integumenti senza che vi sia ascesso, poichè ella spesse volte non si fa sentire, benchè l'ascesso, che ella ha cagionato, sia aperto. Però BAUHINO racconta un fatto, che prova, che la natura opera qualche volta assai favorevolmente per procurar tal vantaggio.

## OSSERVAZIONE II.

UNA ragazza, dice egli (3), fu assalita da un tumore nella region lombare, in conseguenza di una total soppressione di urina. Il Chirurgo applicò inutilmente per due mesi consecutivi de' cataplasmi maturativi sovra il tumore, credendo che sarebbe venuto a suppurazione. Finalmente ei sentì nel tumore un luogo molto duro, dove fece un' incisione, per mezzo della quale estrasse due pietre; e quest' operazione ebbe un successo felicissimo. In fatti ella non può non essere utilissima, soprattutto quando la natura indica il luogo, dove deve esser fatta, sia da un tumore cagionato dalla pietra, o sia da un ascesso nel rene.

Pare, per quel che SERAPION, e AVICENNA dicono, che la *Nefrotomia* si praticasse ne' tempi loro. *Quidam* (dice Serapion (4)) *antiquorum preceperunt lapidem renum extrahi cum ferro incidente, retro super latas duorum iliorum in loco renum*. Alcuni Antichi hanno prescritto di estrarre la pietra da' reni per mezzo di un' incisione fat-

(1) *De Part. Cæsar. Sect. III. Cap. VII.*

(2) *Anthrograph. Cap. xxvi.*

(3) *Ex obs. propr. apud Schenck. Obs. Med. Lib. III. carat. Nephrit. Obs. VIII.*

(4) *Prax. Trañ. IV. Cap. xxii.*

fatta al dorso sul lato degl' ilei , nella regione de' reni . Ed *Avicenna* dice (1) : *Sunt qui laborant extrahere calculum renalem per incisionem illi, & per dorsum* . Vi sono alcuni , che fanno l' estrazione della pietra del rene per mezzo di un' incisione fatta negl' ilei , e nel dorso . Checchè ne dicano questi due Autori , però tutti due considerano quest' operazione pericolosissima , ed anche mortale . Nulladimeno tutto quel , che si dice delle pericolose conseguenze , che traggono seco le ferite penetranti nel pelvi de' reni , si trova smentito dalle precedenti osservazioni , e da quel che il Sig. BERNARD racconta (2) del Sig. *Hobson* Console Inglese a Venezia , a cui furono estratti de' calcoli da' reni , dal famoso *Domenico MARCHETTI* Professore in Padova , e che sopravvisse molti anni all' operazione .

Questo caso è riportato nel luogo citato , con grande esattezza , e con delle riflessioni , che meritano di esser lette . Per compiacere al Lettore , lo riporteremo fedelmente in questo luogo .

### OSSERVAZIONE III.

**I**L Sig. *Hobson* Console della Nazione Inglese in Venezia , avendo sofferto lungo tempo per una pietra , che aveva nel rene , fu finalmente assalito da un accesso di nefritica così lungo , e così fiero , che trovossi quasi ridotto a disperazione . Come da tutti i mezzi , che si erano adoprati sino allora , non ne aveva ottenuto verun sollievo , si indirizzò in questa crudel circostanza al Dottor *Domenico MARCHETTI* , e lo supplicò di volergli estrarre la pietra dal rene per mezzo di un incisione . Essendo il malato persuaso , che non vi era altro mezzo per procurarsi del sollievo , disse , che non ignorava i pericoli , a' quali lo sottoponeva l' operazione : ma che la morte stessa gli parrebbe infinitamente preferibile alla vita infelice , e dolorosa , che ei menava da tanto tempo . Il MARCHETTI dimostrò allora una  
estre-

(1) *Canon. Lib. III. Fen. XVIII. Tract. II. Cap. XVIII.*

(2) *Transf. Phyl. ann. 1696. Tom. III. artic. II. n. 223. pag. 188.*

estrema ripugnanza di intraprendere una tale operazione , rappresentandogli non solamente tutti i rischi , a' quali si sottoponeva ; ma anche , come egli stesso temeva , che l' operazione non fosse praticabile , insistè sopra ciò , che non aveva mai tentato , e credette in questa maniera di evitare di fargli l' operazione , dichiarando , che farebbe un dargli la morte l' arrischiare una simile intrapresa . Ma il Sign. *Hobson* perseverando nelle sue istanze , il Dottor *MARCHETTI* si vide finalmente forzato di cedere all' importunità del malato , e si rese alla sua risoluzione ; in conseguenza intraprese questa cura , e preparò il malato , come lo giudicò conveniente .

Per far l' operazione , si servì di un *gammaut* , e condusse dolcemente l' incisione sulla regione del rene infermo . Il sangue , che uscì subito in abbondanza , l' offuscò , e l' interruppe al punto , che fu obbligato di sospendere l' operazione : medicò dunque per quella volta la ferita , e aspettò il giorno seguente per terminare l' operazione , penetrando fino nella sostanza del rene .

Dopo averne estratto due , o tre piccole pietre , medicò di nuovo il malato , che da quel momento in poi fu liberato da' dolori violenti , che avea risentito fino allora . Dopo un certo tempo ebbe forza bastante per alzarsi dal letto , e camminare per la camera ; non essendo sopravvenuta nè emorragia , nè febbre , che potesse far temere alcun pericolo . Il *MARCHETTI* continuò a medicarlo per lungo tempo ; ma non potette mai arrivare a cicatrizzare la piaga . L' orina , che scolava continuamente da essa , l' aveva resa fistolosa . Ma siccome non usciva , che in piccola quantità , il Sig. *Hobson* , che dal rimanente aveva ricuperato le sue forze , e la sua prima salute , prese congedo dal Professore , e se ne ritornò a Venezia colla sua moglie , che aveva cura di medicarlo .

Una mattina , che questa Sig. medicava la piaga , nell' asciugarla la parve sentire qualche cosa di duro , e di ineguale . Il che l' obbligò di esaminare la piaga con maggior attenzione dell' ordinario servendosi di un ago a testa in vece di tenta . Trovossi , che questo corpo duro , e ineguale era una pietra della figura , e della mole di un nocciolo di dattero , che ella estrarre .

Tom. III.

C

Dal-

D' allora in poi , il malato non si lamentò mai più del minimo dolore nella regione del rene , in cui fecesi l' operazione .

Dieci anni , o in circa , dopo fatta quest' operazione ( continua di narrare il Sig. BERNARD ) il Sig. *Hobson* , ritornò a Londra , ed il Dottor *Douns* , che l' aveva conosciuto in Venezia , invitò il Dottor *Tijon* , e me , ad andare a visitarlo .

Quando ci ebbe fatto egli istesso la storia di ciò , che vengo a raccontare , ci permise di esaminare lo stato della sua piaga fistolosa , che era effettivamente rimasta sempre aperta , gli orii della quale erano estremamente callosi ; di modo che , senza cagionare dolore al malato , introdussi nella fistola una tenta dentro assai per farci credere , che arrivava sino nel rene . La materia , che usciva allora dalla fistola , era in piccola quantità ; ma sempre mescolata con dell' orina , di cui ne aveva anche un forte odore . L' orifizio esterno di questa piaga turavasi qualche volta per tre , o quattro giorni , e allora la marcia si evacuava per le vie naturali insieme coll' orina , senza trovare ostacolo alcuno , nè cagionare il minimo dolore . Non si può dubitare ( seguita lo scrittore ) che non vi fosse aderenza del rene col muscolo *Psoas* . Nel tempo che si esaminò il seno fistoloso , il Sig. *Hobson* non metteva sopra di esso , altro che una compressa di panno lino , che era sempre imbevuta di orina . Del rimanente a lui pareva essere in istato di soddisfare a tutte le funzioni della vita , e di sostenere le medesime fatiche quanto ogni altro uomo della sua età : credo , che poteva avere allora qualche cosa di più di 50. anni .

Il giorno dopo la nostra visita , egli si proponeva di fare a cavallo , e colle poste quaranta , o cinquanta miglia d' Inghilterra . Il Sig. BERNARD termina il suo racconto col dire , che crede , che quest' operazione sia stata tentata per la prima volta in quest' occasione , e soggiunge , che quantunque il sentimento unanime degli Autori , che hanno scritto sopra le ferite de' reni , sembra essere , che esse son mortali , quando penetrano nel pelvi del rene , però la presente osservazione prova , che questi Autori hanno avuto torto di rigettare la *Nephrotomia* .

di

di un tuono così decisivo (1). Il che è ancora provato dalle seguenti osservazioni.

## O S S E R V A Z I O N E IV.

**I**L Sig. LAFFITE celebre Chirurgo di Parigi, e membro dell' Accademia Reale di Chirurgia racconta (2), che il dì 12. Ottobre 1734. fu chiamato per visitare una donna di età di 35. anni, che aveva da quindici giorni un tumore nella region lombare sinistra, accompagnato da febbre, e diarrea. Questo tumore era stato preceduto da dolori, che si fecero subito sentire da' reni fino alla parte superiore del dorso, e che vennero poi a fissarsi al tumore; la pelle non aveva cangiato colore. Il Sig. LAFFITE toccando il tumore sentì una fluttuazione molto profonda, vi ci mise sopra un cataplasma anodino per mitigare il dolore, e affottigliare gl' integumenti, e prescrisse alla malata una regola nel vivere conveniente. Il giorno appresso vedendo più prominente, e più circoscritto il tumore, vi applicò un cataplasma maturativo, e cinque, o sei giorni dopo, la fluttuazione della marcia si fece maggiormente sentire. Allora il Sig. LAFFITE si determinò a farne l'apertura, e ne uscì molta materia di differenti colori, fece tutte le ricerche necessarie per riconoscere se la marcia avesse qualche altro luogo per dove venir potesse, e non avendone trovato, medicò la ferita, e prescrisse una dieta esatta all' inferma. La febbre, che continuò allora, si moderò il giorno seguente, sminul di giorno in giorno, ed il quindicesimo ne fu liberata affatto; si continuò a medicarla, la marcia diventò bianca, e la buona qualità della carne, ed il progresso della cicatrice. diedero luogo a sperare, che l' inferma guarirebbe, come di un ascesso ordinario.

Il ventesimo secondo giorno dell' operazione la malata ebbe la febbre, e sentì un dolore nella piaga con pulsazione. Il Sig. LAFFITE attribuì quest' accidente a

C 2

qual-

(1) *Mem. de l' Acad. Roy. de Chir. Tom. III. pag. 238. & suiv.*

(2) *Ibid. Tom. III. part. V. pag. 184.*

qualche eccesso fatto dalla malata ; ma ella lo assicurò di avere esattamente osservato tutto quello , che da lui l' era stato prescritto . Nel levar l' apparecchio lo trovò pieno di marcia , continuò nulla di meno a medicarla semplicemente , e osservò , che di due in due giorni usciva una maggior quantità di marcia , che l' estensione apparente della piaga non era capace di somministrare , ed essendo questa marcia sempre di differenti colori , non dubitò più dell' esistenza di qualche altro luogo , o seno situato profondamente di dove veniva la marcia . Egli prese il parere dal Sign. *Jallot* , facendogli il dettaglio della malattia , e convennero esser necessario di introdurre una tenta nell' orifizio del seno , per potere col suo mezzo scaprire il luogo ignoto . La tenta essendo entrata quattro , o cinque pollici nel detto seno , fece sentire un corpo duro come una pietra . Avendo dilatata sufficientemente la piaga ne estrasse colle mollette una pietra grossa quanto una nocciuola ; indi portò il dito nella piaga , e sentì un' altra pietra , che tirò medesimamente colle mollette ; questa era grossa quanto una noce , di una figura irregolare ; ed uscì in appresso una quantità di marcia di differenti colori . La malata fu medicata con un digestivo ordinario , la suppurazione fu abbondantissima fino al quindicesimo giorno , quindi poi a misura , che veniva a farsi la regenerazione delle carni ; e finalmente la ferita fu quasi interamente saldata il quarantesimo secondo giorno dopo l' operazione , a riserva del seno , da cui la suppurazione cessò di scolare appoco appoco , e la guarigione fu perfetta .

#### OSSERVAZIONE V.

**IL** Sig. SAURE' (1) fu mandato nel mese di Ottobre 1727. per visitare un giovane in età di 25. anni , che avea un tumore della grossezza di un uovo nella regione lombare destra : questo tumore era stato preceduto da dolori ne' reni simili a' dolori nefritici . Il Sign. SAURE' vi applicò de' cataplasmi emollienti , e maturativi , che furono continuati fino alli undici di Novembre .\*

(1) *Mem. de l' Acad. Roy. de Chir. Tom. 11. part. v. pag. 188.*

bre. Il tumore mutò situazione, fissandosi alla parte superiore della regione iliaca del medesimo lato. Il Sig. SAURE' vi mise una striscia di pietre a cauterio, che fecero una convenevole crosta, ed il tumore si avvallò; sopravvenne una violenta febbre con delirio; ma col mezzo delle cavate di sangue, ambidue questi accidenti si calmarono, e dopo un consulto tenuto col Sig. Boudou capo Chirurgo del grande Spedale di Parigi, il Sig. SAURE' aprì la crosta profondamente, donde uscì quantità di marcia. La piaga fu medicata secondo le regole dell'Arte, e malgrado le attenzioni del Sig. SAURE' degenerò in fistola.

Nel mese di Giugno 1738. il Sig. SAURE' fu chiamato pel medesimo malato, che aveva la febbre, accompagnata da un vivo dolore nel rene destro, e la sua fistola asciutta co' suoi orli infiammati. Egli introdusse una tenta nella fistola, e sentì a qualche linea distante del suo orifizio un corpo duro. Dopo medicato che fu il malato, se gli cavò sangue, e cessò la febbre. Il giorno seguente il Sig. SAURE' fece l'estrazione di una pietra grossa quanto una nocciuola; ma la piaga è rimasta sempre fistolosa; ciò, che fa credere, che vi sia rimasta qualche altra pietra, perchè il malato risentesi de' dolori, che corrispondono alla fistola.

## O S S E R V A Z I O N E VI.

IL Sig. la Batte ebbe nel 1741. un tumore infiammatorio nella region lombare, che si terminò per suppurazione; l'ascesso fu aperto, e medicato. Nell' 1747. il detto Sig. venne a Parigi, e consultò i Sigg. PETIT, e le DRAN, che scandagliarono la fistola; e benchè portassero la tenta a quattro dita traverse nella fistola, non sentirono pietra alcuna, di modo che non consigliarono altro al malato, se non che di tenere la fistola aperta con delle minugie. Il malato ritornò a Pau sua patria, e diciotto mesi dopo uscì naturalmente dalla fistola una pietra grossa quanto la seconda falange del dito mignolo, che il malato inviò all'Accademia (1).

C 3

Que-

(1) *Mem. de l'Acad. Roy. de Chir. Tom. 11. part. 7. pag. 191.*

Questi esempi provano, che l' estrazione della pietra nel rene è praticabile, soprattutto quando è indicata da un ascesso, che vi si forma, come gli Autori l' hanno osservato.

Vi sono molti esempi (1) di malati guariti per mezzo dell' operazione della *Nefrotomia*, la qual guarigione non si sarebbe mai ottenuta, se la pietra fosse rimasta nel rene, e se la natura da se stessa non avesse voluto sollevargli, facilitando all' Arte i mezzi per soccorrerli. Questo sentimento è ancora appoggiato dall' autorità di *Schenckio* [2], di *Wedelio* (3), di *Meeckren* [4], di *Hildano* (5), di *Vanswieten* (6), di *Eistero* (7), di *Tulpio* (8), e di *Vatero* (9), che dice di praticare la *Nefrotomia*, quando è indicata da un ascesso.

Questa operazione è utile in questi casi, perchè ella conserva la vita al malato, previene i dolori acerbi cagionati dal calcolo, che si può estrarre colle dita, coll' uncino, o colle mollette.

Il Sig. *FREIND*, che è il primo fra gli Autori moderni, che abbia formalmente raccomandata questa operazione, e che l' abbia seriamente consigliata, racconta (10) un esempio di questa operazione fatta felicemente, estratto dall' Accademia Reale delle Scienze di *Parigi*.

L' Osservazione seguente fa ancora molto meglio conoscere i vantaggi, che si possono attendere in simil caso dalla Chirurgia, tanto più che l' operazione fu fatta due volte felicemente sopra il medesimo soggetto.

OS-

- (1) Denis, *Obs. Chirurg. ec.* Fontanus, *Exemp.* 42. fol. 117.
- (2) Schenck. *Obs.*
- (3) *Dissert. de Lithotom.* Jena. 1704.
- (4) Meeck. *Obs. Chir. Obs.* 49.
- (5) Hildan. *Cent.* 6. *Obs.* 44.
- (6) *Comment. in Boerh. Aphor.* Tom. III. *Artic. Nephrit.*
- (7) *Institut. Chirurg.* Part. II. Cap. 140. §. XIV.
- (8) Tulp. *Lib.* IV. *Obs.* XXVIII.
- (9) Vater. *In Dissert. de Partu Cæsar.*
- (10) *Hist. Med.* Tom. II. pag. 185.

## OSSERVAZIONE VII.

**R**OONHUYSEN (1) estrasse dall'apertura di un ascesso al rene, una pietra assai grossa, della quale ne dà la figura nella Opera: condusse la cura della piaga secondo le regole dell'Arte, fino a perfetta guarigione, di maniera che il malato visse per due anni intieri in buona salute. Dopo questo tempo, sopravvenne al malato, nel medesimo luogo de' lombi, una nuova infiammazione: questo Chirurgo, non dubitando, che non vi fosse ancora qualche altro corpo estraneo, prese la risoluzione di riaprire la cicatrice, e cavò effettivamente una seconda pietra, ma più piccola. La piaga si riunì, ed il malato ha sempre goduto d' allora in poi di una perfetta salute.

Del rimanente gli esempi, che abbiamo di sopra allegati in favore dell' Operazione della *Nefrotomia*, non sono i soli, perchè se ne trovano molti altri (2), e soprattutto quello inserito nell' Istoria di Francia di *Mezeray*, riportato in questi termini.

I Medici dell' Università di *Parigi* avendo saputo, che un Birro di *Bagnole*, afflitto da lungo tempo da una pietra ne' reni, era stato condannato a morte pe' suoi delitti, pregarono il Re di permettere, che fosse egli consegnato nelle loro mani, per provare, se fosse stato possibile di aprirgli il rene, per estrarne la pietra. L'operazione ebbe un successo sì felice, che quest' uomo visse molti anni dopo in perfetta salute.

Questo accadde sotto il Regno di Carlo VIII. Re di Francia, che morì nell' anno 1498., circa 100. anni avanti che ROUSSET ( il quale fu il primo, che consigliò di praticare la *Nefrotomia* ) scrivesse; e nel tempo che la Chirurgia Francese cominciava a nascere.

TULPIO crede, che l' avviso di ROUSSET sia fondato sull' osservazione fatta, che il calcolo cagiona qualche volta un ascesso ne' reni, e viene a farsi una strada per la regione lombare, come successe nel caso da

C 4

lui

(1) *Roonh. Obs. Part. 1. Obs. xxii.*

(2) *Mem. de l' Acad. Roy. de Chir. Tom. III. pag. 238. & suivant.*

lui riferito, ed in un gran numero di altri mentovati da IPPOCRATE; ma è molto probabile, che il fatto successo al Birro di *Bagnolet*, gli abbia somministrato il detto pensiero; imperocchè bisogna credere, che un simile successo avrà fatto strepito grande nel suo Paese, ed ei lo ricava dal supplemento di *Monstrelet*; ma di una maniera non affatto simile.

Da' differenti fatti, che abbiamo descritti si può con ragione concludere, che la *Nephrotomia*, non è praticabile, che nel caso di ascesso, che si scuopre esteriormente, ed è necessario in simil caso di farne l'apertura più presto che sia possibile, tanto più, che il lungo soggiorno della marcia può cagionare molto disordine nella parte, ove si trova ritenuta. Bisogna dunque, secondo il sentimento de' Sigg. de VAN-SWIETEN (1), le DRAN (2), e di altri gran Maestri, aprire prontamente l'ascesso subito, che si sente la fluttuazione: se si dubita, che vi sia una pietra nel rene, si deono fare le ricerche necessarie, sia colla tenta, o collo specillo ortuso, sia anche col dito, per riconoscerla, e fare il possibile di estrarla coll' istrumento il più convenevole. E' necessario di impedire, che le carni non si accostino troppo presto, perciò conviene di guarnire, e turare con degli fluelli la piaga, sino che sia certo, che non vi è più nè pietra, nè calcolo, ed in appresso cercare di procurarne, se è possibile, la perfetta consolidazione.

In quanto alla scelta de' mezzi, che conviene impiegare per aprire questa sorte di tumori, vi son degli Autori, che danno la preferenza al canterio, sia attuale, sia potenziale, ed altri, che preferiscono l'istrumento da taglio; ma bisogna convenire, che si può ricorrere all' uno, e all' altro di questi due mezzi per l'apertura di questi ascessi, secondo la profondità, e secondo le diverse circostanze, che hanno accompagnato la formazione, ed i progressi di queste sorte di ascessi putridi, o saniosi, e nel dettaglio de' quali sarebbe superfluo di entrare.

Avan-

(1) *Comm. in Boerh. Aphor. Tom. 3. §. 1001. pag. 241.*

(2) *Traité des Operat. de Chir. pag. 263.*

Avanti di procedere all'apertura dell' ascesso, conviene esser sicuro della sua esistenza, e se non fosse possibile di determinare al giusto la posizione dell' ascesso, converrebbe, per assicurarsene, avanti di intraprendere l'apertura, portarvi dentro un *Troicart* scanalato, assai lungo, e assai grosso; per questo mezzo si eviterebbero almeno delle incisioni incerte, che sarebbe necessario di fare con circospezione per poter pervenirci. D' altronde la scanalatura del *Troicart* servirebbe per condurre il *gammaut* sino nell' ascesso; l' operazione sarebbe più sicura, e più pronta, e si risparmierebbero molti dolori al malato. Bisogna osservare di dirigere l' istrumento, piuttosto verso la parte inferiore de' lombi, che verso la superiore, per aprire il luogo più declive dell' ascesso, e per evitare di intaccare coll' istrumento le ultime costole spurie, che abbracciano il rene verso la sua parte superiore.

Quelle specie di ascessi hanno qualche volta due sacchi distinti, uno nell' interiore del rene, e l' altro all' esteriore del grasso. Bisogna dunque fare in maniera di assicurarsene per mezzo del diro; e allora se si scuoprissi qualche attaccatura, che facesse ostacolo alla comunicazione, bisognerebbe tagliarla col *gammaut*. Se sopravvenisse un' emorragia per avere aperto qualche vaso grosso, situato nel tragitto dell' incisione, e che fosse necessario, per fermarla, ricorrere a qualche stitico, sarebbe a proposito di legare uno stuello imbevuto in questo medicamento, con un filo grosso incerato, e assai lungo, per poter fermarne l' estremità fuori della piaga, per evitare, che non venisse a sdruciolare, e perdersi nel sacco profondo dell' ascesso. Bisogna averne la medesima attenzione durante la cura, cioè a dire, di legare gli stueli di fila, o gli stracci di panno lino, per timore che non si perdano nel fondo della cavità di un simile ascesso.

Se tutti gli esempi, che abbiain riportati, non son sufficienti per rendere ragguardevole l' operazione della *Nefrotomia*, possiamo almeno concludere, che ella può, benchè pericolosa, riuscire, e che deve almeno praticarsi ne' casi disperati, quando si trova indicata da un ascesso. Del rimanente si può assicurare, che la necessità di rimettere in pratica l' operazione della *Nefrotomia* è  
per

per lo meno tanto grande, quanto l'è stata quella di rimetterci l' operazione della *Litotomia*, perchè vi sono almeno tanti malati, che muojono per la pietra ne' reni, che per la pietra nella vescica.

Le pietre restano qualche volta molto tempo ne' reni, senza cagionarvi il minimo dolore. HEURNIO dice, di aver trovato 80. pietre in un rene di un uomo, e 70. nell' altro rene dell' istesso uomo, senza aver mai risentito il minimo dolore nefritico, durante tutto il tempo della sua vita; e ANTONIO POZZIS, parlando delle pietre de' reni, dice, di averne trovata una del peso di sei once nel rene di un uomo, senza però che egli avesse mai avuto il minimo segno di pietra. In fatti si osserva nella quotidiana pratica, che i malati rendono delle pietre di una mole considerabile, rimaste gran tempo ne' reni, senza cagionar de' dolori, e se ne cagionano, non è che nel tempo, che si rendono pel canal dell' uretra coll' orina.

## C A P I T O L O V.

*Dell' Operazione dell' Acroteriasmo, o dell' Amputazione, e de' casi, che la richiedono.*

**L'** Amputazione è una operazione, colla quale si taglia, e si tronca una parte del corpo col ferro, come un braccio, una gamba, ec.

CELSE, che viveva più di un secolo avanti GALENO, è stato il primo, che abbia dato la descrizione di questa operazione; egli non ce la dà come nuova, e quantunque la sua Chirurgia sia, dicesi, cavata da IPPOCRATE, e da ASCLEPIADE, egli non cita nè l'uno, nè l'altro, riguardo quest' operazione.

IPPOCRATE trattando della cancrena, e dello sfacelo, dice (1), che bisogna recidere ciò, che è imputridi-

(1) *De Articul. iv. Obs. xvii. de morb. vulg. lib. ii. sect. vii. Epid. lib.*

dito ; ma non dice una parola dell' amputazione . Non si trova dunque descrizione veruna di quest' operazione avanti CELSO ; ma comunque ciò sia , non bisogna però mettere in dubbio , che ella non sia stata fatta avanti di lui , e che non sia anche stata descritta da alcuni Autori , le Opere de' quali saranno state perdute .

Secondo ogni apparenza quest' operazione non fu fatta in quel tempo , e d' allora in poi , fino al quindicesimo secolo , che all' occasione dello sfacelo sopravvenuto ad un braccio , o ad una gamba ec. ; e pare , che di rado la facessero , perchè i malati erano sempre in gran pericolo di perdere la vita ; e secondo CELSO morivano per lo più dall' emorragia nell' atto dell' operazione ; *Sed id quoque cum summo periculo fit ; nam saepe in ipso opere , vel profusione sanguinis , vel animae defectione moriuntur* (1) . Non bisogna sgomentarsene . CELSO non faceva legatura alcuna al di sopra del luogo , che voleva amputare , per comprimere i vasi , e sospendervi l' emorragia , almeno non ne dice nulla affatto nella descrizione , che ci dà di quest' operazione . *Igitur* , dice egli (2) , *inter sanam , vitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est sic , ut neque contra ipsum articulum id fiat , & potius ex sana parte aliquid excidatur , quam ex agra relinquatur . Ubi ad os ventum est , reducenda ab eo sana caro , & circa os subsaecanda est , ut ea quoque parte aliquid ossis nudetur : deim id ferrula praecidendum est quam proxime sane carni etiam inhaerenti , ac tunc frons ossis , quam ferrula exasperavit , levanda est , supraque inducenda cutis , quae sub ejusmodi curatione laxa esse debet , ut quam maxime undique os contegat . Quo cutis indurata non fuerit , id linamentis erit contegendum , & super id spongia ex aceto deliganda . Cetera postea sic facienda , ut in vulneribus , in quibus pus non moveri debet , preceptum est .*

EGINETA , AVICENNA , e GUIDO DA GAULIACO non ne dicono nemmeno essi alcuna parola ; quest' ultimo , che viveva verso la metà del quattordicesimo secolo faceva due legature una al di sopra , e l' altra al di sotto del luogo , dove si doveva far l' amputazione ; ma non dice cosa alcuna , se le facesse per sospendere l' emorragia , o pure per togliere il senso alla parte .

Non

(1) Cels. Lib. VII. Cap. XXXIII.

(2) Ibid.

Non si fa se VESALE si sia servito della legatura per fermare l' emorragia . BARTOLOMMEO MAGGIO (1), che scrisse verso la metà del sedicesimo secolo , fu dunque il primo , che fece la legatura al di sopra della parte corrotta , senza dir nulla de' mezzi per sospendere l' emorragia durante l' operazione . BOTAL Medico di Carlo IX. Re di Francia , dice , che nel suo tempo facevanfi tre legature , una probabilmente per togliere il sentimento alla parte , e le due altre , una al di sopra , e l' altra al di sotto del luogo , ove doveasi tagliare il membro ; senza dir nulla de' mezzi per sospendere il sangue durante l' operazione .

PAREO Primo Chirurgo di Carlo IX. fu il primo , che abbia parlato molto chiaramente della maniera di sospendere il sangue nel tempo dell' amputazione . „ Quan-  
do , dice egli , si vuole amputare un membro , bisogna tirar la pelle , e i muscoli verso la parte sana ,  
e far una forte legatura al di sopra del luogo , che  
si vuol tagliare , con un legame molto forte , e di figura piatta . Serve questa , dice egli , 1. a tenere il  
cuojo , e i muscoli alzati in su coll' ajuto degli astanti ; 2. per impedire l' emorragia ; 3. leva il sentimento  
alla parte .

PIGRAI , AQUAPENDENTE , ILDANO , e tutti i Chirurghi , che son venuti dopo di lui , l' hanno messa in pratica . Vero è che questa legatura non impediva sempre , e totalmente l' emorragia ; imperciocchè i vasi lasciavano uscire più o meno il sangue malgrado questa legatura ; e un tal inconveniente metteva spesso volte il malato in pericolo di perdere la vita ; perciò il Sig. MOREL Chirurgo Francese inventò nell' anno 1674. in tempo dell' assedio di Besancune , un torcolare molto atto per fermare il sangue con più sicurezza , che i Pratici perfezionarono dipoi col mezzo della disposizione di differenti compresse , perchè il laccio non venisse a pizzicar la pelle , e che la compressione si facesse più particolarmente sovra il cordone de' vasi grossi .

Questo

(1) *De Vuln. sculp. cur. de membr. Spbac. affecti, & corrupti excision.*

Questo torcolare è stato in uso finchè il Sig. PETIT n' inventò un altro, che è in uso al dì d' oggi, e che porta il nome dell' inventore; questo è da preferire al precedente, per le ragioni, che alleggeremo in appresso.

I casi, che richiedono l' amputazione, sono una frattura considerabile, e complicata, con rottura di vasi, il che spesso accade per un colpo di arme da fuoco, per lo scoppiar di una bomba, o di una granata in un assedio, o in una battaglia. „ Quando, dice il Sig. „ BOERHAAVE (1), la frattura è molto composta, e complicata, soprattutto se vi è nell' istesso tempo una „ gran contusione, triturazione degli ossi, e distruzione „ de' vasi grandi, bisogna senza indugio venirne all' amputazione, se però non v' è nulla che si oppone „. La carie dell' ossa prodotta da cause interne, come sono umori acrimoniosi, e corrosivi, o da cause esterne, come sarebbero una gran contusione, o una ammaccatura della parte spugnosa dell' ossa, prodotta da una caduta, o da un colpo di arme da fuoco, nel qual caso non potendosi far l' esfoliazioni, sarebbe pericoloso il pretendere di aspettar che si facciano; per la qual cosa, quando un' arme da fuoco ha colpita un' estremità, o parte spugnosa dell' osso, conviene immediatamente farne l' amputazione senza aspettar che l' infermo esausto di forze non sia più in grado di resistere all' operazione.

Confessiamo essere una misera condizione di chi si trova in questa angustia fatale, di vederli privo per sempre di una parte di se stesso; ma, come dice assai bene il Sig. DIONIS (2), è meglio campar con tre membri, che morir con quattro. Non possiamo nemmeno dispensarci dal tagliare un braccio, o una gamba, quando se ne è impossessata la mortificazione, e che il calor naturale vi è affatto estinto; non essendovi più maniera di farvi tornar la vita, e che colla dilazione il male non farà altro, che alimentarsi.

Conviene distinguere due specie di mortificazione; cioè, una imperfetta, che chiamasi *Cancrena*, e l' altra perfetta, nominata *Sfacelo*.

La

(1) Boerb. Aphorif.

(2) Cours d' Operat. de Chir. pag. 734.

La cancrena è un principio di mortificazione , e di corruzione d' una parte , alla quale può rimediarsi per mezzo di rimedj convenevoli , come sono le fomentè , e i bagni aromatici ; vi si mettono delle compresse bagnate in queste fomentè , applicandole calde sulla parte , e mutandole spesso , e finalmente si amministrano tutti i rimedj tanto interni , che esterni , che richiede questa malattia .

Lo sfacelo è una mortificazione totale della parte , cagionata dall' esser totalmente intercetta la circolazione del sangue , e degli altri umori , sicchè la parte non abbia più commercio col resto del corpo ; laddove nella cancrena vi restano ancora alcuni vasi liberi , per mezzo de' quali si fa , quantunque debolmente , la circolazione . Dalla definizione data dello sfacelo , si vede non esservi altri rimedj , che l' amputazione . Se la cancrena non cede a' rimedj , e che continui per alcuni giorni , si converte per ordinario in sfacelo .

Quando da un colpo di un istrumento troppo contundente , come sarebbe una palla di cannone , o simili , la parte non resta affatto separata ; ma che ella è ancora attaccata , attenendosi a qualche brano di carne , convien finir di tagliarla , e medicare il ferito secondo l' arte . Ma se ciò sia fatto da un istrumento da taglio , come sarebbe una sciabla , un' asce , o altro , la porzione della pelle , o della carne , per la quale l' estremità sta ancora attaccata al tutto , non deve tagliarsi altrimenti , specialmente se essa contenga il tronco di qualche vaso principale , perchè in tal caso , sussistendo ancora il commercio della circolazione , e conservando viva la parte , conviene tentarne la riunione . L' esperienza , a cui dobbiamo in tutto rapportarci , autorizza quest' insegnamento , come vedrassi da due osservazioni del celebre Sig. de la PEYRONNIE , a cui deve la Chirurgia un gran numero di fatti singolarissimi .

## O S S E R V A Z I O N E I.

UN' uomo (1) ricevette un colpo di asce in un braccio, che aveva tagliato obliquamente, ed affatto l'osso del braccio, cioè l'umero, e tutti i muscoli, che gli sono intorno, non lasciando altro di intero, che il cordone de' vasi ricoperti da una striscia di pelle della larghezza di un pollice. Il ferito avendo il braccio ciondolante, di maniera che la mano calava fin presso al ginocchio, gli fu involta la parte in molti panni, e fu condotto al Sig. *de la PEYRONNIE*, il quale trovò le due parti della ferita distanti otto pollici da un labbro all' altro, e la parte inferiore del braccio fredda, livida, e senza senso. In questo stato era sì facile di terminarlo di amputarlo, e sì poco verisimile, che si potesse conservare il membro, che molti Chirurghi, che erano in compagnia del Sig. *de la PEYRONNIE*, gli proposero di tagliarlo affatto. Ma questo illustre Chirurgo fondato sovra esempj di riunioni, che parevano da non sperarsi, volle tentare ancora questa. A tale effetto levò via alcuni pezzetti d'osso sfaccati, riaccostò le parti quanto gli fu possibile, e le fermò in tal guisa per mezzo di un apparecchio convenevole, osservando di farlo in maniera di graticola, per poter medicare la ferita, senza smuovere quel, che teneva l'ossa riunite. Si servì per medicamenti dell'acqua vite con un po di sale armoniaco, e mise in uso tutto ciò, che conveniva, tanto per richiamare il calor naturale, che per impedir gli accidenti. Il secondo giorno il braccio parve un poco enfiato al di sopra della ferita, e non si sentiva il polso; il terzo giorno si vide un po di enfagione alla mano, e al cubito; il quarto giorno l'enfagione si accrebbe, e si sentì un po di calore alla mano; dal quinto all'ottavo giorno il calore aumentò a gradi; l'ottavo l'apparecchio fu levato, e la ferita parve che si ravvivasse; fu medicata con de' piumaccioli bagnati in una dissoluzione di *Colcozar*, che è una calcinazione di vitriolo di color di rosa, e con delle pezzette inzuppate nel  
vin

(1) *Cours d' Oper, de Dionis pag. 738.*

vin aromatico animato, continuando fino al decimo quarto giorno, nel quale si levò per la seconda volta l'apparecchio, e la ferita parve, che si disponesse a riunirsi; il decimo ottavo si trovò avanzata la cicatrice, la parte si trovò quasi nel suo stato naturale, ed era sensibile il polso. Allora il Sig. de la PEYRONNIE, in luogo della fasciatura a graticola, ne sostituì un' altra circolare, ed ebbe l' attenzione di levar l'apparecchio di dieci in dieci giorni; in capo a i cinquanta si levò affatto, ed in capo a due mesi l'infermo fu interamente guarito.

Il Sign. de la PEYRONNIE fu incoraggiato a intraprendere il sopradDETTO impegno dall' esempio, che aveva avuto nel 1706. di un Soldato Svizzero, che aveva il dito indice di una mano tagliato in maniera, che non si atteneva, se non a un piccolo pezzetto della pelle, che lo congiunge al medio, e da questi due fatti concluse egli, che in ogni occasione deve tentarsi la riunione delle parti, non essendovi inconvenienti alcuni a farne la prova, e che la natura non domanda spesso volte, se non di esser secondata per operar de' prodigi.

Se da una palla da schioppo sono triturate l' ossa del braccio, o della gamba, non si può in questo caso entrar con troppa fiducia l' operazione. Conviene risolversi altresì all' amputazione, allorquando la carie dell' ossa, materalato i rimedj, viene a incavarle, come se fossero roe da vermi.

La cancrena, e lo sfacelo possono essere ancora cagionati dall' aria, che ci circonda, da i cibi, che ci alimentano, e dalle passioni di animo; in fatti osserviamo, che l' uomo è sottoposto alla cancrena, e allo sfacelo, più degli altri animali, e non se ne deve cercare altronde la causa, fuorchè dalla sua maniera particolare di vivere, agitato dalle differenti passioni, che irritano i solidi, e li snervano, rendendo esauisto il sangue, e gli altri umori, delle loro parti: le più volatili, e nudrito inoltre da alimenti facili a corrompersi, acquista più facilmente tutte le disposizioni necessarie per la cancrena, e lo sfacelo. Il di lui sangue al minimo ristagno si infiamma, e si imputridisce ben tosto.

L' aria fredda contribuisce anch' essa molto alla cancrena, e allo sfacelo, perchè si vede, che ne' climi, dove il freddo predomina con violenza, si corre rischio di  
per-

perdere qualche volta il naso, l' orecchie, le dita, le parti virili, in somma l' estremità tanto superiori, che inferiori; imperocchè dal gran freddo l' oscillazione delle fibre ne è estinta, il sangue vi si coagula, e si putrefa nella parte congelata; il senso, ed il moto vengono a cessare, e ne succede la mortificazione, la cancrena, e lo sfacelo.

*Thiery de bery* dice, che passando per le Alpi, verso natale l' anno 1539. con genri di guerra del Re di Francia Francesco I. molti soffrirono tal freddo, che non solamente il naso, o le orecchie, ma ancora la verga si tumefecero talmente in alcuni, che la pelle si lacerava, e in altri si fece una tal privazione degli spiriti animali, che vi sopravvenne la cancrena.

Il Sig. la FERMIERE Dottor di Medicina, e Chirurgo maggiore del terzo Reggimento di S. M. I. in Toscana, mi comunicò la seguente osservazione.

## OSSERVAZIONE II.

L' Anno 1733. il mese di Febbraio nella Campagna di Filisburgo sul Reno, un Soldato a cavallo del Reggimento di *Caillen* essendo stato obbligato a non cavarsi gli stivali per molti giorni, e a star quasi sempre a cavallo, il rigor del freddo unito alla compressione, che lo stivale, e la giarretiera facevano alla parte, gli cagionarono la cancrena, e lo sfacelo alla gamba, ed ecco, a mio parere, in qual maniera. Estinta dal gran freddo l' oscillazione, o sia la vibrazione delle fibre, e non essendo più riscaldata la parte da nuovo sangue, nè animata dalla distribuzione degli spiriti animali, venne a dissiparsi appoco appoco il calor naturale, a coagularsi il sangue, e a perdersi la sensazione; di più la gagliarda compressione dello stivale, e della giarretiera superando la forza elastica, che conserva il circolo del sangue, e degli altri liquori, cagionò uno strangolamento ai loro vasi, vi si stagnarono i liquidi, e vennero ben tosto a corrompervisi, ed avendo perduto ogni commercio cogli altri liquori, restò la parte priva della vita comune a tutto il corpo, ed in conseguenza mortificata, e secondo il grado della mortificazione si produsse in lei la cancrena, e lo sfacelo.

Tom. III.

D

Fi.

Finalmente allo smontar che fece il soldato da cavallo, potete ben credere, che non gli fu possibile di reggersi sulla gamba. Egli fu trasferito con un convoglio di malati allo spedale di *Wissemburgo*; ma, siccome si trovò questo spedale pieno, fu obbligato di andare a quello di *Hagenau*, dove arrivato il Sig. la *Fermiere* il maggiore, capo Chirurgo dello Spedale Militare, ordinò, che gli fossero levati gli stivali per visitarlo, e riconoscere il suo male. Il servente, nel cavarglieli con tutto il riguardo per paura di fargli male, incoraggiato dall' infermo a tirarli più forte, perchè non sentiva male alcuno, così fece. Ma qual fu la sorpresa del capo Chirurgo, e di tutti gli astanti, nel vedere il servente, che nel tirar lo stivale cadde indietro collo stivale in mano, e la gamba dentro.

### OSSERVAZIONE III.

**I**L Sig. de la MOTTE (1) dice, che una fanciulla in età di 27. anni, avendo la gamba cancerata, le propose l' amputazione, alla quale ella non volle aderire; ma qualche tempo dopo la natura fece da se stessa l' operazione; la gamba si separò al ginocchio nell' articolazione, e la malata guarì perfettamente, senza impiegare altro rimedio, che del panno lino pulito. Trovansi negli Autori molte osservazioni simili.

### OSSERVAZIONE IV.

**L** Eggesi nelle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze (2), che una fanciulla nominata *Anna Perreaut*, di *Mouffier San Giovanne* Villaggio di *Borgogna*, distante sei miglia da *Santa Reina* in età allora di 21. anni; alla quale le sopravvenne una cancrena nell' età di sett' anni, dopo una febbre ordinaria. Quella cancrena si impossessò de' due cubiti, che vennero a disseccarsi fino all' articolazione del gomito, ed in appresso si separarono da se naturalmente, di maniera che non le restò.

(1) La Motte. *Obs. de Chir.* Obs. 303.

(2) *Mem. de l' Acad. R. des Sc.* anno 1703. pag. 41. H.

starono che due tronconi. Ella stessa portò all' Accademia le sue mani nella sua tasca, di dove le cavò con uno de' suoi tronconi, de' quali ella si serviva con assai di destrezza. Erano esse nere, e asciutte, come le mani di una piccola mummia.

## O S S E R V A Z I O N E V.

CAMERARIO (1) racconta di una cancrena venuta al piede di un uomo in età di 70. anni, e che si avanzò appoco appoco fino nel mezzo della gamba, ove si terminò. Il piede si distaccò da se, tutte le carni cancrenate della gamba si separarono anche esse in appresso, e le ossa, che restarono scoperte, si separarono cinque mesi dopo a due dita sotto il ginocchio, in uno sforzo che fece il malato.

## O S S E R V A Z I O N E VI.

TROVASI nell' Efemeridi di Alemagna un esempio di una cancrena secca, che sopravvenne ad una diarrea accompagnata da angoscie, e sincopi. La cancrena principò da dolori violenti, con infiammazione al piede sinistro, e si manifestò con delle macchie livide, simili a quelle, che vengono allo scorbuta. Questa cancrena fece svanire tutti gli accidenti, e terminò la malattia; la mortificazione si limitò nel piede, e la natura ne fece da se l' amputazione quattro anni dopo.

La fatica, e gli esercizi violenti possono anch' essi cagionar la cancrena, e lo sfacelo, per la gran perdita degli spiriti animali; ma principalmente le passioni di animo, come la collera, la tristezza, la paura, il terrore, ec., il che sarà provato dalle osservazioni seguenti.

[1] *Ephem. d' Allem. Cent. 6. Obs. 82.*

## O S S E R V A Z I O N E VII.

**U**NA persona di rango (1) in età di 50. anni in circa, avendo preso al lume della luna la sua ombra per uno spettro spaventevole, ne rimase in tal maniera atterrito, che nel momento medesimo, sebbene non si sentisse, le non un piccolo tremito, gli venne immediatamente un gran calore intorno allo scroto, che fu seguito ben tosto da un' infiammazione, indi dalla cancrena, e dallo sfacelo.

## O S S E R V A Z I O N E VIII.

**I**L Sig. QUESNAY (2) Medico Consultante del Re Cristianissimo racconta appresso VOLFIO, di un uomo, che battendosi con un altro, entrò in una tal collera, che uno delle sue braccia restò interamente immobile, e privo di ogni senso, quantunque vi si affondassero dentro degli spilli molto avanti nel braccio. Le conseguenze di una sì eccessiva passione non si limitarono a quest' accidente, imperciocchè quest' uomo ebbe degli attacchi di apoplezia, che lo misero in pericolo di perdere la vita; però fu guarito per mezzo de' rimedi i più propri a rianimare gli spiriti. Il suo braccio restò per otto, o dieci giorni come morto; ma finalmente il calore, il sentimento, e il moto vi si ristabilirono.

Quando si è determinato di far l'amputazione, ecco come bisogna contenersi.

Prima di far questa operazione bisogna fissare il luogo dove farla.

La regola generale è, che trattandosi di una coscia, deve tagliarsi più vicino al ginocchio, che si possa; se di una gamba, convien sempre tagliarla al luogo della giarettiera, cioè, sotto l' attraccagnolo de' muscoli Sartorio, Gracile interno, e Semi-nervoso, o Semi-tendinoso, per non tagliare l'estremità de' tendini di questi musco-

[1] Verduc, *Pathol. Chir. Tom. 1. pag. 201.*

[2] *Traité de la Gangrene, pag. 332.*

scoli; e se si tratta di un braccio, convien tagliarlo più basso, che sia possibile.

Questi son fatti di pratica, che non si erano ancora contrastati fino al dì d' oggi. Vi sono nulladimeno de' famosi Pratici, che si accordano intorno alla maniera di tagliar la coscia, ed il braccio; ma non già intorno a quella della gamba, contro la quale fra quelli, che esclamano, perchè si tagli vicino al ginocchio, quando non sia mortificato altro che il piede, SELINGEN celebre Professore Olandese dice, che il piede solo tagliar si deve sopra i muscoli, conservando tutta la gamba, e indi accomodandovi un piede artificiale di sua invenzione, che egli fa reggere con due piccole lastre di acciaio lisce, e sottili, che ei fa fermare a' lati della gamba con de' mastietti, ed egli assicura, che quando sia ben messo, è tanto stabile, che vi si può camminar sopra colla stessa facilità, come se fosse il piede naturale.

### *Dell' Amputazione della Gamba.*

Per far quest' operazione, dopo aver messo in ordine l' apparecchio, si pone il malato sulla sponda del letto mezzo coricato, e sostenuto da un assistente, che gli sarà dietro alle spalle con due altri per reggergli la gamba, che ha da tagliarsi, uno de' quali starà dalla parte esterna della coscia tenendola colle mani vicino al ginocchio; l' altro dirimpetto al malato con un ginocchio in terra, tenendogli la parte inferiore della gamba al pari della coscia. Un altro assistente ancora starà al lato dell' operatore per porgergli via via gl' istrumenti, e i differenti pezzi dell' apparecchio a misura, che gli faran di bisogno.

Dopo di questo, convien radere il pelo della parte superiore della gamba sei dita traverse in giù dal ginocchio, che è il luogo ove si taglia comunemente la gamba; diremo di passaggio, che quando si inculca di tagliar la gamba sotto l' attaccatura de' muscoli semi-nervosi, semi-membranosi, e gracili - interni, questo si è perchè scanfando in tal maniera l' aponeurosi de' detti muscoli, si prevengono le convulsioni, le infiammazio-

ni, e le copiose suppurazioni, il che si è veduto succedere, quando la detta aponeurosi venga a tagliarsi.

Per fare bene l' operazione, convien, che l' operatore offervi quattro cose essenzialissime; la prima, di assicurarsi bene del sangue, mentre che si fa l' operazione, perchè non l' impedisca di operare; la seconda, di conservar quanto più potrà della pelle; la terza, di tagliar bene il membro; e la quarta, di assicurarsi bene del sangue dopo l' operazione.

In quanto alla prima cosa essenziale, il Chirurgo si mette fra le gambe del malato, prendendo una specie di gomitollo alquanto lungo, e schiacciato, ovvero una compressa molto grossa, mettendola sotto il ginocchio nel poplite, come il luogo dove i vasi non son coperti se non dagl' integumenti, ed osservando in questo tempo di fargli tener la gamba alquanto piegata, affine l' ossa non restino scoperte dopo tagliata la medesima. Questo gomitollo, o compressa, sia sostenuta da un' altra compressa assai lunga per poter avvolgerla un giro, e mezzo intorno alla parte inferiore della coscia, e sopra questa compressa circolare si metterà un laccio doppio, che si fermerà alla parte anteriore della coscia, con un nodo semplice, e un cappio, lasciandovi uno spazio sufficiente per potervi far passare una lastra di osso, o di toro, ed il torcolare, che nel tempo dell' operazione si farà stringere per fermare il sangue. Siccome questo torcolare ordinario ha molti difetti, che sarebbe troppo lungo il descrivergli, preferiremo quello a vite del Sig. PETIT, comecchè questo non ha bisogno di esser tenuto.

Essendosi dunque bene assicurato del sangue per mezzo del torcolare; per bene eseguire la seconda cosa essenziale, l' operatore farà stender bene la gamba al malato, e farà tirare la pelle verso il ginocchio dall' assistente, che è situato alla parte superiore della gamba, affinchè ne resti più che si può per coprire il troncone; indi farà una legatura molto serrata con un laccio largo un pollice al di sotto della tuberosità della tibia, immediatamente al di sopra del luogo, dove si ha da tagliar la gamba, per agevolar l' operazione, con fermar bene le carni.

Per ben eseguire la terza cosa essenziale, l' operatore coprirà con una salvietta tutta la parte inferiore del-

della gamba , e mettendo un ginocchio in terra , porterà la man destra sotto la gamba del paziente , per prendere il coltello falcato , che gli verrà somministrato dall' astante , e avendolo impugnato , ne poserà il tagliente sull' angolo interno della tibia , più addentro , che ei potrà , e comincerà di lì l' incisione circolare ; osservando di farla un pollice più basso dal luogo , dove si propone di segar l' ossa . Il costume , che hanno la maggior parte degli operatori , di tener la man sinistra distesa sulla schiena del coltello per reggerlo nel far quest' incisione , è molto difettoso , ed inutile ; perchè nel tagliar che fanno la pelle , che cuopre la tibia , non si vede altro , che una mano sulla costola del coltello ; di più , coprendolo quasi affatto , impedisce loro di veder quel che fanno ; oltre di che non vi è tanto bisogno di pigiar troppo sul dorso di un coltello , il quale deve tagliar bene , per l' effetto , a cui è destinato .

Convien dunque , secondo il savio consiglio del Sig. de GARENGEOT , che l' operatore dopo aver impugnato il coltello , e posone il tagliente , come si è detto , metta l' estremità posteriore , o carnosa del pollice della sua mano sinistra , sulla superficie anteriore dell' ultima articolazione del dito indice , in maniera che i due diti così accostati l' uno all' altro vengano a formare una specie di scanalatura , nella quale la costola del coltello si trova tenuta un dito distante dalla sua punta . Questa maniera di tenere il coltello è graziosa , e contribuisce assai a condurre l' istrumento unito , leggero , con sicurezza , con grazia , e senza tentenarlo nell' atto che si taglia .

Convien osservare , che la mira dell' operatore essendo di lasciar quanto più si può della pelle , affin di coprire il troncone che resta , non convien seguire il metodo di quelli che taglian tutta ad un tratto la pelle , ed i muscoli . In questo metodo restan sempre due dita di osso scoperte , e dalla pelle all' estremità dell' osso tagliato vi son talvolta cinque , o sei dita di distanza ; per evitar quest' inconveniente , l' operatore farà l' incisione circolare in due tempi , che vale a dire , taglierà prima solamente la pelle , e dopo averla tagliata , la farà tirar in su verso il ginocchio dall' astante , che tiene abbracciata colle mani la parte inferiore della co-

scia , e con questo verranno a scoprirsi i muscoli più di due dita traverse . Dopo di questo l' operatore taglierà nella stessa guisa le carni più rasente , che potrà alla pelle , inclinando obliquamente il tagliente del coltello verso la parte superiore del membro , con questa precauzione la pelle si troverà più lunga , che i muscoli ; ciò che renderà la cura considerabilmente più breve . Nel far quest' incisione l' operatore osserverà di tenere la man sinistra sulla gamba , quando sarà arrivato a i muscoli gemelli , al solare ec. per aver più forza di tagliarli , e alzandosi nel tempo , che ritorna in su col coltello , verrà a tagliare la parte interna dalla gamba fino al luogo , donde ha cominciato , e così ritto come è , girerà intorno il coltello un' altra volta per tagliar tutto ciò che può ritrovarsi alla circonferenza della tibia , e della fibula .

Fatto ciò , lascerà il coltello falcato , per prenderne un altro piccolo , e dritto , col quale taglierà la carne , che resta fra le due ossa , torcendo alquanto la costola del medesimo verso la parte , che deve restare , per evitare di tagliare i vasi , il che potrebbe impedire di farne la legatura .

Col' istesso coltello convien raschiare il periostio , se non fosse tagliato , e tagliato che è , mandarlo verso la parte , che ha da tagliarsi , dopo di che si prende un pezzo di panno lino , che si farà già preparato lungo un piede , e largo sei dita , tagliato in maniera che formi tre capi , avendo osservato di non tagliarlo che fino a due terzi della sua lunghezza ; si applica sotto la gamba , in maniera che i due capi laterali vengano ad abbracciare le carni da ciascuno de' lati , e quello di mezzo resti sotto la gamba . Indi l' operatore farà tirare in su tutti tre questi capi verso il ginocchio dall' assistente , che tiene la parte inferiore della coscia , e con questo mezzo tirando in su le carni , verranno a scoprirsi molto l' ossa , e l' operatore potrà tagliarle più addentro , per poter ricoprirsi più facilmente dopo l' operazione .

Fatto ciò , si prende la sega colla man destra , posando la sinistra sulla gamba , si comincia a segare più rasente alla carne , che si può , sull' angolo esterno del-

la tibia : indi piegando alquanto la sega verso la fibula segnerà tutte due l' ossa in un tempo a gran tirate ; ma leggermente , osservando di non pigiar troppo la sega , perchè non entrino i denti nella sostanza dell' osso , e vi si termino ; per lo che si dura fatica a segare , e non si sega , se non a sbalzi , ed a scosse . Convien segare in maniera , che la fibula sia la prima ad esser legata , e si finirà per la tibia , che deve servir di appoggio alla fibula , o almeno in maniera che si trovino segate tutte e due insieme ; e a misura che si sega , si fa piegare alquanto la gamba dall' assistente , che la tiene nella sua parte inferiore , per facilitare la strada alla sega raccomandandogli di comprimere fortemente la fibula contro la tibia , per impedire di vacillare nel tempo che si sega ; il che potrebbe cagionare delle dilacerazioni fra i muscoli ; ma questa precauzione non può aver luogo ne' grandi fracasii degli ossi , nè quando vi è carie . In questi casi quando si sono tagliate le carni , che si trovano fra gli ossi , conviene avanti di segarli , legarli insieme con un nastro di refe assai forte , che si annoda , o si fa annodare da un assistente . Questo legame avvicina la fibula dalla tibia ; e le fissa di una maniera , che facilita molto l' azione della sega .

Tagliata che sia la gamba , si leva quel pezzo di panno lino , che teneva in su le carni , si fa piegare alquanto il ginocchio , si rallenta il torcolare , se sia quello del Sig. PETIT , o se sia il torcolare ordinario , lo farà rallentare alquanto da quello , che lo tiene , affine di scoprire dallo sbocco del sangue il luogo dell' arterie .

Per assicurarsi bene del sangue dopo l' operazione , che è la quarta cosa essenziale ; dopo aver bene osservato il luogo de' vasi aperti l' operatore prenderà un ago curvo con del filo incerato , infilato a due , o tre doppi , il quale farà passare nella carne allato dell' arteria ; osservando di prenderne il meno che farà possibile , per non comprendere nella legatura alcuna parte tendinosa , o aponeurotica ; il che cagionerebbe ( secondo il parere del Sig. MONRO celebre Chirurgo ) degli accidenti pericolosi . Indi tirando l' ago , lo farà passare un' altra volta nella medesima maniera dall' altro lato del

del vaso , e lo ritirerà similmente in modo , che questi due punti di ago vengano a far quattro fori , che rappresenteranno un angolo ; allora annoderà il filo a due nodi senza mettervi le piccole compresse , secondo il metodo di alcuni ; e con tal mezzo il vaso , che ne resta circondato , si trova collegato colle carni , che lo circondano , e compresso esattamente , e morbidamente . Bisognerà fare il medesimo lavoro a tutte le altre arterie , che vi si trovano .

Nel far la legatura delle arterie , il Sig. de GARENGOT raccomanda al contrario di prendere molta carne nella legatura , e per questo l' operatore deve ( dice egli ) servirsi di un ago molto curvo , il quale farà passare bene avanti nella parte muscolosa , se però il luogo lo richiede ; avvertendo che i giovani Chirurghi devono far molto caso di quest' osservazione , perchè questo è uno de' punti principali dell' amputazione ; conciossiachè se la legatura venisse ad allentarsi , o non essendo ben fatta , si lacerasse l' arteria , ne sopravverrebbe un' emorragia tanto più da temersi , quanto che quando è stata lacerata l' arteria , non è possibile di farne la legatura .

Fatta la legatura secondo il metodo , che l' operatore giudicherà più conveniente per fermare il sangue , si allenta di nuovo il torcolare , e se il sangue non spilla più , si applicherà immediatamente l' apparecchio con molta diligenza . Altre volte questo apparecchio era molto composto ; ma oggidì si è ridotto ad una somma semplicità ; eccone la pratica . Sulle legature de' vasi si mettono delle piccole compresse ben grosse , o degli stucchi in assai gran quantità per fare un risalto al di sopra degli ossi ; sul resto della carne si mettono de' piumacciuoli ben grossi , o delle fila asciutte ; dopo di questo vi si applica sopra una compressa quadrata a più doppi , poi una compressa a croce di Malta semplice , che venga co' capi ad abbracciare il ginocchio , e dopo un' altra compressa quadrata più grande della prima , e finalmente una seconda compressa a croce doppia , che abbracci similmente co' capi il ginocchio , e indi si mettono due fasciuole lunghe in croce , ed una terza in giro , e sopra il tutto la fascia . Applicato l' apparecchio si fa coricare il malato nel suo letto , e se gli fa tenere il suo troncone sopra un guanciale alquanto sollevato .

to . Si fa stare un assistente accanto al malato , che tenga una mano sotto il troncone , e l' altra sul ginocchio , affine di tener pigiato l' apparecchio contro i vasi .

Si potrebbe rendere l' apparecchio dell' amputazione ancora più semplice , meno difettoso , e più proprio a secondare l' intenzioni dell' operatore , che sono di riaccostare le carni , e la pelle verso il troncone per ricoprirlo il più che sia possibile . Per ciò fare , dopo di aver guarnita la piaga di fila asciutte , si mette una compressa lunga sopra il tragitto de' vasi , e si applica una fascia di su in giù per ricondurre le carni , e la pelle verso l' estremità del troncone ; gli ultimi giri di questa fascia deono finire un pollice al di sopra del livello della piaga . Si applicano in appresso delle fascie unitive ; cioè a dire , sei capi di fascie più , o men larghi secondo la grossezza del troncone . Tre di queste fascie avranno un' apertura nel loro mezzo a guisa di occhiello , per passarvi gli altri tre capi di fascia . Si prende una di queste due fascie così passate l' una nell' altra , facendo tenere da un assistente un capo dell' una da un lato del membro , e un capo dell' altra dalla parte opposta , di modo che il mezzo di queste due fascie venga a trovarsi nel mezzo del troncone ; poi tirando le due estremità di queste fascie , una da una parte , e l' altra dall' altra , come due capi di una fascia unitiva , si riaccosta la pelle verso il troncone , conducendo ogni capo in uguale distanza l' uno dall' altro sotto le dita dell' assistente . L' applicazione degli altri capi intrigati a due a due l' uno nell' altro , si farà nell' istessa maniera , ponendoli a guisa di stella sopra il troncone . Questa fasciatura unitiva riaccosta a maraviglia le parti molli verso il centro del troncone , e fa un punto di appoggio circolare , che coopera molto all' effetto de' topici , che si possono impiegare per fermare il sangue . Si mette per di sopra una fascia circolare , per mantenere tutto l' apparecchio , e si cuopre finalmente il troncone con un berretto di lana , come lo raccomandano i Sigg. MONRO , e le DRAN .

Mi lusingo , che il Lettore mi saprà buon grado , che io gli comunichi un estratto della dichiarazione di un topico atto a fermare il sangue dell' arterie , senza legature , fatta dal Sign. BROSSARD Chirurgo della  
Cha-

*Chatre* nel Ducato di *Berry* all' Accademia Reale di Chirurgia di Parigi, e pubblicata dall' istessa Accademia l' anno 1750., arrecando due esempj della riuscita del suo rimedio; uno sopra un Soldato a cavallo del Reggimento della *Rochebonne*, a cui gli era stata tagliata l' arteria radiale, assieme col tendine del muscolo dell' istesso nome da una sciabla; l' altro sovra un Contadino, a cui il Sig. *BROSSARD* aveva fatta l' amputazione della gamba. Ecco la dichiarazione fatta dall' Accademia.

Noi sottoscritti Professori di Chirurgia, deputati dal Sig. de la *MARTINIERE* primo Chirurgo del Re per ricevere la dichiarazione del Sig. *BROSSARD* intorno al rimedio, che è stato adoperato con successo, per fermar l' emorragia senza legatura in un' amputazione della gamba, fatta dal Sig. *Bouquet* il giovine allo spedale degli invalidi; in due amputazioni fatte dal Sign. *FAGET* il maggiore, allo Spedale della Carità, ed in un aneurisma al braccio, di cui fu fatta l' operazione dal Sig. *MORAND* dentro alla città di *Parigi*, tutto in presenza del Sig. de la *MARTINIERE*.

Attestiamo, che dal detto Sig. *BROSSARD* ci è stato mostrato un pezzetto preparato di una specie di fungo, che nasce sulle vecchie quercie, il quale ci ha egli assicurato, essere il suo segreto, e che avendolo richiesto, che ci facesse vedere la pianta naturale, e la maniera, con cui la prepara, diede a noi le seguenti notizie.

Primo, ci presentò molti Agarici, *Agaricus pedis equini facie*. *Instit. R. H.* 562. *Fungus in caudicibus nascentis unguis equini figura*. *C. B.* pin. 372. *Fungi ignarii* *trag.* 945. così chiamato, perchè se ne fa dell' esca.

Pretende il Sig. *BROSSARD*, che quello, che nasce sulle quercie antiche, quando sono state diramate, sia il migliore, che bisogna coglierlo nel mese di Agosto, o di Settembre, e tenerlo sempre in luogo asciutto.

Secondo, per servirsene, se ne fa la seguente preparazione. Si leva con un coltello la scorza bianca, e dura, sino a una sostanza fungosa, che a toccarla pare una pelle di dante; si separa col coltello questa sostanza della parte fistolosa, e più dura dell' Agarico; si taglia a pezzetti più, o meno grossi; si battono con un martel-

tello per ammorbidire la sostanza fungosa a segno di poterli strappar facilmente colle dita.

Per servirsene, si prende uno di questi pezzetti così preparati, più grande dell' orifizio dell' arteria aperta, e vi si applica sopra dalla parte opposta alla scorza; sopra il primo pezzetto se ne mette un altro più grande, e sopra di essi un apparecchio convenevole.

Il Sig. BROSSARD si è servito talvolta per questo effetto di una polvere grossolana, fatta della parte dell' Agarico, che resta sotto la sostanza fungosa, quando è tarlata; ma non bisogna confidar nell' effetto di questa polvere, come della sostanza fungosa; anzi ci raccomanda di osservare, che questa non sia punto intaccata dal tarlo.

Tale è la dichiarazione fatta dal Sig. BROSSARD a Parigi il 7. di Maggio 1751. sottoscritta: de la MARTINIERE, MORAND, FOUBERT, BROSSARD.

Per questa dichiarazione il Re ha accordato al Sig. BROSSARD un premio, e una pensione.

P. S. Il successo verifica quotidianamente l' utilità di questo rimedio.

Vi sono de' Periti, che dopo fatta l' amputazione, lasciano al suo luogo il torcolare rallentato, per serrarlo in caso di emorragia intanto che si va a cercare il Chirurgo.

Si prescriverà al malato una regola di vivere molto esatta, se gli faranno delle cavate di sangue più, o meno secondo il bisogno, e secondo le forze del medesimo, e così si impedirà la febbre, le convulsioni, il delirio, ec. che cagionano spesso volte la morte.

Il Sig. VERDUIN famoso Chirurgo Olandese, ed il Sig. SABOURIN celebre Chirurgo di Ginevra, nella fine del passato secolo, proposero ambidue nel medesimo tempo un altro metodo di far l' amputazione della gamba, e la chiamarono amputazione a *Gherone*, o sia a *Lembo*, perchè nel farla si viene a conservare una porzione de' muscoli Gemelli, e Solare, e la pelle, che la cuopre.

In questo metodo, dopo aver situato il malato, e fermato il sangue per mezzo del torcolare, si fa alla pelle, e al grasso sulla tibia, e la fibula, due dita traverse, al di sotto della tuberosità della tibia, un' incisione.

**ione** semicircolare . Si fa entrare al lato inferiore della gamba, in una estremità dell' incisione, un coltello piatto a due taglienti, e si fa uscire all' estremità dell' incisione opposta . Indi, portando il coltello verso il piede, si tagliano i muscoli fino al tendine di *Achille*, di modo che colla polpa della gamba si viene a formare un gherone, col quale si cuopre il troncone dopo che si sono segate l' ossa . Il Sig. de la FAYE dà grandi vantaggi a questo metodo, dicendo (1), che il gherone essendo applicato sull' imboccatura dell' arterie, ne ferma l' emorragia, e dispensa per conseguenza di far la legatura a' vasi ; non succede l' esfoliazione degli ossi ; la ferita è molto più piccola, che nell' amputazione ordinaria, la suppurazione è per conseguenza minore, e la cura molto più breve .

Si mettono sulla ferita molti piumaccioli, e sul gherone una compressa a più doppi, un cerotto in croce, ed una piccola piastra concava . L' apparecchio è sostenuto da una fascia alquanto ferrata, perchè il gherone si applichi esattamente sopra il moncone, e sull' imboccatura de' vasi . Si lascia il torcolare in situazione, allentandolo però assai, perchè una piccola quantità di sangue vada a conservare la vita del troncone . I grandi vantaggi, che il Sig. de la FAYE attribuisce a questo metodo, trovansi però smentiti da una succinta esfoliazione, che il Sig. *Louis* fa di questo metodo di far l' amputazione (2) .

### *Dell' Amputazione della Coscia .*

L' Amputazione della coscia, come tutte le altre, non deve farsi, che ne' casi, che abbiamo sopra descritti, quando, cioè, è inutile ogni altro ajuto dell' arte . Convienne, prima di farla, mettere in ordine l' apparecchio, e questo non è differente da quello della gamba, se non che i pezzi, che lo compongono, sono alquanto più grandi .

Si

(1) *Cours d' Oper. de Chir. de Dionis* 4. Edit. pag. 758.

[2] *Mem. de l' Acad. R. de Chir. Tom. 11. Part. v. pag. 409.*  
*et suivant.*

Si mette l' infermo alla sponda del letto , se gli rade bene il pelo alla parte media , ed inferiore della coscia , affinchè il cerotto glutinoso , di cui dobbiamo far uso , non si attacchi al pelo ; e fatto questo l' operatore , che sarà situato alla parte esterna della coscia , applicherà il torcolare , stringendolo tanto da fermare il corso del sangue ; anzi vi è chi ne applica due per maggior sicurezza , perchè mancando l' uno supplisca l' altro . In questa operazione conviene osservare di applicare il gomito alla parte interna , e media della coscia , ed il torcolare alla parte esterna , come altresì , che la coscia resti a linea parallela al corpo , affinchè i muscoli dopo l' operazione , nel ritirarsi non vengano a scoprire l' osso . Per ovviare maggiormente a tale inconveniente , si farà tirare la pelle in su da un assistente situato alla parte superiore della coscia ; indi applicherà un laccio ben serrato intorno alla coscia , alquanto al disopra del luogo dove si deve far l' incisione , per tenere ferme le carni , durante la sezione circolare , ponendo un secondo laccio al disotto del luogo , dove si deve fare l' amputazione . Per mezzo di questi lacci la pelle , e le carni saranno tenute più ferme , e l' incisione circolare sarà più facile , e più regolare .

Dopo di ciò , l' operatore passando la man destra sotto la coscia del malato , prenderà il coltello curvo in maniera da non esser veduto dall' infermo , e ne metterà il tagliente verso la parte anteriore , ed esterna della coscia , due dita distanti dal ginocchio , come il luogo , in cui si taglia ordinariamente la coscia , poi farà l' incisione circolare , osservando le circostanze medesime , che nell' amputazione della gamba . L' operatore osserverà ancora di far questa sezione in due tempi , tagliando prima la pelle , che avrà prima fatta tirare ( come abbiamo già detto ) verso la parte superiore della coscia , avendovi applicato un laccio per tenerla ferma , due dita distanti dalla rotola , tagliando ( come si è detto ) prima la pelle , e il grasso , e di poi i muscoli , più rasente che potrà alla pelle .

Fatto ciò , bisogna avere la precauzione per prevenire il risalto dell' osso , che sarebbe inevitabile senza quest' attenzione , di levare il laccio situato alla parte superiore del luogo , dove si deve tagliar la coscia , per  
fer-

fermare le carni , subito dopo fatta la sezione delle parti molli . Allora i muscoli essendo in libertà , si ritireranno , muteranno situazione ; si potranno allora tirar su le carni colla compressa fessa , o portare il gammaut sopra il muscolo crurale , e tagliare il punto di aderenza de' muscoli vasti , e del tricipite colla spina posteriore del femore . Quest' attenzione , che sembra esser tutta semplice , non ne diminuisce la sua importanza , nè la sua solidità , poichè dà la facilità di poter segare l' osso tre dita traverso più alto , che non si sarebbe fatto , se si fosse segato al livello delle carni fermate dal laccio senza levarlo ; e con questo mezzo si previene ( come si è detto ) il risalto dell' osso , essendo questo uno de' maggiori inconvenienti , che possono sopraggiungere dopo l' amputazione delle grandi estremità .

Levato dunque il detto laccio si prenderà il pezzo di panno lino fesso , per tirar su le carni , come nell' amputazione della gamba ; e avendo l' operatore fatto col gammaut le sezioni suddette , e raschiato il periostio , segnerà l' osso a gran tratti ; ma leggermente stando sempre firuto alla parte esterna della coscia .

Se malgrado tutte le precauzioni prese per prevenire il risalto dell' osso dopo l' amputazione , questo succedesse , bisognerebbe venire a una seconda amputazione del pezzo d' osso , che sporge in fuori , all' imitazione del Sig. VEYRET (1) Membro dell' Accademia Reale di Chirurgia , che dice , che dopo un' amputazione della coscia da lui fatta in due tempi , e con l' attenzione di tirar per bene in su la pelle , non impedì nulladimeno il risalto dell' osso , che sporgeva in fuori un dito traverso , il che lo determinò due mesi dopo l' operazione a far un' incisione alla cicatrice sino all' osso , e segarne in appresso la porzione , che sporgeva in fuori , il che riuscì secondo la sua intenzione , e n' ebbe il successo , che ne sperava .

Ma come non vi è Chirurgo un pò versato nella pratica , che non abbia sperimentato la difficoltà di tenere stabile la parte , mentre che si sega l' osso , anche nell' amputazione , ove il membro è intero , e dove vi è per

(1) *Mem. de l' Acad. R. de Chir. Tom. 11. Part. v. pag. 253.*

per conseguenza la facilità di sostenerlo con fermezza ; La ragione di ciò si mostra da se : gli astanti non fanno che de' punti di appoggio mobili ; e qualunque sia la loro cura di tener ferma l' estremità, sulla quale si opera , non possono impedire i moti , che si fanno involontariamente nell' articolazione del membro col tronco. A più forte ragione ci deve essere tal difficoltà a tenere stabile la parte , allor quando non vi è , che un risalto d' osso, che convien legare una seconda volta , per essere rimasto scoperto dopo l' amputazione , come spesso volte succede , benchè si siano prese ( come abbiamo detto ) tutte le precauzioni suddette , il quale risalto non dà che poco , o punto di presa per tenerlo. Il Sig. BERTRANDI Membro del Collegio Reale di Chirurgia nell' Università di *Torino* , e Pensionario di S. M. il Re di *Sardegna* , propuone un mezzo molto atto per tenera stabile, in simil caso, la parte, che deesi amputare, come si vedrà dall' osservazione seguente .

# OSSERVAZIONE I.

UN Ufficiale Piemontese non potendo guarire per cagione di un risalto d' osso , che gli era rimasto dopo l' amputazione di una coscia , fu deciso di segarglielo una seconda volta . Si provò in vano per fare quest' operazione ; ma non si potè tener ferma la parte. Il Sign. BERTRANDI propose un mezzo molto semplice, che riuscì, ed il quale d' allora in poi si è adoperato con successo . Questa è una macchina composta di un pezzo di legno perpendicolare posato solidamente sopra un piede . Questo pezzo di legno è incavato alla sua parte superiore, e forma una specie di forca . Questa incavatura fornisce all' estremità dell' osso un punto di appoggio invariabile , e tiene luogo di un astante . Quello , che avrebbe sostenuto il membro, deve al contrario appoggiar sopra il risalto dell' osso , finchè sia segato a mezzo , e allora non farà altro , che sostenerlo lateralmente . Con questa macchina l' osso non può vacillare , e si sega con una eguale facilità , che si segherebbe un bastone sopra un cavalletto .

Questo mezzo pare ragguardevole per la sua semplicità, e vi son molte occasioni, nelle quali potremmo

utilmente servircene. Nelle amputazioni ordinarie, una macchina costrutta sull' idea dell' *Ambi* di *Ippocrate*, per sostenere il membro, con un pezzo di legno, farebbe ottenere l' intento del Sig. *BERTRANDI*, e potrebbe essere impiegato al difetto degli astanti, o in vece di quelli, che per poca attenzione, e intelligenza sono sovente la cagione, che l' osso si spezza nel segarlo.

- In quanto alle legature dell' arterie, son le stesse che nell' amputazione della gamba; diremo solo, che tre sono l' arterie della coscia, che sogliono legarsi.

L' apparecchio adattato per quest' amputazione è prima un piumacciuolo sull' osso, indi un grosso pastello, o un gran tappo di fila, ovvero il gomitolto erniario su i vasi, come la compressione la più adattata, indi un gran piumacciuolo tondo sul troncone, e delle fila sopra, e un cerotto di *Andrea della Croce* a quattro capi, che cuopre il tutto, e che si fa incrociare sul troncone, con che non solo si tira la pelle; ma ancora passando su i piumacciuoli, gli tiene pigiati leggermente, e morbidamente sull' arterie; indi sul cerotto si mette il resto dell' apparecchio, che è il medesimo di quello della gamba, se non che i pezzi sono alquanto più grandi.

### *Dell' Amputazione del Braccio.*

Quest' amputazione non è molto differente da quella della coscia; si fa sedere il malato sopra una sedia, e gli si bendano gli occhi per togliergli la vista di un sì orribile, e dispiacevole spettacolo; e disposto prima l' apparecchio, l' operatore si mette dalla parte esterna del braccio, prende la grossa compressa, o sia il gomitolto del torcolare, e l' applica sulla parte interna, e media del braccio, sostenendola con un' altra compressa circolare, quando si serva del torcolare ordinario, sebbene quello del Sig. *PETIT* deve preferirsi per molte ragioni; indi si fermano le carni per mezzo di due legature, fra le quali si fa l' incisione circolare, avendo osservato tutte le circostanze, che abbiain detto nell' amputazione della coscia. Dopo questo l' operatore mette la man destra sotto il braccio del malato, per prendere il coltello

lo curvo, e continuerà ad operare, come nell' amputazione della coscia, osservando tutte le dette circostanze. Farà l' incisione circolare due dita distante sopra l' articolazione del gomito, e la farà in due tempi, essendo questa la miglior pratica, e per segar l' osso si conterrà, come nell' amputazione della coscia, osservando di levare il laccio, che teneva la pelle, e che ferrava la circonferenza della parte al di sopra dell' incisione circolare, subito fatta detta incisione, essendo questo un ostacolo allo scorcio de' muscoli; perchè, levato il detto laccio, l' azione de' muscoli allora non essendo più impedita, essi si ritireranno, e quindi l' osso si troverà bene scoperto, purchè si sia avuta l' attenzione di tagliare con un gammut le porzioni carnose aderenti all' osso, ed il periossio al livello delle fibre, che la contrazione avrà il più riaccostate dal loro attaccagnolo superiore; con questo mezzo si avrà il vantaggio di segare l' osso un pollice più alto, che non si farebbe fatto, senza questa precauzione.

La legatura de' vasi si fa nella stessa maniera, che nell' amputazione della gamba, e tre sono per l' ordinario nel braccio l' arterie, che hanno da legarsi.

Fatte tutte le legature, si allenta il torcolare, si asciuga il troncone con de' pezzetti di panno lino, e quando non esce più sangue, vi si applica l' apparecchio, cominciando dal metter varj turaccioli di fila sovra tutte le arterie, un piumacciuolo asciutto sull' osso, distendendovi sovra delle fila asciutte, e de' piumacciuoli mezzati fatti, e su questo apparecchio si mette una compressa doppia, a guisa di *Croce di Malta*, badando di tener sempre una mano sul troncone per pigiare leggermente i vasi in faccia, il che conviene osservare in tutte le amputazioni. Sopra la *Croce di Malta* si mette una piccola compressa quadrata bagnata nell' acquavite, indi le fasciuole, che si faranno incrociare sul troncone, raddoppiando l' estremità della fasciuola, che trovasi alla parte interna del braccio, per comprimere alquanto il tragitto de' vasi, e fermandole con una terza fasciuola, che si avvolgerà in giro all' orlo del troncone, fermando il tutto con una fasciatura convenevole, che suol' essere la *Cappellina doppia*.

Per far questa fasciatura si prende una fascia lunga dieci , o dodici braccia , e tre dita larga , e posandone un capo sotto l' estremità del troncone dal lato interno, si comincia ad avvoltarla due volte intorno alla parte, una sopra l'altra, e di lì montando sulla spalla, si rivolta la fascia , e si scende per farla passare sulla estremità del troncone, per ritornare sulla spalla . Si scende di nuovo dalla parte opposta, dove si è rivolta la fascia, per venire a fare una incrociatura sul troncone, e formare la *Cappellina semplice* : si faranno due altre voltate, ma pel verso contrario alle prime, venendo con questo a formare un' altra incrociatura sul troncone, osservando di coprir per bene gli angoli, con che viene a formarsi la *Cappellina doppia* ; si fa indi passare la fascia sotto l' ascella opposta , e si ritorna sulla spalla del braccio tagliato, indi si scende obliquamente verso il troncone, e di lì cominciando a dar delle voltate alla fascia intorno alla parte, l' una sopra l'altra finchè si arrivi alla spalla ; e se avanza della fascia, si ritorna sotto l' ascella opposta , e di lì di nuovo sulla parte superiore del braccio tagliato per fermarvela . Lo stesso si fa per l' amputazione del cubito, eccettuato che non si passa la fascia intorno al corpo .

### *Dell' Amputazione del Cubito .*

L' amputazione del cubito è quella , che riesce più difficilmente di tutte le altre , a cagione che dalla sua parte media sino all' inferiore egli è composto di una gran quantità di tendini ; di modo che l' amputazione fatta in quel luogo , lascia gli ossi scoperti, il che rende la cura lunga , e penosa .

Per far quest' operazione, dopo aver messo in ordine l' apparecchio, si fa sedere il malato sopra una sedia, gli si bendano gli occhj , e si applica alla parte interna, e media del braccio il guancialetto, o sia la grossa compressa del torcolare , fermata con una fascia circolare, e sopra a questa si accomoda il laccio del torcolare .

Per far con vantaggio la prima incisione, si porrà diviatamente la legatura inferiore, osservando le medesime pre-

precauzioni, che abbiamo indicate per la gamba, mentre che un assistente tirerà in su la pelle, più che potrà, impugnando colle due mani tutta la circonferenza del membro, l'operatore applicherà il laccio, un pollice almeno più basso dal luogo, dove si è determinato di segare gli ossi. Egli farà al di sopra di questo laccio un' incisione circolare, mentre che l'assistente farà sempre occupato a tirar la pelle verso il gomito. Si applicherà in appresso la legatura superiore per tenere ferme le carni, e la pelle così alzate, affin di tagliar queste parti, come lo diremo in appresso. Per far queste incisioni, l'operatore farà posto alla parte esterna del braccio, facendo tenere ad un assistente la mano, e ad un altro sotto il gomito, e da altri l'infermo che non si muova; e passando la mano destra sotto il braccio del malato, prende il coltello curvo, che gli è dato da un assistente, e fa la sua prima incisione circolare, secondo le regole sovra descritte, due dita sopra il polso, principiando sul *Raggio*, e in due tempi, come abbiain detto nell' amputazione della gamba, osservando le medesime circostanze. Fatte le due incisioni, cioè a dire, la pelle, e le carni tagliate, si prende un piccolo coltello assai stretto per tagliar la carne fra gli ossi, e per raschiarli nel luogo, dove hanno a segarsi, osservando, ciò che abbiain detto, parlando dell' amputazione della gamba. Dopo ciò si prende la sega, e si comincia a segare facendo la traccia sull' *Ulna*, e piegandola poscia sul *Raggio*, si segheranno tutti due insieme, osservando di far comprimere fortemente il raggio contro l' ulna, come nell' amputazione della gamba, per le ragioni, che abbiamo dette, e perciò raccomandaremo, come una precauzione molto utile, di legare gli due ossi insieme con un nastro di rese stretto, e ben forte, come abbiain detto nell' amputazione della gamba. Potriam anche consigliare, come una precauzione utile, di legar questi due ossi, con un nastro, secondo il metodo del Sig. BERTRANDI. Si finirà di segare nell' ulna, perchè serve di appoggio al raggio, o almeno si finirà di segarli tutti e due insieme.

Allora si fa rallentare il torcolare, se si sia adoprato il torcolare ordinario, o si rallenta alquanto da se, se sia quello a vite; e dopo aver riconosciuto il luogo dell'

arterie , si rifera , e si fa la legatura di esse nella maniera che abbiamo detto , parlando dell' amputazione della gamba . Per facilitare la legatura dell' arterie , conviene prima di intraprendere l' operazione far torcere indentro la mano del malato , affinchè i vasi restino più scoperti ; ma se, malgrado tutte le precauzioni possibili , non si potesse fermare il sangue , allora con un ago dritto infilato con del rese forte incerato a più doppi , si passa fra l' ulna , e il raggio , due dita sopra al troncone , poi si taglia il filo , e si dividono i capi per metà , e avendo osservato da qual parte sono l' arterie , che gettano sangue , si mette una compressa grossetta fra i due capi del filo , e in questa maniera si legano i vasi ; l' altro capo del filo , se non fa di bisogno , si leva , e questa legatura non reca alcuno ostacolo alla guarigione . Si applica in seguito l' apparecchio , che è l' istesso che nell' amputazione della gamba , se non che i pezzi , che lo compongono , sono più piccoli .

Ci resta per terminare questo Capitolo il descrivere un' altra specie di amputazione , di cui il Manuale è molto differente da quello di tutte le altre . Procureremo di darne brevemente un' idea la più esatta , che sarà possibile . Quest' operazione si pratica all' articolazione dell' omero colla scapula , onde chiamasi *Amputazione nell' articolazione* .

### *Dell' Amputazione del Braccio nell' Articolazione .*

Quest' operazione ha luogo , quando la parte superiore dell' omero è fracassata , o quando la *Testa* , o il *Collo* di quest' osso è gonfiato , o cariato , o quando il braccio è ferito vicino alla scapula da un colpo di arme da fuoco . In tutti questi casi l' amputazione all' articolazione sarebbe necessaria ; ma il timore , che l' emorragia non facesse morire il ferito nell' operazione , ha sempre impedito i Chirurghi di intraprenderla .

Il Sig. MORAND il padre è stato il primo , che l' abbia messa in pratica con felice successo , e dopo di lui il su Sig. *le* DRAN il padre , la praticò anche esso felicemente . Ma quando anche non fosse mai stata fatta ,  
non

non si troverebbe ella autorizzata dall' accidente seguito a quel povero mugnajo , di cui il braccio , e la scapula furono con violenza separati dal tronco , da una corda , che essendosi attortigliata per caso intorno al suo pugno , fu ad un tratto portato via in aria da un mulino a vento ? Quasi tutta la Città di Londra fa questa storia , e che il malato fu guarito in capo a qualche settimane . Una circollanza molto notabile è , che dopo la mancanza che sopravvenne a quest' accidente , l' emorragia si fermò da se , e non ritornò più , quantunque non avessero messo sovra i vasi grossi altra cosa , che delle fila , e della trementina .

Per far quest' amputazione , conviene , come in tutte l' altre , assicurarsi del sangue , e siccome non possiamo servirci del torcolare , bisogna cominciar l' operazione con legare i vasi ; a questo effetto si fa sedere il malato , gli si bendano gli occhi , se gli alza il braccio , e dopo riconosciuto il tragitto de' vasi , si prende un ago infilato a tre , o quattro doppi di filo incerato , e si passa tre dita distante dall' incavatura dell' ascella , facendolo entrar per di sotto i vasi , ed uscire dal lato opposto ; indi si annodano i due capi per fermare il sangue ; si sente dipoi all' arteria sotto la legatura , se vi sia pulsazione , e se non vi si sente , si ferma la legatura con un altro nodo . Bisogna osservare , che l' ago sia molto curvo , e grosso , tagliente su i lati , e passarlo più rasente all' osso , che sia possibile , per timore di non intaccare i vasi .

Dopo questo si abbassa il braccio del malato , e tre , o quattro dita distante dall' *Acromio* , si fa col gammaut un' incisione trasversale , tagliando pel mezzo il muscolo *Deltoidè* , arrivando fino all' osso ; se ne fanno due altre lunghe tre dita , una alla parte anteriore , e l' altra alla parte posteriore , che restino perpendicolarmente sulla prima incisione , e che venghino a formar con essa una specie di brano , sotto il quale si porterà un gammaut per tagliare le due *Teste* del muscolo *Bicipite* verso il loro attaccagnolo superiore , e verso la capsula dell' articolazione .

Indi l' operatore prenderà con due dita della man sinistra la parte superiore della *Testa* dell' omero , per tirarla a se , e taglierà la capsula , e le altre parti non

tagliate ancora , osservando di non intracciare i vasi allacciati ; indi staccando affatto la testa dell' osso , esaminerà se la legatura è ben fatta , dopo di che finirà di staccare il braccio affatto , tagliando ciò che vi resta di carne , e di pelle , sotto la legatura per formarne un altro brano . Fatto questo farà un' altra legatura rasente al corpo , osservando di non comprendere in essa altro che i vasi , indi abbasserà il brano di sopra per coprire , e riempire la cavità della giuntura , tirando in su similmente l' altro brano di sotto per congiungerlo con esso , e quando i brani siano troppo grandi gli taglierà colle cesoje per accomodarli bene insieme , e taglierà in conseguenza la prima legatura , che resta inutile , dopo aver fatta la seconda . Se nel tempo dell' operazione qualche piccola arteria buttassee sangue , vi farà metter su il dito da un assistente , ed osserverà di lasciar fuori i capi del filo della seconda legatura per levarli via , quando verrà a separarsi ; metterà su i due brani accostati insieme molte fila asciutte , per ben accomodarli l' uno contro l' altro , come ancora in fondo alla cavità della giuntura , ed in quella dell' ascella , per fare un' esatta compressione su i vasi . Sopra queste fila si metterà un cerotto tagliato a *Crece di Malta* , e una compressa della medesima figura , fermandola con tre fasciuole , due delle quali si incrociano , e vanno fino all' altra spalla , e l' altra un pò più larga , i di cui capi vadano ad incrociarsi sulla spalla opposta , e il tutto sia sostenuto dalla fasciatura chiamata la *Cappellina a due lobi* , o *Capi* , per l' *estirpazione del Braccio* .

Per far questa fasciatura si prende una fascia lunga sedici braccia , e larga quattro dita , che si avvolta a due lobi ; da una parte alla lunghezza di tre , o quattro braccia , e dall' altra tutto il restante della fascia . Si comincia ad applicarla sotto l' ascella sana , e passandola intorno al corpo , si soprappongono i lobi sotto l' ascella inferma , in maniera che il piccolo lobo della fascia resti di sotto , il quale si rivolta passandolo sul mezzo del male , mentre l' altro lobo si avvolta intorno al corpo per farlo passare sulla spalla inferma , e soprapporlo al piccolo lobo , il quale di nuovo si rivolta sul male soprapponendosi a se stesso , e si ritorna col grosso lobo sot-

to l'ascella malata per passargli sopra un' altra volta ; e di nuovo si rivolta in su il piccolo, lobo sicchè venga a soprapponersi a se stesso dall' altra parte della prima passata , e così si continua , finchè non sia coperto tutto il luogo del male , impiegandosi il lobo piccolo sopra il male , ed il grosso intorno al corpo .

## CAPITOLO VI.

### *Dell' Operazione dell' Aneurisma :*

**L'** *Aneurisma* è un tumore contro natura , morbido , cedente al tatto , cagionato dalla dilatazione , o dall' apertura di un' arteria , e perciò partecipe della medesima pulsazione di *Diastole* , e di *Sistole* .

In due specie si divide l' *Aneurisma* , cioè , in *vero* , ed in *falso* ; il *vero* è quello , che si forma dalla dilatazione di qualche arteria , senza cangiar per lo più il color della pelle , senza calore , nè dolore , partecipando sempre del moto di *Sistole* , e *Diastole* , il quale però divien meno sensibile , a misura che ingrossa il tumore .

Il *falso* è quello , che viene prodotto dal trabocco di un sangue arterioso , in conseguenza dell' apertura di un' arteria , il che qualche volta accade nelle cavate di sangue dal braccio ; questo è livido , disteso , e spesso duro , non avendo pulsazione sensibile ; ma solo un rumore cupo , o un fremito , che aumenta , a misura che ingrossa il tumore .

GALENO , e tutti gli Autori Greci , e Arabi credevano , che tutti gli *Aneurismi* fossero prodotti da uno spandimento di sangue arterioso , a cagione di una rottura delle tuniche arteriose . PAOLO EGINETA ammetteva questa rottura ; ma riconosceva ancora un' altra specie di *Aneurisma* fatto per *anastomosi* , cioè a dire , per apertura . Ei supponeva altresì , che nell' uno , e nell' altro il sangue fosse sparso . FERNELIO è il primo , che abbia detto , non esser l' *Aneurisma* , che una dilatazione dell' arteria . FORESTO , DIEMERBROECK , e i Medici di quel tempo furono della medesima opinione . Di poi SENNERTO , BARBETTA , VILLISIO , REGI , e molti altri

tri credettero, che l' *Aneurisma* si facesse per la rottura della tunica interna dell' arteria, e che non vi fosse, che l' esterna, che si dilatasse. FREIND è di parere altresì, che oltre la dilatazione, vi sia rottura delle tuniche. (1) Egli considera, che di tutte le osservazioni arrecate sull' *Aneurisma*, non ve n' è alcuna senza rottura. Vero è, che ne' veri *Aneurismi* invecchiati si trovano sempre delle concrezioni sanguigne, o polipose, che per via delle continue pulsazioni, che soffrono, vengono finalmente in suppurazione, o in una corruzione sì acrimoniosa, che non solamente le tuniche dell' arteria dilatata ne sono rosicchiate; ma ancora gli ossi vicini ne sono cariati. Le costole stesse si sono trovate infette di carie da' funesti effetti degli *Aneurismi* dell' *Aorta*; se ne trovano degli esempi nelle Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze (2), nella Biblioteca Chirurgicale di *Manger*; nelle osservazioni del *Ruyfchio*, ec. Ma tutti gli *Aneurismi* veri principiano da una semplice dilatazione dell' arteria, e non da una rottura della sua tunica interna, che il sangue nel passare corroderebbe, e strapperebbe per mezzo della sua acrimonia, come l' hanno preteso gli Autori di sopra accennati.

Abbiamo diviso l' *Aneurisma* in due specie, cioè, in vero, ed in falso. Essi possono esser prodotti da cause interne, e da cause esterne. Il vero sopraggiunge ordinariamente a una grande agitazione, e a moti violenti, alle compressioni cagionate da tumori ossei, o umorali; possono cagionarlo ancora gli ascessi vicini all' arterie, o pel rilassamento, che producono in quei vasi, o per la marcia, che viene a corrodere la membrana esterna di essi; possono cagionarlo altresì le fratture colle scaglie, o punte d' osso, che lacerano la stessa membrana esterna dell' arteria, o la capsula, in cui è involta.

Le cause esterne dell' *Aneurisma vero* sono le ammaccature, le percosse, e le cadute, o la punta di qualche istrumento, che non faccia, se non che intaccar la membrana esterna dell' arteria.

Le

(1) Freind, *Histoire de la Medicine* pag. 74. & suivans.

(2) *Mém. de l' Acad. des Sc.* ann. 1712. pag. 17.

Le cause esterne, ed interne del *falso Aneurisma*, son l' istesse, che nel *vero*, cioè a dire tutto quel che è capace di pungere, troncare, rodere, lacerare, ec. come lancette, spade, ec. con questa sola differenza, che in questa specie di *Aneurisma* questi tali istrumenti aprono affatto l' arteria, e danno immediatamente un esito libero al sangue.

Chi vorrà una descrizione esatta di questa malattia, può vedere l' Istoria della Medicina del Sig. FREIND; se ne può vedere una spiegazione anche più esatta nelle Transazioni Filosofiche, num. 402. Si legge al num. 265. delle medesime Transazioni, l' osservazione seguente intorno ad un *Aneurisma* dell' *Aorta*.

### OSSERVAZIONE.

UN uomo avendo ricevuto un colpo violento nel petto, gli sopravvenne un' *Emorisia*, che finalmente lo fece morire: essendosi aperto il cadavere, si trovò un *Aneurisma* dell' *Aorta* sì considerabile, che riempieva tutto il lato destro del petto.

L' *Aneurisma*, che sopravviene alle parti esteriori del corpo, non è per se stesso pericoloso, se non quando egli è creduto da' Chirurghi imperiti un ascesso suppurato, e che aprendolo temerariamente, i malati rendono fra le mani di tali Chirurghi l' anima assieme col loro sangue.

I Giovani Chirurghi devono dunque andar bene cautelati nell' aprire i tumori per non ingannarsi, prendendo un tumore aneurismatico per un tumore umorale; come racconta PAREO di un tumore nella spalla, che fu aperto ad un Prete, il quale morì dall' emorragia, che ne sopraggiunse, prima che il Chirurgo potesse arrivare in tempo a rimediare.

Il medesimo accidente successe ad una ragazza d' *Ipri* Città della *Fiandra*, che da sette anni aveva un *Aneurisma* alla piegatura del braccio, cagionato da una cavata di sangue. Il tumore era grosso, quanto un uovo di gallina, e duro come una cartilagine, eccettuato un piccolo luogo, dove si sentiva della morbidezza. Tre Chirurghi furono di parere di aprirlo; ma il tumore essendosi aperto, non poterono fermare l' emorragia, e l' infer-

ferma morì poco tempo dopo. Egli è ben vero, che in quel tempo non era ancora in uso il torcolare, che dà tutto il comodo, che bisogna per scoprire l'arteria, ed allacciarla, che è il più sicuro mezzo per fermare il sangue, che impiegar si possa in qualunque congiuntura, quando è lecito di porlo in pratica.

Due sono i mezzi, che l'Arte somministra per la guarigione dell' *Aneurisma*; il primo la fasciatura, e da questo sempre cominciar si deve, per quanto lo permette la grandezza del male; ed il secondo è l'operazione.

Quando si è avuta la disgrazia di forare l'arteria nel fare una cavata di sangue, conviene, senza spaventarsi, osservare se il foro dell'arteria corrisponde esattamente all' incisione della pelle, il che si riconosce, quando il sangue esce a pieno spillo senza formar tumore alcuno intorno al luogo del taglio esterno; quando ciò sia, si lascia uscire il sangue, finchè il malato si svenga, per aver la libertà di applicare un apparecchio convenevole nella maniera, che diremo in appresso. Se poi al contrario l'apertura della pelle non corrisponde a quella dell'arteria, il che si riconosce dal sangue, che nell'uscire urta nella pelle, e si spande intorno al taglio, aumentandosene il tumore a misura che il sangue sgorga; in tal caso si farebbe un grave fallo, lasciando uscire il sangue, finchè l'infermo venisse a svenirsi, perchè prima di ciò vi farebbe un trabocco di sangue sì grande, che ci obbligherebbe a venire all'operazione, imperciocchè quel sangue stravasato impedirebbe alla fasciatura di far compressione sull'arteria. Subito pertanto che si riconosce l'apertura della pelle non esser parallela a quella dell'arteria, l'unico rimedio è di fermare immediatamente il sangue per mezzo del torcolare, e applicarvi dipoi l'apparecchio seguente.

Si comincia ad applicare sul piccolo tumore prima di levar via il torcolare, o sul taglio, se si sia lasciato svenire il malato, un pezzetto di carta sugante masticata, e bene spremuta: ma al dì d'oggi, che conosciamo la virtù dell'agarico di quercie, o di faggio (1),  
sa.

---

[1] Nota. L'esperienza ha fatto conoscere, che l'agarico

farà meglio preferirlo alla carta sugante masticata, e sopra di questo una piccola compressa della larghezza dell' unghia, e su questa varie piccole compresse via via più grandi, finchè si conosca la loro altezza essere molto considerabile, perchè la fasciatura non venga a pigiare altra cosa, che il foro dell' arteria.

Si fa piegare un poco il cubito, affinchè, restando sempre nella medesima situazione, la fasciatura non si smuova (1). Questa fasciatura è la stessa, che si adopera nella cavata di sangue, se non che la fascia è molto più lunga; si tiene il braccio al collo, e si avverte il malato di non ismuoverlo in conto alcuno. Si lascia così per tre, o quattro giorni, se pure qualche accidente, come sarebbe la mortificazione, o l' emorragia, non obblighi a levar più presto l' apparecchio.

Tre, o quattro giorni dopo si distà l' apparecchio, e se si vede, che la carta masticata, o l' agarico sia attaccato ancora al taglio, non bisogna toccarlo, anzi si torna a rimetter l' apparecchio, e si aspetta a levarlo ancora due, o tre altri giorni; se il foglio, o l' agarico viene a cader da se, egli è un buon segno; ed allora quando si vede colare dall' apertura qualche poco di marcia, vi si mette un liquore balsamico, e spiritoso, e non mai niente di umido, nè d' oleoso. Si raccomanda all' infermo di continuare il riposo, e non farà male il cavargli sangue due, o tre volte dall' altro braccio.

Se

rico di faggio è buono per fermare il sangue, quanto quello di querce. Egli è importantissimo il sapere, che quello di querce è rarissimo, e che quello di faggio è molto comune, essendo lo stesso, con cui si fa l' elca.

- [1] *Nota*. Come questa fasciatura ha degli inconvenienti, in vece sua il Sig. *Foubert* ha inventato un istrumento molto atto per far una compressione esatta solamente sull' apertura della arteria, senza comprimer la circonferenza del braccio. Vedetene la descrizione nell' *Accad. Real. di Chir. Tom. 1. art. vi. pag. 268.*

Se otto, o dieci giorni dopo una cavata di sangue, si scuopre un tumore grosso quanto una nocciola con pulsazione distinta, possiamo esser certi, che questo è un *Aneurisma vero* cagionato dall' apertura della cassula, o della guaina, che rinchiede l' arteria. Ora l' ernie di qualsivoglia specie elle sieno, si guariscono spesse volte per mezzo della compressione, e della fasciatura; ma conviene prima rimetterle. In questo luogo ancora prima di far la compressione, e la fasciatura, conviene rimettere il tumore aneurismale, e rimesso che sia, non si leva il dito di sopra, che non vi resti immediatamente il turaccio di foglio masticato, o l' agarico preparato, indi la piccolissima compressa, e le altre compresse graduate, e per di sopra la fasciatura suddetta.

Quando si parla dell' ernia dell' arteria, deve intendersi di quella specie di *Aneurismi* formati di fresco, di un piccolo volume, che succedono alle cavate di sangue, e in cui la cassula è stata aperta in maniera da lasciare il passo all' arteria a misura, che ella si è dilatata; imperciocchè se l' *Aneurisma* fosse cagionato dalla dilatazione di tutto il diametro dell' arteria, farebbe allora un assurdo il proporre di rimetterlo, anzi in quest' ultimo caso convien credere, che l' operazione sia il mezzo unico per guarirne.

Finalmente se la compressione, e la fasciatura, che sono i primi mezzi, che l' Arte ci somministra per guarire l' *Aneurisma*, non abbiano avuto luogo, e che al contrario l' *Aneurisma* sia molto cresciuto, o che di vero, che egli era sul principio, sia divenuto falso, o che in questo ultimo lo stravasamento del sangue minacci cancrena, convien ritolversi all' operazione.

Per farla, si pone il malato secondo la situazione dell' *Aneurisma*; se l' *Aneurisma* è al braccio, si metterà assiso sopra una sedia d' appoggio in faccia al lume, gli si farà tendere il braccio, come per una cavata di sangue, e si farà tenere in questa situazione da qualche assistente; dopo di che, l' operatore per mezzo del torcolare ferma il sangue nella maniera, che abbiam detto parlando dell' amputazione, e farà indi un' incisione sul tumore aneurismale, che non comprenda se non la pelle, cominciandola dal mezzo del cubito a scancio fino verso il condile interno dell' omero, con un *gammay*; indi

di farà de' piccoli tagli col medesimo sul corpo adiposo , e quando verrà a scoprire un pezzetto accagliato di sangue , farà assicurato che il sacco aneurismale è aperto . Allora vi metterà un dito sopra , e per mezzo di esso condurrà un pajo di cesoje curve , e spuntate per terminar l' incisione , la quale quando non paresse grande affai , per levar via tutto il sangue accagliato , e aggrumato , converrà farne un' altra , che si stenda dal mezzo della prima sino alla parte posteriore del braccio .

Quest' ultima incisione ha molti vantaggi , perchè non solamente dà più libertà per evacuare il sangue , ed asciugare la ferita ; ma ella rallenta altresì considerabilmente la pelle , vantaggio che non è di piccola conseguenza , poichè quest' ultima parte fa spesso volte uno strangolamento maggiore di quello , che possa fare ogni altra .

Avendo in tal guisa scoperto lo stravasamento , l' operatore con uno scalzatojo , o altro convenevole istrumento porterà via tutti i grumi del sangue accagliato , finchè non scuopra l' *Aponeurosi* del muscolo Bicipite , la quale ei taglierà nel suo attaccagnolo , procurando di fare avanti piegare il braccio al paziente , per rallentarla , ed impiegando a tagliarla un pajo di cesoje curve , e spuntate , condotte per mezzo di una tenta incavata , che egli introdurrà sotto l' *Aponeurosi* , la quale con tal mezzo egli solleverà , e taglierà un poco più alto , e in questa maniera verrà a rallentare lo strangolamento considerabile , che ella cagiona , tanto più riflettendo all' imbarazzo , che forma nascondendo tutti i vasi . Farà scolare indi tutto il sangue , che può essere nascosto sotto di essa , ed in appresso quello che era contenuto nel tumore aneurismale . Farà la legatura dell' arteria , affinchè dalla sua apertura non venga a gettar più sangue . Il Topico del Sig. BROSSARD essendo molto atto per fermare il sangue senza far legatura al vaso aperto , si dovrebbe mettere in uso in quest' operazione tanto più , che dispensandosi di legare il vaso , eviteremo con tal mezzo gli accidenti , che accompagnano qualche volta questa legatura . Il Sig. MORAND l' ha adoprato in simil caso con un successo felicissimo , come si vedrà dalla seguente osservazione .

## O S S E R V A Z I O N E I.

UN Uffiziale appartenente al Principe di Conty , fu mandato da S. A. S. al Sig. MORAND nel mese di Dicembre 1750. per essere curato da un *Aneurisma* , che avea al braccio destro , cagionato da una stoccata , che gli avea aperta l'arteria tre mesi avanti . Il tumore era grosso appresso appoco quanto i due pugni , e la pelle talmente tesa , che era per aprirsi .

Dopo aver preparato il malato per mezzo di due salassi , ed avergli fatto osservare per alcuni giorni un' esatta regoia di vivere ; il Sig. MORAND gli fece l' operazione l' ultimo giorno di Dicembre in presenza del Sig. de la MARTINIERE , e di una numerosa adunanza di gente dell' Arte . Avendo situato il malato , e posato il torcolare all' ordinario , aprì gl' integumenti , ed il tumore aneurismatico per mezzo di una grande incisione , levò i grumi , ed il sangue fluido contenuti nel sacco , scuoprì la ferita dell' arteria , che era aperta per lo lungo , dalla quale se ne vide zampillare il sangue , e si riconobbe , che il diametro naturale del vaso era aumentato almeno del doppio .

Dopo aver ben considerata l' apertura dell' arteria , e ferrato il torcolare , il Sig. BROSSARD mise il suo topico sulla ferita dell' arteria , e pregò il Sig. MORAND di applicarvi sopra l' apparecchio ordinario ; il successo di quest' operazione fu felicissimo , ed il malato non avendo avuto accidente veruno nel tempo della cura , fu in capo a un mese perfettamente guarito .

Se si adopra la legatura per fermare il sangue , per farla , si fa piegare alquanto il braccio al paziente , affinchè l'arteria venga a rallentarsi ; indi l'operatore introdurrà nell' apertura di essa un istrumento convenevole per sollevarla , tenendola dalla man sinistra nel tempo che coll' altra mano si separa l'arteria dal nervo , e dalla vena , che l' accompagnano , e quando sotto di essa vi sia un po di spazio , vi si introduce il detto istrumento per sollevarla ; si distacca alquanto al di sopra , e al di sotto dell' apertura , meno però che si può , a cagione de i rami collaterali .

Vi sono alcuni Professori , che non iscalzano punto l'arteria per farne la legatura ; ma solamente hanno la precauzione di separarla dal nervo , e passano indi un ago infilato con del refe incerato a più doppi per di sotto all'arteria , prendendo con essa la carne .

Quando si vuol legare l'arteria sola , si adopra un ago curvo con due , o tre doppi di filo incerato , che si fa passare sotto l'arteria dalla cruna , perchè passandolo dalla punta non si venisse a punger l'arteria , osservando ancora di non passarlo più là della metà della di lui lunghezza ; indi si taglia il nastrino di filo , e si tira l'ago donde si è messo , restando il capo del nastrino di filo dall'altra parte .

Seguitando uno di questi due metodi di far la legatura , si adoprerà uno de' due aghi inventati dal Sig. PETIT, che si veggono disegnati nella Tavola IV. degl'istrumenti indicati nelle annotazioni del Sig. de la FAGE nel corso di Operazioni di Chirurgia del Sig. DIONIS, disegnati colla lettera V e W . Il primo di questi aghi è curvo , il suo corpo è tondo , la sua testa è una piccola paletta con cui si tiene , la cruna è vicina alla punta , che non è acuta . Il secondo ago è piatto , alquanto larghetto , e incurvato , verso la punta vi sono due fori , che tengono i due capi del filo scostati , e la cima è spuntata .

Quest' ago per ordinario è di argento , o di acciaio . Passato che si è l' ago sotto l'arteria , e che la sua cruna è passata dall'altra parte , si taglia il filo , e si fa uscire dalla cruna ; si ritira l' ago dalla parte per la quale si è messo , e così si trovan sotto l'arteria due capi del nastrino di filo , co' quali si fanno due legature , una sopra l'apertura dell'arteria , e l'altra sotto .

Il secondo ago ha questo vantaggio , che i due capi del filo si trovano posti a' luoghi , dove deono farsi le legature . Si mette indi un piccolo involto di panno lino sottile sull'arteria , e sopra questo si fa la legatura , facendo prima un nodo semplice , e dopo questo un nodo doppio . L'istesso si fa alla parte inferiore , osservando , che il piccolo involto di panno lino vada da una legatura all'altra . Fatte le due legature , si allenta il torcolare per vedere se son ben fatte , che è quando il sangue non esce più . Indi si tagliano i fili della legatura sei dita distante dall'arteria .

*Tom. III.*

E

Vi

Vi sono degli Autori, che propongono una sola legatura fatta al di sopra dell' apertura dell' arteria, dicendo, esser questa sufficiente a fermar l' emorragia, e fra gli altri ecco quel, che ne dice il Sig. Dronis (1), „ Egli è inutile di fare una seconda legatura al di sotto dell' apertura dell' arteria; quando i nostri Antichi praticavan questo metodo, ignoravano il moto circolare del sangue; ma al presente che ne siamo assicurati, questa cognizione perfeziona le nostre operazioni, facendosi risparmiare molte inutili, e superflue circostanze „. Ma questo Autore, e i suoi partitanti non considerano certamente la comunicazione, che si trova fra l' arteria principale, e le arterie collaterali, che nella parte inferiore di essa vanno a scaricarsi; il che vien provato non solo dalla circolazione del sangue, e dalle iniezioni; ma dall' operazione istessa altresì; imperciocchè dopo fatte quelle legature, nell' allentare il torcicollo, si sente spesso volte al di sotto della legatura inferiore una specie di fremito, il che prova, che il sangue è somministrato al tronco inferiore; ma in sì piccola quantità immediatamente dopo l' operazione, che si dura fatica ad accorgersene.

Siccome l' arteria principale è stata legata, affinchè la parte, che resta al di sotto della legatura, abbia il suo nutrimento, per difenderla dalla mortificazione bisogna, che l' arteriole collaterali suppliscano alla sua mancanza; e per questo non si deve scalzar l' arteria a una gran distanza, e per la stessa ragione, la maggior parte de' Professori moderni non la scalzano niente affatto; ma solamente procurano, che non resti compreso nella legatura il nervo, il quale si trova spesso volte un dito distante dall' arteria, e così si può facilmente far passare fra esso, e l' arteria l' ago, ed in conseguenza non comprendere il nervo nella legatura (2).

Ecco

[1] *Cours d' Oper. de Chir. pag. 704.*

(2) Sono stato presente a due operazioni dell' *Aneurisma*, fatte nello Spedale di *S. Maria Nuova* di Firenze dal Sig. *Kayser* Chirurgo maggiore del Reggimento delle Guardie di *S. Maestà Imperiale*, all' arteria poplitea con un esito felicissimo nel primo, e funesto nel secondo.

Ecco quì il metodo d' operare , che tiene il Sign. SHARP ( 1 ) negli Ospedali di Londra . Avendo applicato il torcolare vicino alla spalla , e messo il braccio del malato in una conveniente situazione ; si fa un' incisione considerabile alla parte interna del muscolo *Bicipite*, che si stende longitudinalmente al di sopra , e al di sotto del gomito , seguendo il tragitto dell' arteria , la quale per mezzo di quest' incisione si scuoprirà subito , che si farà evacuato interamente colle dita tutto il sangue aggrumato ; se non si scuoprissi diviatamente l' orifizio dell' arteria , si allenterà un poco il torcolare , e allora il sangue , che ne uscirà lo farà scoprire . Si passa in appresso con precauzione sotto l' arteria un ago curvo dalla cruna, infilato di un nastirino di refe incerato , con cui si lega l' arteria al di sopra dell' orifizio superiore ; indi si passa una seconda volta l' ago nella medesima maniera sotto l' arteria al di sotto dell' orifizio inferiore , e se ne fa la legatura , per impedire il ritorno del sangue somministrato dall' arteriole collaterali . Si lascia la parte dell' arteria , che si trova fra le due legature , tale qual' è senza tagliarla , come fanno alcuni Chirurghi . Per non offendere , o legare il nervo nel fare la legatura dell' arteria , si può separarla da esso , e tenerla alquanto alzata con un uncino , mentre che si lega l' arteria . Ma considerando la situazione del nervo , e operando con un po di attenzione , non si corre rischio di offenderlo , nè di legarlo .

Fatto questo , si applicherà l' apparecchio senza tappare fortemente , come si ha costume di fare ; perchè questo impedisce l' arteriole collaterali di dilatarsi , e di somministrare bastantemente del sangue all' arterie *inter-ossee* , che sono la Radiale , e la Cubitale ; dal che ne segue troppo spesso per questo metodo di tappar fortemente la mortificazione del cubito , e della mano . Bisogna persuadersi , che le legature , che si sono fatte , sono sufficienti ad arrestare la violenza del sangue , e che

F 2

i pin-

condo , essendo questo morto convulso ; accidente , che credo proceduto dall' aver compreso nella legatura il nervo coll' arteria .

[ 1 ] Sharp *Traité a' Oper. de Chir.* pag. 371.

i piুমacciuoli piegati fortemente, ed in gran numero, con delle piccole compresse ammassate l' una sull' altra, secondo il metodo di alcuni, non possono essere, se non di un grandissimo pregiudizio.

\* Bisogna dunque medicar la ferita dolcemente con dei piুমacciuoli morbidi, e con delle fila asciutte, e vi si applicherà sopra una compressa quadra a tre, o quattro doppi, bagnata nell' acquavite, e sopra un' altra compressa scempia alquanto più lunga, che larga, tagliata in mezzo, e bagnata anche essa nell' acqua vite, colla quale si danno due voltate, una alla parte inferiore del braccio, e l' altra alla parte superiore del cubito; si coprono le compresse con una fasciuola, che si avvolta obliquamente intorno al braccio, e sopra quello apparecchio si mette una fascia, cominciando ad applicarla dal mezzo del cubito, conducendola fino sulla spalla, osservando prima di cominciare ad avvolgerla, di far tenere all' infermo il braccio alquanto piegato.

Si cuopre in appresso tutto il braccio con gran panni lini bagnati nel vin caldo gagliardo, con una maggior porzione d' acquavite, e gli si farà tenere il braccio al collo. Si lascerà quest' apparecchio lo spazio di 48. ore, e si aspetta, che i piুমacciuoli, e le fila caschino da se, il che suol succedere dieci, o dodici giorni dopo l' operazione, e la caduta delle legature un po più tardi. Dopo cadute le legature, si riempie la ferita con degli stelli ricoperti di polvere di Colofonia, per procurare una buona rigenerazione delle carni nel fondo della ferita, ed intorno all' arteria.

Dopo l' operazione si farà coricare il malato nel letto supino, e gli si metterà accanto un guanciale per appoggiarvi il braccio, osservando di porre su questo guanciale un incerato, perchè non abbia a inzupparsi delle fomite spiritose, e ben calde, che debbonsi fare al braccio, per dargli una specie di vita, tinto che venga ad animarlo il sangue col dilatare i vasi collaterali.

• Queste fomite si faranno con acquavite canforata, e non colla posca, come vorrebbe il Sig. DIONIS (1), ed altri Autori; perchè questa è astringente, e non spiro-

(1) *Cours d' Oper. de Chir. pag. 707.*

ritosa , laddove l' acquavite canforata è spiritosa , e non astringente . Con queste fomentate spiritose si deve bagnare tutto il cubito , e la mano ad ogni ora , giorno , e notte , e si deve mettere in seguito sopra la parte una pelle di montone , che si farà scaldare ogni volta , che si applicheranno le fomentate ; e si potrà ancora , per conservar meglio il calore , applicare un matton caldo involtato in un panno sotto alla mano .

Bisogna esaminar sovente la mano , poichè dallo stato di essa si giudica dell' evento dell' operazione ; quando ella si conserva calda , senza *Fluitene* , e che si sento al polso un piccolo fremito , si ha luogo di credere , che la parte inferiore riceve abbastanza di nutrimento , e si può sperare un buon esito dall' operazione ; come al contrario , se sia fredda , con dell' *Fluitene* , e che non si senta alcun fremito al polso , vi è gran ragione di temere di una cancrena , e di esser quindi obbligati a procedere all' amputazione del braccio .

Non si deve contuttociò venire a questa fatale estremità , se non quando manchi ogni altro mezzo di conservar la parte , e che non sia in procinto di dar in corruzione .

Conviene osservare , che dopo l' operazione resti il torcolare al suo luogo , ma allentato , per lo spazio di 24. ore , per potere , in caso di bisogno , adoprarlo , perchè quando sopravvenga l' emorragia , basta , che un assistente dell' operatore , o quello , che guarda il malato , lo riferri , fin tanto , che si manda per l' operatore , quando non indugi troppo a venire , perchè in tal caso sarebbe pericoloso il servirsi del torcolare , comechè si verrebbe per troppo tempo a privare il braccio del suo nutrimento . Per la qual cosa è meglio in tal caso mettere un dito sull' arteria per fermarne l' emorragia .

Per rimediare a quest' accidente , l' operatore avrà l' attenzione , nel tempo dell' operazione , di lasciar sempre un filo a più doppi sotto l' arteria , per trovarlo sempre pronto da far la legatura sopra la prima già fatta , in caso di emorragia . Nel medicarlo non si farà mai uso di suppurativi , nè di unguenti , ma di piunaccioli asciutti , e morbidi , e di compresse ; non bisogna lasciare esposto all' aria il luogo , dov' era l' apertura dell' arteria , sulla quale si applicherà immediatamente

un pinnetto ben grosso, ricoperto di polvere di trementina, ec. a fine di far crescere intorno all' arteria delle carni buone, e sode, e sopra questo si applicherà il resto dell' apparecchio, come si è detto di sopra.

Si farà osservare al malato una regola esatta di vivere, consistente in un brodo ogni quattr' ore, con qualche cucchiata di gelatina, e gli si caverà sangue più, o meno, secondo il bisogno.

Se si faccia l' operazione per un *Aneurisma vero*, bisogna contenerli nella stessa maniera, se non che conviene essere più cautelati nell' aprire il tumore, e tagliare delicatissimamente il corpo adiposo, come quando si fa l' operazione del *Bubbonocele*, e scoperto appena il sacco aneurismale, si introdurrà col favor di esso all' alto, e al basso del tumore una tenta incavata per tagliar colle cesoje, o col gammaut, tutto quello che rimane sopra l' incavatura; e dilatando con questo mezzo l' incisione, l' ernia dell' arteria resterà molto bene scoperta; indi si farà la legatura di sopra, e di sotto al tumore aneurismale nella maniera già detta, osservando, che nella legatura non resti compreso il nervo.

Fatte le legature, si apre frammezzo di esse il sacco aneurismale, per fare scolare il sangue, che ivi contienli; indi si rallenta il torcolare, per vedere se il sangue sta ben fermato, e dopo l' operazione si medicherà l' infermo nell' istessa maniera, che per l' *Aneurisma falso*, osservando le medesime circostanze, e l' istessa regola di vivere.

Leggesi nel SAVIARD (1), essere stata fatta la legatura con successo in un *Aneurisma* dell' arteria crurale.

CA-

(1) Saviard, *Obs. Chirurg.*

## CAPITOLO VII.

*Dell' Operazione della Sutura del Tendine*

Q Uest' operazione fu in uso presso gli Antichi ; ma fu abbandonata pel suo poco buon esito . Il Sig. BIENNAISE Chirurgo Francese , e uno de' più celebri Professori del suo tempo in *Parigi* , cominciò a rimettere in uso quest' operazione , e ne fu anche creduto l' inventore , onde ne riscosse allora tutta la gloria ; ma dopo aver riconosciuto , che ella era stata praticata da' Greci , più di due mila anni avanti ; restò a questo Autore solamente la gloria di averla rinnovata , poichè GALENO , GUIDONE , ed altri l' hanno praticata .

I tendini sono sottoposti ad esser punti , tagliati , lacerati , contusi , o ammaccati , come le altre parti del corpo . Gli accidenti , che sopravvengono alle ferite de' tendini , son funestissimi , e variano secondo le differenti soluzioni del continuo . Se i dolori di un tendine , che sia stato punto , o lacerato , sieno eccessivi , e minaccino ancor la morte , convien tagliarlo affatto , e si veggono immediatamente cessare quei pericolosi accidenti , e riprendere il malato la sua solita calma ; dal che si riconosce , che di tutte le indisposizioni , che succedono a queste parti , il taglio è quello , che porta seco minor pericolo . Al contrario poi , quando il tendine è lacerato , mezzo tagliato , punto , o contuso , sopravvengono all' infermo dolori violentissimi , una febbre continua , il delirio , le convulsioni , e spesso ancora la morte .

Le ferite de' tendini sono generalmente funeste , e la febbre , che le accompagna , pericolosissima . In quanto alla cura di queste malattie pretendevano gli Antichi , che i tendini non potessero riunirsi per essere , come essi dicevano , queste parti , spermatiche , onde asserivano , le ferite del tendine di *Achille* esser mortali ; ma la quotidiana esperienza ci convince del contrario , essendosi veduto farsi felicemente la riunione di questo tendine per mezzo di una sutura incavigliata , industriosamente fatta , e col tenere il piede disteso , e la gamba pie-

gata per tutto il tempo necessario alla riunione . In tal maniera si è spesso volte rimediato alla rottura del tendine di *Achille* il più grosso, ed il più forte di tutti gli altri, anzi nel Trattato delle malattie degli ossi del Sig. PETIT (1) si trova un esempio notabile della rottura de' tendini di *Achille*, a cagione di un salto a piè pari, che fece il famoso *Cocboix* celebre saltatore, riuniti perfettamente senza l'ajuto della futura . Nello stesso Trattato si trovano parecchie osservazioni sull' istesso soggetto per provare simili ferite esser curabili, e per obbligarci a lasciare il sistema degli Antichi .

Quando il tendine è mezzo tagliato, e che gli accidenti non sono ancora troppo violenti si può medicare la ferita col balsamo del *Fioravanti*, di *Copaiva*, o coll' olio di torli d' uovo mescolati insieme . Si fanno prontamente tre, o quattro cavate di sangue, si danno al malato de' giulebbi, e de' cristeri lenitivi; e quando tutto questo non diminuisca gli accidenti, anzi gli accresca, in tal caso convien tagliare affatto il tendine, e cessati che siano gli accidenti, si può farne la futura .

Per farla non bisogna servirsi di mollette, come vogliono alcuni Autori, per prender l' estremità del tendine tagliato, essendo queste perniciosissime, poichè ammaccando il tendine co' loro denti, lo vengono ad irritare, e a cagionarvi l' infiammazione, ed in conseguenza una suppurazione considerabile, che portando via una gran parte della sua sostanza, ne impedisce la riunione .

In vèce dunque di adoprar le mollette, in caso che le estremità del tendine si siano ritirate, è meglio prendere il cubito, supposto che questo sia un tendine contrattore, o estensore della mano, e farvi delle freghe colla mano di altro in basso per obbligare in tal guisa il tendine a stendersi, e l' estremità di esso a riaccostarsi . Indi si prende una fascia, e si va avvolgendola intorno al braccio, soprapponendola via via, cominciando dalla parte superiore fino all' inferiore, e quando le estremità del tendine si sono riaccostate, se ne fa la futura, passando un ago convenevole alla medesima pel suo mezzo, compresa la pelle senza mutarlo di situazione; e indi

fa-

[1] *Traité des maladies des Os.* Tom. 11. pag. 293.

facendo stendere la mano al malato per fare slungare il tendine dall' altra parte , vi si passa similmente l' ago . Gli aghi , che servono per la sutura de' tendini , sono abbastanza noti , senza che noi ne facciamo la descrizione ; ci contenteremo solamente di dire , che convien prenderne uno ben condizionato , infilato con un filo di refe a doppio incerato , annodando insieme i capi , perchè vengano a formare un laccetto . Per maggior facilità nel far questa sutura possiamo servirci di uno istrumento nominato da' Francesi *Porte equille* , e che chiameremo *Agajolo* (1) , mettendo al capo dell' ago un pezzetto di panno lino sottile , perchè non vacilli nell' incavature dell' *Agajolo* . Convien osservare di principiar la sutura all' estremità superiore del tendine prima , che all' inferiore . L' Operatore tenendo nella mano destra l' *Agajolo* coll' ago fermatovi , passa nel medesimo tempo la pelle , ed il tendine di fuori in dentro , distante due linee in circa dall' estremità , tenendo ferma la parte col pollice , e l' indice della sinistra ; indi allenterà l' anelletto dell' *Agajolo* per lasciar libero l' ago affine di tirarlo per la punta , tenendo il pollice , e l' indice della man sinistra sulla pelle da' due lati del tendine . Non bisogna passar tutto il filo pel foro fatto dall' ago ; ma tra mezzo al cappio , che formano i due capi del filo , si mette una caviglietta fatta di un pezzo di raffetlà incerato , avvoltato , perchè queste ferite son di quelle , che richiedo-

no

- 
- (1) Si intende un istrumento , sul quale si ferma l' ago ; è questo un manichetto d' argento , o d' acciaio , che si slarga in due parti per mezzo di una molla , e dentro a ciascheduna di queste parti vi è in mezzo una piccola incavatura , che riunite insieme formano un foro , o sia canaleto , dentro il quale si mette l' ago per la cruna ferrandolo con un anelletto , che è intorno all' istrumento a guisa di un tocalapis , e serve a riunire le due parti , forzando la molla . Nel fondo di questo manichetto vi è una testata con de' fori simili a quelli di un ditale da cucire , per spinger l' ago in caso di bisogno . *Eistero* chiama questo istrumento *Acutenaculum* , e i Francesi *Porte equille* ,

no le caviglie per impedir , che il filo non rompa la cucitura per essere i labbri della ferita naturalmente portati a scostarsi l' uno dall' altro . Dopo avere accostata la caviglietta alla pelle con tirare il filo ; si torna a fermar l' ago nell' agajolo , e si passa a traverso dell' altra estremità del tendine di dentro in fuori , prendendo il tendine , e la pelle . Indi si accomodano le due estremità del tendine in maniera , che l' una passi sull' altra , cioè vengano a soprapporsi , e poi sdoppiando il capo del filo per mettervi fra mezzo un' altra caviglietta simile , vi si fa un nodo semplice , e sopra un cappio .

Per medicare si distillano sulla ferita poche gocce di qualche balsamo spiritoso , fra le due cavigliette si mette un piccolo piumacciuolo imbevuto nel medesimo balsamo , e sopra una compressa bagnata nell' acquavite , indi una fascia circolare . Nel tempo che si medica , bisogna far sempre tenere al malato la mano distesa , e si faranno delle unzioni su tutta la parte , specialmente lungo i muscoli , de i quali son' tagliati i tendini , con un' oncia di olio lombricato , e di grasso umano , con una mezza oncia di sugo di lombrichi mescolato insieme . Si mette a scaldare in un piattino quella quantità , che pare sufficiente , aggiungendovi altrettanta acquavite . Queste unzioni si replicano tre , o quattro volte il giorno , nel tempo della cura , e si cuopre ogni volta il cubito con delle pezzette bagnate nel vino caldo , e quindi si pone il cubito in maniera , che la mano sia sempre stesa . Possiamo servirci per tal effetto di una macchina impressa nel Trattato degl' Istrumenti del Sig. de GARENGEOT Tom. II. pag. 299. A misura , che la ferita si va cicatrizzando si abbassa appoco appoco la paletta della macchina per mezzo degli uncini , continuando sempre le stesse unzioni , se non che sul fine non dee mettersi tanta acquavite .

Bisogna aver l' attenzione di far fare di tanto in tanto qualche moto alla parte , affinchè i tendini divengano arrendevoli , ed elastici , e si allunghino appoco appoco ; perchè senza questa precauzione , potrebbe darsi , che la parte rimanesse sempre ritirata . In tempo della cura deve farsi osservare all' infermo una moderata regola di vivere , e fargli delle cavate di sangue più , o meno , se-

condo il bisogno , per prevenire l' infiammazione , e la febbre .

Quasi tutti i Chirurghi moderni hanno abbandonata quest' operazione , essendo da essi considerata come pericolosa , ed inutile . In fatti la puntura del tendine , o la sua mezza sezione è spessissimamente accompagnata da funestissimi accidenti , e che non cessano per ordinario , che nel tagliarlo interamente ; oltre di che i tendini servono a tirare una parte mobile , che si può mettere , e mantenere in un' estensione , che riaccostano le parti divise , e ne procurano la riunione ; ed è in questo modo , che il Sig. PETIT ha rimediato alla rottura de' due tendini di *Achille* , de' quali abbiain di sopra parlato . Nel grande Spedale di *Parigi* non si pratica nemmeno più la sutura del tendine , contentandosi di metter la parte in una situazione adattata , sostenuta da una buona fasciatura .

## C A P I T O L O VIII.

### *Dell' Operazione del Panareccio .*

**I**L Panareccio è un tumore flemmonoso , che viene all' estremità delle dita , o alla radice , o a' lati dell' unghia . Egli è duro , e sul principio non duole , che poco ; indi si riscalda , e si infiamma ; diviene ordinariamente rosso , e risveglia un dolore acutissimo , che martella , e si termina per suppurazione . I Greci lo chiamano *Παρωνυχία* , cioè *Paronychia* , che deriva da *Para* , che vuol dir contro , e da *Onyx* , che significa unghia , perchè questa malattia , come abbiain detto , viene all' estremità delle dita , o contro all' unghia . Chiamasi ancora *Pterigium* , perchè i lati dell' estremità del dito si slargano qualche volta , come le ale di un pipistrello . Questa malattia , secondo il Sig. DIONIS , non può derivare d' altronde , che da una materia acrimoniosa , ardente , e corrosiva , che impoessandosi del *Periostio* , del tendine , o dell' estremità de' filamenti nervosi , e della carne , vi fa una crosta (1) .

11

[1] DIONIS, *Cours d' Oper. de Chir.* pag. 717.

Il panareccio nulladimeno è prodotto da cause interne, ed esterne. L' esterne sono una puntura, una scheggia di legno, che sia entrata nel dito, principalmente nel luogo di qualche giuntura, un' escoriazione, una contusione, o ammaccatura, una scottatura, gli stramenti violenti, l' irritamento di qualche fibra, che sia stata strata nello strappar quell' escrescenze, che vengono intorno all' unghie, che chiamansi volgarmente *pipite*, e finalmente le punture di qualunque istrumento aguzzo; dal che ne viene, che tutti gli artisti, che hanno occasione di adoprar l' ago, vi sono sottopostissimi; ma se ne preservano col succhiare il dito appena punto, ed in questa guisa fanno uscir il sangue da' piccoli vasi, che l' ago ha aperti, ed impediscono il panareccio. Le cause interne di esso sono la lue venerea, scrofola, o cancerosa; ma più di rado è prodotto dalle cause interne, che dall' esterne.

Il Sig. DIONIS non ammette se non una specie di panareccio, dicendo che i nostri Antichi gli ammettevano di due specie (1); l' uno, di cui la materia è fra la pelle, ed il *Periostio*, e questo ei l' ammette; l' altro, di cui l' umore è fra il *Periostio*, e l' osso, e questo ei lo chiama immaginario, dicendo esser affatto impossibile, che la quantità di materia, che si vede uscire dal panareccio, possa contenersi in uno spazio, che non ha la larghezza di due linee.

Sebbene il Sig. DIONIS col rigettare il sentimento degli Antichi, pare che ammetta una sola specie di panareccio, convien nulladimeno nell' accordare, che se ne trovano di quattro specie. La prima è situata sotto l' *Epidermide*, ed è prodotta piuttosto da cause esterne, che interne; questa non è difficile a riconoscersi; comincia col formare un piccolo tumore rosso, e superficiale, che fa il giro dell' unghia accompagnato da un leggier dolore. Questo è senza pericolo, e un po' di cerotto di *Aquilon* gommatto serve ordinariamente a guarirlo. Succede qualche volta, che l' infiammazione distrugge le aderenze naturali della radice dell' unghia, che non ricevendo allora  
più

(1) Dionis, *Cours d' Oper. de Chirurg.* pag. 718.

più verun nutrimento , è spinta fuori da un' altra unghia prodotta dalla natura .

La seconda specie ha del carattere del flemmone, ed è situata sotto alla pelle nel corpo adiposo, che circonda il dito, e si manifesta al di fuori col colore accefo , con calore, e dolore . Talvolta l' infiammazione viene a comunicarsi al di dentro , e allora si sente il dolore fino al pugno, e a tutto il cubito . Gli accidenti di questa specie di panareccio son più , o meno gravi, secondo che egli è più , o meno accolto al tendine .

La terza specie è situata nella guaina de' tendini flessorj delle dita . Si manifesta per mezzo di un tumore , che qualche volta non apparisce ; ed è accompagnato da tensione , enfiagione considerabile , e dolori acutissimi , che corrispondono ad uno de' due condili dell' omero, ed anco a tutto il braccio . Questa specie è molto più perniciosa delle prime, e porta seco degli accidenti pericolosissimi , ed estremamente violenti : i dolori, che cagiona sono tanto più acuti, e tanto più grave il pericolo , quanto che le parti tendinose , membranose , e ligamentose ne son più che l' altre suscettibili . Per comprendere i dolori che fa sentire, e i pericoli , a' quali espone questa specie di panareccio , basta ridursi alla mente la disposizione delle parti principali , che servono a piegar le dita . Questo moto si fa per mezzo del muscolo *Profondo* , e del *Sublime* ; questi muscoli sono attaccati al condile interno dell' *Omero* , si distribuiscono ciascheduno verso il mezzo del cubito in quattro tendini , che chiamansi *Flessorj* , che passando sotto il ligamento annulare interno comune , situato al *Carpo* , vanno ad attaccarsi verso l' estremità delle dita , fuor che del pollice , e così ciaschedun dito ha due di questi tendini *Flessorj* , uno procedente dal muscolo *Profondo* , e l' altro dal *Sublime* . Il primo è attaccato alla terza falange , e l' altro alla seconda . Dal ligamento annulare interno comune , fino alla loro estremità son ricoperti d' una guaina rinforzata da fasce ligamentose nell' estensione delle due prime falangi delle dita . Ora in questa guaina avendo la sua sede questa specie di panareccio , non può essere , che estremamente doloroso , e pericolosissimo ; poichè succede talvolta , che malgrado l' applicazion de' rimedj , va razzando a comunicarsi all' altre dita , alla mano , al

cubito , ed anco al braccio . In tal caso vi è tutto il luogo di temere di perder l' ufo della parte , e talvolta ancora vi si impoffeffa la cancrena , la quale è tanto più da temerfi , quanto più l' infermo è di un cattivo temperamento .

La quarta fpecie di panareccio è fituata fra il *Perioftio* , e l' offò , malgrado quel che ne penfa il Sig. *Dionis* , e talvolta anche nell' offò fteffo . Si ravvifa quefto per mezzo di un dolor profondo , eccelfivo , fpietatiflimo , che l' infermo fiente nel dito ; per la tenfione , ed infiammazione , che ful principio non fono confiderabili ; ma vanno in fequito crefcendo , e pigliano fucceffivamente le parti vicine ; vi fopraggiungono , come nella terza fpecie , la febbre , la vigilia , e il delirio ; con tutto quefto , l' infiammazione non fi ftende troppo lungo il cubito , come nel panareccio della terza fpecie ; vi fi veggono talvolta delle piccole bollicine , o *Fiftule* , il dito comparifce livido , e dà in corruzione , fe non vi fi pone prontamente rimedio ; finalmente i fintomi fono sì prefinti , che fe non fi evacua quanto prima l' umor corrofivo rinchiufò fra il *Perioftio* , e l' offò , produce delle funefte confequenze .

La prima fpecie di panareccio , richiede pochiffima premura per guarirlo . Subito che fi fcuopre della marcia , che fopravviene ben tofto dopo una piccola flogofa , che è il principio del panareccio , fi deve premere il tumore a i lati per eftender maggiormente l' *Epidermide* , e con una lancetta vi fi fa una piccola incifione , e la pelle , che non deve levarfi , fi fecca bentofto , e la malattia in quella guifa agevolmente guarifce . Tagliato l' *Epiacrmiae* , e dato efito alla marcia , fi fa ufo dell' unguento bianco , o di una piccola pezzetta tagliata a *Croce di Malta* , imbevuta nel vino caldo , o in qualche altro diffeccante .

La feconda fpecie di panareccio dimanda maggior attenzion della prima , ficcome porta seco la febbre , conviene venire a copiofe cavate di fangue , ordinare de' dolcificanti , e de' rimedj capaci di calmare la grande agitazione del fangue . Quefta fpecie di panareccio è molto pericolofa neile perfone delicate , e di un temperamento fecco , e biliofo . Il numero de' falaffi deve regolarfi fecondo la violenza del male , il temperamento , e l' età del

del malato, e questo ad oggetto di impedire, che il male pigli il braccio, che la febbre non aumenti, e che non sopraggiunga il delirio. Bisogna osservare di cavar sangue dal lato opposto al male; e quando i dolori sono eccessivi, si impiegano per moderargli anche i *Narcotici* stessi, e si prescrive al malato, secondo la violenza della febbre, una più, o meno severa dieta.

In questa specie di panareccio i rimedj, che ordinariamente si impiegano, sono gl' impiastri anodini, emollienti, e risolutivi; se questi non trattengano il progresso del male, si ricorre agl' impiastri, o a' cerotti suppurativi. Per ordinario poco tempo dopo si sente una leggiera fluttuazione, e allora il sommo rimedio è di aprire il tumore per dar esito alla marcia, ma qualche volta non è facile il sentir la fluttuazione, ed allora non può conoscersi il luogo dove la marcia si trova, se non pel racconto del malato, e per la circoscrizione del tumore.

La sede del male è quasi sempre dal lato della guaina de' tendini, e questa è la ragione, che egli vi fa sempre de' gran danni a misura, che vi si appressa.

Per aprir questo tumore stemmonolo si introduce la punta di un gammaut dritto fino al luogo della marcia, osservando di far sempre un' incisione per lo lungo, per evitare di tagliare i tendini, e con questa incisione si impedisce, che la marcia venga ad accumularsi maggiormente; indi colle cesoje si taglia uno, o tutti due i labbri della ferita, e si medica con fila asciutte.

Se l' infermo ricusa l' operazione, cioè l' incisione, che è il più sicuro mezzo per guarire, si adoprano allora altri rimedj capaci di aumentar la suppurazione, e di far venire a capo l' ascesso, come sono il cerotto di *Aquilon gommato*, l' unguento *Basilicon*, e simili; scoppiato appena il tumore, si allarga alquanto l' apertura colle cesoje, e si medica col balsamo d' *Arceo* sciolto in un poco di acquavite, e sopra un cerotto di *Aquilon*, ec.

Qualche volta la marcia resta sotto la radice dell' unghia, ed appoggiando leggiermente il dito sopra, si sente un piccolo contrasto, e cagionasi un vivo dolore al malato. Allora non vi è altro partito da prendere, se non che aprir la pelle fino alla radice dell' unghia, sco-

scoffando leggermente la pelle fino che la detta radice venga a scoprirsi, dove si veggono alcune macchiette rosse; si fa un' incisione per lo lungo a questa radice, e si preme leggermente per farne uscire la marcia; indi si cuopre la parte con fila imbevute nell' acquavite, ed il male guarisce prontamente; con questa maniera si impedisce un' infinità di accidenti pericolosi.

La terza specie di panareccio, dopo aver osservato gli accidenti, che l' accompagnano, e quando si scuopre un piccolo tumore alla punta del dito, dove si sente della fluttuazione; convien fare allora un' incisione lungo il tumore con un gammaut dritto, incidendo il dito, e la guaina del tendine dalla parte anteriore fino ai tendini del muscolo *Suoline*, e del *Profondo*. Quando il male si stende più oltre, per seguirne la traccia, si introduce nella guaina de' tendini una tenta incavata, e coll' ajuto di essa si introduce un gammaut per allungare l' incisione, finchè resti scoperta la sede del male. Se questa sia nel mezzo della guaina, e che si sia arrivato coll' apertura fino al mezzo della prima falange, bisogna avanzare l' incisione fino a tre, o quattro linee nella mano, per evitare lo strangolamento, che cagiona il restante della guaina, che per tutta la lunghezza del dito è cartilaginosa, e che nella mano essendo soltanto membranosa non può cagionar quest' inconveniente.

Fatta l' incisione, si taglia alquanto de' labbri della ferita, perchè la loro embagione non abbia a impedirci di introdurre agevolmente de' piccoli fluelli di fila lunghi, ed asciutti, che si applicano a' due lati del tendine, a fine di difenderli, e vi si alzano gli uni su gli altri tanto che basti per fare una compressione su i vasi aperti, che impedisca l' emorragia, e quando questo non serva, si viene alla legatura, perchè in questo caso gli stitici son perniciosissimi.

Fatta l' operazione, conviene stabilire la suppurazione, e calmare il dolore, al quale effetto si caverà sangue al malato, si metteranno sulla mano, e sul cubito degl' impiastri maturativi più caldi che si può, umettandoli di tanto in tanto con una decozione emolliente. Si adopra una fasciatura a *diciotto capi*, che è molto più comoda delle fasce avvolte, imperciocchè,

oltre che supplisce alla medesima indicazione, non è necessario, nel medicarla, di smuovere la parte.

Quando si torna a medicarla ne' dì seguenti, si applicano su' tendini scoperti degli stuelletti di fila staccati, ed inzuppati nella tintura di fiori d' *Ipericon*, cavata collo spirito di vino, o nello spirito di trementina. Si applicano sul restante della ferita de' piumacciuoli coperti con del Balsamo d' *Arcea*, o con un digestivo semplice. Sulla mano, e sul cubito si applicano degli impiastri emollienti, finchè sian cessati gli accidenti, e allora si adoprano degli impiastri confortativi, o del vino aromatico, o un decotto vulnerario, con altrettanta acquavite.

La quarta specie di panareccio è quella, di cui sono sì crudeli, e sì violenti i dolori, che l' infermo rischia di perder la vita, se non gli si appresta un pronto soccorso, con evacuare la materia, che cagiona la malattia.

Per far bene quest' operazione, si fa tenere la mano dell' infermo sopra una tavola per mezzo di un assistente, sicchè nel dolore dell' incisione non venga a ritirarla. L' operatore prende un gammaut dritto, o pure una lancetta colla lama fermata nel manico per mezzo di una piccola fascia, ed apre il dito dal lato, cominciando per insinuare la punta del gammaut sino all' osso, e seguitando a scoptire il restante del dito. Se l' infermo non resta sollevato da quest' apertura, è un contrassegno, che la malattia è dall' altra parte del dito, dove convien fare dall' altro lato la stessa operazione. Il contrassegno, che l' operazione abbia un felice successo, è il vedere in quell' istante calmarli gli accidenti.

La cura è semplicissima; la ferita si medica come abbiamo detto di sopra. Se vi fosse carie all' osso, se no farà l' esfoliazione, coll' applicarvi sopra la tintura di mirra, ed aloes, o qualche altro rimedio atto a tal effetto; però la falange è così piccola, che sovente viene a distaccarsi tutta intera. Ma siccome questa specie di panareccio è prodotta per l' ordinario da cause interne, e che suol venire più spesso a quei, che patiscono di scrofole, che ad altre persone, è bene informarsene per dar loro de' rimedj, che convengono all' indisposi-

zione, che è nel sangue, per le differenti malattie, che possono dare origine a questa.

Prima di finire, non farò fuor di proposito il dire, che il panareccio, che viene al pollice, non comunica il suo dolore all' altre dita, e che il dolore non si stende più, che a mezzo il cubito, laddove quando è nell' altre dita si fa sentire il dolore fino alla parte inferiore del gomito. La ragione si è, che i muscoli propri del pollice si attaccano alla parte media degli ossi del cubito, laddove i muscoli, che servono alla flessione dell' altre dita, son comuni a tutte, di maniera che il dolore di un dito si comunica all' altro, e il dolore arriva fino al condile interno dell' omero, essendo il luogo dove i suoi muscoli flessorj si attaccano.

*Dell' Estrazione de' Corpi estranei; e de' differenti mezzi, de' quali uno si serve ordinariamente per estrarli, quando sono rimasti nell' Esofago, e nella Trachea, dove si fa conoscere il buon effetto degli uni, ed il cattivo esito degli altri.*

Fra i differenti corpi estranei, che si fermano nell' Esofago, ve ne sono di quelli, che possono essere spinti nello stomaco, e passar quindi agevolmente per le prime vie, come sarebbero quelli, che son capaci di ammorbidirsi, di attenuarsi, e di digerirsi, o ancora i corpi duri, e indissolubili, di una forma però, e di un volume, che loro renda facile il passaggio per la via degli intestini; e siccome è più facile a spingere in giù questi corpi, che a ritirarli fuori, possiamo determinarci a spingerli nello stomaco. Altri poi ve ne sono, che per la loro durezza, per la loro figura angolare, disuguale, e tagliante, possono pungere, lacerare, o tagliare le parti, che toccano, e che per tal ragione debbono sempre, se egli è possibile, tirarsi fuori per evitar gl' inconvenienti, che cagionar potrebbero, se si facesse prender loro un' altra strada. Tuttavia ci troviamo alcuna volta forzati malgrado questo pericolo di affondarli nello stomaco, per-  
chè

chè è impossibile il cavarli fuori, e perchè stando nell' *Esófago*, mettono la vita dell' inferma in un imminente pericolo. Finalmente vi son de' corpi inghiottiti, o fermati nell' *Esófago*, che è impossibile ritirarli fuori, e che quando son calcati nello stomaco non possono esserne espulsi per le vie naturali. Quest' ultimo caso è accompagnato talvolta da molti pericolosi accidenti, ne quali ancora può esser la Chirurgia di un grande aiuto.

I corpi estranei, che possono, senza cagionar degli accidenti, essere spinti per le prime vie, sono principalmente i piccoli ossi, che non hanno nè punture, nè ineguaglianze capaci di offendere lo stomaco, o gl' intestini; delle porzioni di sostanze cartilaginose, delle piccole monete, delle palle di piombo, de' nocciuoli, che hanno una superficie uguale, de' pezzi di carne, delle frutta, delle cortecce di pane, ec. Tutte queste specie di corpi estranei, essendo spinti nello stomaco, non cagionano accidente alcuno, come si vedrà dalle seguenti osservazioni.

#### OSSE R VA Z I O N E I.

**I**LDANO (1) racconta di un giovine, che ingollò un piccolo osso, ed essendosi fermato nell' *Esófago*, cagionò delle violentissime convulsioni, e l' avrebbe soffogato, se ILDANO non avesse prontamente spinto il corpo estraneo nello stomaco.

#### OSSE R VA Z I O N E II.

**I**LDANO. (2) racconta d' un Calzolajo di *Colonia*, che nel ridere, inghiottì un pezzetto di cuojo, che teneva in bocca, ed era per restar soffogato, se ILDANO non avesse quanto prima liberato l' *Esófago* da quel corpo estraneo, avendo impiegato a quest' effetto una tenta curva d' argento, con cui spinse nello stomaco quel

G 2

PER

(1) Hildan. Cent. 1. Obs. 36.

(2) Ibid. Cent. 1. Obs. 31.

pezzetto di cuojo , che non fu reso per l' ano , se non più di sei mesi dopo .

Le persone ingorde nel mangiare sono spesso soggette ad un tale inconveniente , inghiottendo de' pezzi di carne non masticati .

### OSSERVAZIONE III.

\* **PAREO** [1] racconta , che un lavorante di un sarto ebbe a restar soffogato da un pezzo di trippa , che non aveva finito di masticare , per averne maggior porzione degli altri suoi compagni , co' quali mangiava : se gli fermò a mezzo l' *Esófago* ; **PAREO** glielo spinse prontamente nello stomaco per mezzo di un porro , e con de' pugni nella schiena .

### OSSERVAZIONE IV.

**ELWIGIO** (2) ci dà la storia di un bambino di 3. anni , che giuocando con delle monete d' argento , ne ingollò due , o tre , che egli rese per secesso , senza esserne stato incomodato in verun conto .

**FORESTO** (3) racconta anch' esso di un uomo , che inghiottì tre monete , che uscirono tre giorni dopo colle materie stercorali .

### OSSERVAZIONE V.

**IL** Sig. **PERROTIN** (4) racconta , che un uomo sdentato affatto ingollò un pezzo grosso di corteccia di pan duro , che rimase in fondo all' *Esófago* , dove impedivasi talmente il passaggio agli alimenti , tanto solidi , che liquidi , che appena presi gli ributtava . Questa corteccia non poteva sinuoversi , nè per gli sforzi violenti , che l' infer-

[1] *Lib. 1. Cap. 11.*

[2] *Boneti, Med. Sept. lib. 3. sect. 1. de Æsoph. aff. et lib. cap. 10.*

[3] *Lib. 15. Obs. Schol. ad Obs. 28.*

[4] *Mém. de l' Acad. R. de Chir. Tom. 1. Part. 11. pag. 352.*

fermo faceva nel ributtar gli alimenti , che aveva inghiottiti , nè per quelli , che cagionava la corteccia istessa coll' irritamento , che produceva . In capo a 30. ore il malato determinossi di andar dal Sig. PERROTIN per cercare aiuto . Questo Chirurgo istruito di tutte le circostanze , prese una candeletta poco più grossa di una penna da scrivere , la tuffò nell' olio , e l' introdusse nell' *Esófago* , e mandò giù nello stomaco il corpo estraneo con tutta la facilità .

L' industria ha somministrato in ogni tempo differenti mezzi per disgombrare l' *Esófago* de' corpi estranei , che credonfi poterli affondare nello stomaco , perchè noi veggiamo , che gli Antichi , ed i moderni hanno adoprato de' porri , delle candelette intinte nell' olio , una tenta curva d' argento , o di piombo , un fil di ferro , o d' ottone piegato , e messo nel piombo fuso , perchè venga a formare in cima di esso una specie di maglietto ; altri fanno ingollare all' infermo de' grossi bocconi di qualche alimento , come un torso di lattuga , una rapa , un pezzo di biscotto , una crosta , o una midolla di pan tenero senza masticarla , e altre cose simili .

Vi sono ancora di quelli , che si servono di una palla di piombo , di un grosso Pater nostro di corona attaccato ad una cordella , di un pezzo di carne di bove , o involtata nel mele , o nella trementina , e legata ben forte a capo di un grosso filo . Tutte queste materie spinte nell' *Esófago* per la sua azione organica strascinano spesse volte seco nello stomaco i corpi estranei .

Molti Professori disapprovano l' uso della spugna impiegata , come abbiám detto , per buonissime , e saldissime ragioni , che troppo lungo sarebbe il ripostarle in questo luogo .

I grossi bocconi di qualche alimento , o altre cose simili , che fanfi inghiottire al malato , se mancano di affondare il corpo estraneo nello stomaco , venendo allora ad aumentare l' imbarazzo dell' *Esófago* , possono contribuire a farlo morire più presto .

I porri son molti comodi , e molto in uso per tal' effetto ; tuttavia nel piegarli per accomodarsi alla figura della *Faringe* , possono romperli ; ed i moti violenti dell' *Esófago* possono anch' essi contribuire a quest' inconveniente .

FABRICIO d' AQUAPENDENTE (1) preferisce a tutti i mezzi de' quali abbiain parlato, la candeletta tuffata nell' olio, osservando di farla scaldare prima di servirsene, e particolarmente nell' inverno, per darle una consistenza morbida abbastanza, per prendere agevolmente la figura necessaria dell' *Esofago*, per entrarvi senza violenza.

ALBUCASIS [2] si serviva per l' istesso uso di un piccolo gambo di piombo assai sottile, per esser pieghevole, nell' estremità di cui eravi una specie di bottone per appoggiare, ed ispingere i corpi estranei nello stomaco. RHASIS si serviva anch' egli del gambo di piombo.

Il Sig. VERDUC (3) propone un istrumento quasi simile, ma fatto d' argento, o d' acciaio pieghevole, grosso quanto una penna da scrivere, e lungo un piede, e mezzo in circa, di cui le estremità terminansi in un bottone conoide della grossezza di una piccola noce.

FABRIZIO ILDANO (4) servivasi con successo di una tenta, o di un grosso specillo di argento curvo. Egli impiegava ancora varj altri istrumenti per ritirar, o per ispingere i corpi estranei, che occupavano o tutto, o in parte, il canal dell' *Esofago*, di uno de' quali ne attribuisce l' invenzione a GAUTIER HERMAN RYFF, celebre Medico-Chirurgo a *Strasburgo*, benchè poi riformato da esso ILDANO; ma come restava nulladimeno a quest' istrumento sempre il difetto di essere di una materia inflessibile; Il Sig. PETIT ne ha inventato uno, che ha tutti i vantaggi del detto istrumento, senza avere il suo difetto. Questo è un gambo, o specillo d' argento flessibile, formato di due fili d' argento attortigliati insieme l' uno sull' altro in spirale; la sua estremità è ritorta, formando un piccolo anello proprio ad intricare il corpo estraneo.

I pezzi di frutti grossi, e sodi, non ben masticati possono anch' essi facilmente restar nell' *Esofago*.

OS.

[1] *Operat. Chirurg. Cap. 36.*

[2] *Chirurg. Franc. de Dalechamp, Chap. 32.*

[3] *Oper. Chirurg. Cap. 25.*

[4] *Cent. 1. Observ. 31.*

OSSERVAZIONE VI.

**S**CHENKIO (1) parla di una donna gravida, che mangiò con molta ingordigia, e quasi senza masticarle, delle meluzze acerbe, e durissime, delle quali le restarono alcuni pezzi, al di sotto della *Faringe*, onde la misera fu in un estremo pericolo di restar soffogata.

OSSERVAZIONE VII.

**I**L Sig. de la MORTE (2) racconta di una Balia, che ebbe l'imprudenza di dare un confetto a succhiare ad un bambino di sei giorni. Questo gli restò nella gola, e cagionò degli accidenti, che ridussero il bambino in gran pericolo della vita.

Tutti questi differenti corpi del genere di alimenti, e che si fermano nell'*Esófago*, non sono per ordinario pericolosi, se non in quanto alla loro mole; ma perciò non sono meno da temersi, perchè ve ne sono di quelli, che sono in fatti sì grossi, che possono cagionare in brevissimo tempo la morte; come si vedrà dalla seguente osservazione.

OSSERVAZIONE VIII.

**I**L Sig. le DRAN (3) dice, che un uomo inghiottì un boccone un po' troppo grosso di una spalletta di montone, che gli restò nell'*Esófago*; costui si assentò dalla compagnia per procurar di ributtarlo; quelli, che erano presenti, non si erano accorti dell' accidente, crederono, che fosse uscito per soddisfare a qualche suo ordinario bisogno, egli restò senza soccorso, e rimase soffogato. La compagnia sorpresa di non vederlo ritornare, cominciò ad esserne inquieta, e a farne ricerca, e lo trovarono morto, appoggiato col capo alla muraglia.

G 4

Vi

(1) *Lib. III. Obs. IV.*

(2) *Tom. IV. Obs. 332.*

(3) *Memoir. de l' Acad. R. de Chir. Tom. I. Part. II. pag. 354.*

Vi sono di quelli, che si espongono volontariamente al pericolo di restar soffogati.

### OSSERVAZIONE IX.

**W**IERO (1) racconta di un uomo, che prese a ingollare un uovo di gallina intero; gli restò nell' *Esophago*, e premè sì forte la *Trachea*, che quel temerario ne restò istantaneamente soffogato.

SUETONE, e SCHENKIO (2) parlano di un giovanotto, che restò soffogato anch' egli da una pera, che aveva tirata in aria, per ripigliarla colla bocca.

RHODIO (3) dice, che una donna morì istantaneamente per una pera cruda, che inghiottì senza masticare.

TRYPHON (4) racconta di un musico, che nel cantare restò soffogato da un fico, che qualche sciagurato gli gettò da lontano in bocca.

Sebbene siamo convinti dalla quotidiana esperienza, che i differenti corpi estranei, de' quali abbiamo parlato, essendo una volta caduti nello stomaco, non cagionano alcuno inconveniente, è però necessario avvertire i giovani Chirurghi, che questa non è sempre la strada la più sicura; perchè noi veggiamo negli Osservatori, che simili corpi restano talvolta nello stomaco, o negli intestini, e vi cagionano molti disordini, e spesso ancora la morte.

Vi sono de' pezzi di alimenti, che passano facilmente fino nello stomaco, e che essendo in appresso ributtati pel vomito, si fermano nell' *Esophago*, e vi cagionano i suddetti disordini.

OS.

(1) *De Praefig. Demon. lib. IV. cap. 11.*

(2) *De Suffoc. lib. 11. Obs. 1.*

(3) *Cent. 11. Obs. 50.*

(4) *In 1. Græcor. Epigramm. item Varinus, & Schenkus; Lib. 11. Obs. 1.*

OSSERVAZIONE X.

**H**OUILLIER [1] dice di una ragazza, che avea riempito lo stomaco eccessivamente di polmone di bue, ed in conseguenza si sentiva della gravezza alla regione *Epigastrica*, frequenti stimoli al vomito, e finalmente un vomito considerabile, nello sforzo del quale un pezzo di polmone, che ella avea mangiato, fu rispinto nell' *Esófago*, dove si fermò, cagionando all' inferma de' pericolosi sintomi, che durarono, finchè ella non si liberò da questo corpo estraneo, ributtandolo per bocca con violentissimi sforzi.

E' facile a capirsi, che non sarebbe stato bene di respinger quel pezzo di polmone nello stomaco, perchè non potendo forse uscir dal *Piloro*, l' inferma averebbe potuto essere esposta di nuovo al medesimo accidente.

L' istesso Autore (2) racconta di una ragazza, che avendo mangiato in troppa fretta una gran quantità di polmone di vitella, ebbe presso appoco gli stessi accidenti, che durarono lungo tempo; ma quel che vi è di particolare, è che la ragazza vomitò un pezzetto del polmone, che avea mangiato quattro mesi avanti. Questo le restò nell' *Esófago*, e fu per soffocarla, se non che per fortuna uno sforzo violento lo smosse, e gli dette agio a uscir per la bocca.

Bisogna adunque riconoscere, che non si può con sicurezza liberar l' *Esófago* da tali imbarazzi, se non con estrarli.

Vi son de' corpi estranei di un volume considerabile, che meritano un' attenzione particolare dalla parte del Chirurgo; soprattutto allorquando son di una materia, che non può assolutamente nè dissolversi, nè digerirsi nello stomaco. In tal caso è prudenza il farne l' estrazione piuttosto, che spingerli nello stomaco, essendo troppo evidente il pericolo, che si incorrerebbe a mandar giù corpi di tal natura, e sì considerabili di mole; per-

(1) *Scholiogr. ad Cap. 33. lib. 1. de Morb. intern.*

(2) *Pericel. 8. ad lib. viii. Galen, Comp. Pharm. part.*

perchè si deve temere , che non potrebbero poi uscir più dallo stomaco , come in fatti si son veduti arrestarsi in questo viscere , e produr la morte .

## OSSERVAZIONE XI.

**K**ERCHRINGIO (1) dice , che un bambino di 5. anni per aver inghiottito una moneta ben piccola , che tura-va affatto il *Piloro* , morì ; e l' istesso accidente successe ad un altro bambino , che ebbe l' istessa sorte ; dopo un vomito violento se ne morì , e gli fu trovata la moneta arrestata nel *Piloro* (2) . Gli adulti sono esposti allo stesso pericolo , e se ne trovano negli Autori parecchi esempi (3) .

Pare nulladimeno sorprendente , che una sola moneta possa produrre degli effetti così funesti , quando sappiamo dagli osservatori , che un viaggiatore temendo de' ladri per istrada , ingollò senza accidente alcuno sei ducati , e gli rese qualche giorno dopo per secesso coll' ajuto di un cristero (4) . Sappiamo che un altro rese similmente per secesso nove Luigi d' oro , che aveva inghiottiti (5) ; e che due altre persone , avendo ingollato un gruzzolo di cento Luigi d' oro per ciascheduno , ne furono libere con de' fierissimi dolori di colica , che in fatti furono assai violenti , e che durarono finche questi corpi estranei furono usciti , e che essi li renderono appoco appoco per secesso a forza di alcuni cristeri (6) .

Questi fatti sono molto istruttivi , ed interessanti ; ma sembra , che ci siamo più attenti ancora quando tali fatti succedono a persone di distinzione .

Leg-

(1) *In Spinileg. Anatom. Obs.* 1.

(2) *Ephemerid. Germ. Cent.* 3. & 4. *Obs.* 121.

(3) *Wedelius Boneti Med. Septentr. de Aëroph. affect. lib.* 3. *Secl.* 1. *Cap.* 9. *Fab. Hildan. Cent. Obs.* 35. *Ephemerid. ann.* 4. *Cent.* 10. *Obs.* 82.

[4] *D. Mich. Mangeti Biblioth. Chir. de Deglut. Vitiis.*

[5] *Ephemerid. Cent.* 10. *Obs.* 34.

(6) *Petr. Borelli, Cent.* 4. *Histor.* 25. & *Joh. Mich. Fehrius, in Cent.* 3. *Epist. Medic. Barth.* 69.

Leggesi nell' Accademia Reale delle Iscrizioni, che il Sig. VAILLANT Dottor di Medicina, e celebre Antiquario essendo stato preso da un corsaro *Algerino*, e ritenuto schiavo quattro mesi, e mezzo in *Algeri*; nel ritornare in *Francia*, gli fu data la caccia da un altro corsaro Tunisino. Alla vista di questa seconda disgrazia, e temendo di esser di nuovo preso, per non perdere ogni cosa, come la prima volta, ingollò quindici medaglie d' oro, che egli aveva seco. Ma avendo avuto la sorte di salvarsi dal corsaro, la sua prima cura fu di pensare a' mezzi per isgravarsi del carico, che egli avea confidato al suo stomaco: come la natura non sembrava disposta a sollevarsene, e temendo per la sua vita, consultò la facoltà di Medicina. Ognuno propose un rimedio differente; ed il malato non sapendo a quale doveva appigliarsi si abbandonò interamente alla natura, e lasciandole la cura della sua sorte, ella operò felicemente, e rese tutte le medaglie per secesso.

Convien nulladimeno osservare, che i corpi duri, benchè di mole piccola, possono per la loro quantità, ammassandosi in un medesimo luogo, diventar funesti.

Nell' efemeridi di Alemagna [1] leggesi, che un' uomo morì dopo una lunga costipazione, cagionata da un' ammasso di nocciuoli di ciriegia, che egli avea ingollati qualche tempo avanti.

STALPART - WANDERWIEL [2] ha veduti degli effetti funestissimi cagionati da un' anello fermato nell' *Esófago* di un bambino di due anni, gli sopravvenne un' estrema difficoltà di inghiottire accompagnata d' angoscia, e dolori violenti. I genitori fecero in vano molti tentativi per tirar fuori l' anello. Gli accidenti continuarono, ed il bambino in capo a sei settimane se ne morì; fu aperto il cadavere, e gli fu trovato l' anello arrestato nell' *Esófago*.

Egli è facile il concludere, che in simili casi bisogna procurar per quanto si può di tirar fuori i corpi estranei, perchè quando riesca, siamo liberi da ogni timore, laddove mandandoli giù, non si è assolutamente sicuri del successo.

Se

(1) Myrrhen. Dec. 3. ann. 9. & 10. Obs. 221.

(2) Cent. 1. Obs. xxii.

Se l' *Esofago* si trovasse talmente turato da corpi estranei, e che fossero sì fortemente intrigati nelle sue fibre, che non si potesse in alcun modo estrarli, e che il malato fosse in un imminente pericolo di restar soffogato per la compressione, che cagionano alla *Trachea*, crediamo, che in un caso sì pressante si potrebbe arrischiare l' operazione della *Faringotomia* per estrarre questi corpi estranei. A quest' effetto si farà come nella *Broncotomia* un' incisione agl' integumenti; indi si separeranno i muscoli *Bronchici*, per iscuoprire destramente l' *Esofago*, e vi si farà un' incisione longitudinale assai grande al luogo, dove si trova il corpo estraneo, per farne l' estrazione. Confessiamo, che questa operazione è difficile; ma è meglio intraprenderla, che aver il dispiacere di veder morire il malato.

Egli è pel solito molto più difficile tirar fuori i corpi estranei arrestati nell' *Esofago*, che spingerli nello stomaco, ed è veramente di molta importanza al Chirurgo il conoscere tutt' i mezzi differenti, che impiegar si possono per l' estrazione di questi corpi, perchè spesse volte un istrumento, che si farà messo in uso con successo in un caso, non avrà effetto in un altro.

Questi differenti mezzi sono le dita, e le mollette, le diverse specie di gancj, e di anelli, le differenti maniere di servirsi della spugna, e i riuedj, che eccitando il vomito, la tosse, lo sternuto ec. posson procurare a quei tali corpi l' uscita, come si vedrà dalle seguenti osservazioni.

## OSSERVAZIONE. XII.

**I**L Sig. de la MORTE [1] fu chiamato a visitare una donna, che aveva in gola una spina lunga due dita, e siccome la toccava facilmente colle dita, pensò che non gli bisognava altro istrumento per tirarla fuori; nulladimeno si trovò molto imbarazzato, perchè la spina entrava con tutti i due capi nelle pareti dell' *Esofago*, onde fu obbligato a spingerla da una parte per liberarla dall' altra, e quindi la tirò fuori facilmente colle sue dita.

OS-

(1) *Obs. Chirurg. Tom. IV. Obs. 332.*

## O S S E R V A Z I O N E XIII.

IL Sig. de la BORDE [1] fece noto all' Accademia, che un certo uomo ingollò un pezzo d' osso ben lungo, e appuntato alle due estremità, il quale restò intrigato nell' alto dell' *Esófago*; furon fatti molti tentativi con un porro per ispingerlo nello stomaco, ma non fu possibile; fu chiamato il Sig. de la BORDE, il quale esaminò ben la gola, e non potè scoprirvelo; vi introdusse un porro, per assicurarsi, come era situato quel pezzo di osso, e lo sentì al basso della *Faringe*; volle tentar di smuoverlo col porro; ma sentendo, che era fortemente intrigato in quella parte, giudicò bene tentare di tirarlo fuori; per tal effetto introdusse le mollette fino al luogo, dove era l' osso, lo prese co' denti di questo istrumento, fece diversi movimenti a destra, ed a sinistra per distrigarlo, e dopo averlo voltato colle mollette per varj versi, finalmente l' estrasse.

## O S S E R V A Z I O N E XIV.

IL Sig. PERROTIN in un' osservazione da esso comunicata all' Accademia Reale di Chirurgia dice, che un uomo venne a pregarlo, perchè gli estraesse un osso, che avea ingoiato in una cucchiajata di zuppa; e che gli era rimasto nell' *Esófago*; questo gl' impediva il parlare, e gli cagionava molto dolore.

Il Sig. PERROTIN lo fece mettere sopra una sedia a testa alta, e piegata all' indietro; gli mise il dito nella *Faringe* più giù, che gli fu possibile; ma non potè sentire il corpo estraneo. Introdusse nell' *Esófago* fino all' osso una *teneta* curva d' argento, con cui fece invano molti sforzi per ispingerlo nello stomaco, ed usò ancora altri mezzi; ma trovò una tal resistenza nell' osso, che rinunziando al partito, che avea preso di mandar giù questo corpo estraneo, ne scelse un altro, che era ben preferibile a questo, e fu di tirarlo fuori; a questo effetto, con un  
 filo

(2) *Mem. de l' Acad. R. de Chir. Tom. 1. Part. 11. pag. 399.*

filo di ferro formò una specie di uncino, lo insinuò accanto all' osso tanto oltre, per potere in seguito nel ritirarlo intrigare l' osso nell' uncino; preso che l' ebbe, ordinò, che fosse tenuto il capo del paziente ben fermo, tirò dolcemente, e unitamente il suo uncino, ed estrasse l' osso.

Il Sig. PERROTIN restò sorpreso della grossezza di quest' osso, che era una vertebra intera del collo di un montone; senza dubbio ei dovette esser molto contento, che gli fossero riusciti vani i primi suoi tentativi, perchè vi era da temere, che un' osso così considerabile, non si fosse fermato nell' *Esofago* verso l' anello del *Diaphragma*, o che cadendo nello stomaco, non avesse potuto passare per il *Piloro*, o per il canale degl' intestini tenui; almeno egli è quasi certo, che sarebbe stato trattenuto dallo *Sfintere* dell' ano, e che avrebbe potuto esporre l' inferno a de' pericolosi accidenti.

I vantaggi dell' uncino, di cui si è servito il Sig. PERROTIN, sono stabiliti da molte osservazioni, nelle quali vedesi quest' istrumento essere stato impiegato con un buonissimo effetto.

RIVIERA [1] dice, che avendo provato in vano di far uscire per il vomito un osso di porco ricoperto d' una carne glutinosa, che si era intrigato nell' *Esofago*, un Chirurgo fece con un filo di ferro una specie di uncino, o di amo, l' introdusse molto avanti nell' *Esofago*, e ritirando con forza estrasse l' osso.

STALPART - WANDERWIEL [2] racconta il buon successo di un istrumento dell' istesso genere di quello, che il Sig. PETIT inventò, formando nella sua estremità un anello atto ad intrigare il corpo estraneo per estrarlo, come si vedrà dalla seguente osservazione.

## OSSERVAZIONE XV.

UN Soldato prendendo del brodo, ingollò nell' istesso tempo un osso considerabile di figura molto irregolare; egli fece il suo possibile per procurare il vomito,

ma

{1} Cent. 3. Obs. 71.

{2} Cent. 2. part. 1. Schol. in Obs. 21.

ma inutilmente quantunque prendesse una gran quantità d' olio ; che non fece altro , che fare scendere l' osso molto più giù . Questo rimovimento del corpo estraneo mise il malato in un imminente pericolo di restar soffogato per lo spazio di un' ora . Il Chirurgo , che fu chiamato per soccorrerlo , non avendo istrumento per tal effetto, il malato ne fece uno da se, con un grosso filo di ferro, che ei piegò in due , ed intrecciò le due branche , ecettuato verso il luogo della curvatura , dove fermò una specie di anello di figura ovale assai grande per intrigarvi l' osso ; introdusse egli medesimo quest' istrumento nel suo *Esofago* , a più riprese , e fu assai felice alla sesta ripresa, e dopo cinque quarti d' ora , che era successo l' accidente, di prender l' osso , che tirò con molta fatica , e dolore , imperocchè l' osso lacerò l' *Esofago* , cagionò de' vomiti biliosi , e un' emorragia assai considerabile . Si può vedere la figura dell' osso , e quella dell' istrumento nel luogo citato *Tavola 14. Fig. 3.*

Per servirsi della spugna è necessario , che i corpi estranei non occupino , che una parte del canal dell' *Esofago* , perchè per ottener l' intento è necessario , che la spugna possa passare al lato del corpo estraneo , e trapassar di là da esso , per poterlo strascinar seco , quando viene a ritirarsi ; e quindi convien sempre regolarsi quanto si può sulla grossezza del corpo estraneo , per dare al pezzetto di spugna una grossezza , che la lasci passare senza molto sforzo su questo corpo ; e bisogna altresì osservare di usar la spugna ben secca , secondo quel che notano molti Autori [1], e dopo averla passata di là dal corpo estraneo , lasciarla qualche tempo nell' *Esofago* , quando il malato possa sopportarla , affinchè dall' umido venga a gonfiarsi abbastanza per riempirne tutto il diametro : si comprende facilmente quanto questa precauzione sia utile per assicurarsi del successo dell' operazione .

OS.

(1) Platerus, Boneti, Polyalth. lib. IV. Cap. 111.

## O S S E R V A Z I O N E X V I .

**I**L Sig. BROUILLARD (1) dice , che un contadino nel mangiar la zuppa con troppa ingordigia , inghiottì un grosso spillo , che gli restò nell' *Esofago* , e vi cagionò immediatamente un gran dolore , accompagnato da infiammazione , e da febbre ; ricorse a un Chirurgo del vicinato , che si servì invano della candeletta , e di altri mezzi , per far calare quel corpo estraneo nello stomaco . Fu chiamato il Sig. BROUILLARD , e da tutti i mezzi , che erano stati tentati , congetturò , che lo spillo era situato in maniera , che non si potea farlo calar nello stomaco , che bisognava anzi procurare di estrarlo . A quest' effetto prese un pezzetto di spugna lunga due pollici , e grossa un dito , la legò pel mezzo con un filo di refe ben grosso , incerato , e ben lungo ; separò i due capi di questo filo , e ne fece passare uno per entro il canale di una grossa tenta di piombo , e lasciò l'altro di fuori lungo la tenta istessa , e ritirandogli a se , fermò strettamente la spugna all' estremità della tenta ; la tutto indi nell' olio di mandorle dolci , [ osserveremo in appresso , che inconveniente sia il tuffar la spugna nell' olio ] e coll' aiuto della tenta l' introdusse nell' *Esofago* . Quando si fu assicurato da un segno , che gli fece il malato , esser' ella passata di là dallo spillo , tenne la spugna al suo luogo , e levò via la tenta ; indi riunendo le due fila , se le avvoltò alla mano , e tirò forte a se la spugna , che venne a portar seco lo spillo .

Convien notare , che la tenta di piombo adoprata dal Sig. BROUILLARD , ha minori vantaggi , che l' osso di balena , di cui ordinariamente si servono in simil caso , per esser questo molto più sicuro , che la tenta di piombo , e molto più flessibile , per potere adattarsi al canal dell' *Esofago* nei differenti movimenti . Osserveremo in oltre , che l' olio non pare , che convenga per ungere la spugna , imperciocchè può impedire , che ella non si inzuppi dell' umido , che essa può trovare nell' *Esofago* , o che se le può procurare con far bere , entrata che sia , dell'

(1) *Mem. de l' Acad. R. de Chir. Tom. 1. Part. II. pag. 414.*

dell' acqua al malato, se pur si possa, come qualche volta è stato effettivamente eseguito, e come lo raccomandano alcuni Autori (1).

VANHORNE (2), e la maggior parte de' Pratici moderni preferiscono, per le ragioni suddette, l' osso di balena alla tenta di piombo, per condurre il pezzetto di spugna nell' *Esofago*. Quello istrumento è [ per quanto si crede ] invenzione del WILLISIO (3); se ne può vedere la figura nella Chirurgia di EISTERO (4).

Quando tutti i mezzi meccanici, de' quali abbiamo parlato, riescano vani per estrarre i corpi estranei fermati nell' *Esofago*, abbiamo ancora un altro espediente, che può riuscire, soprattutto, quando lo stomaco trovasi ripieno di alimenti. Quest' ultimo mezzo consiste nel procurare il vomito, sia, mettendo il dito, o la barba di una penna nella gola, sia, facendo inghiottire dell' olio, o un emetico ordinario.

#### OSSERVAZIONE XVII.

**G**RUELINGIO (5) racconta di un giovane, che essendo a un festino mangiò de' cavoli, e ingollò un piccolo osso, che vi si trovò nascosto, il quale si fermò nell' *Esofago*. L' Autore, che si trovò presente a quest' accidente, diede al giovane fortemente varj colpi sul collo; ma questo mezzo essendogli riuscito vano, il giorno dopo esaminò di nuovo la gola del malato per vedere di scorgere l' osso, ed estrarlo, ma non potè scoprirlo; gli fece ingojare varie cose liquide per mandar giù il corpo estraneo; ma tutti questi tentativi furono inutili; finalmente si determinò a dargli un vomitivo, e per mezzo suo uscì l' osso.

I corpi estranei, de' quali abbiamo parlato, trovansi talvolta fermati tanto in fondo all' *Esofago*, o. talmente

Tom. III.

H

in-

- (1) Platerus, Boner. Polyalth. lib. 4.
- (2) *Spongia ossiculo Balenæ per se satis flexili alligata. Microtechnè. S. 20.*
- (3) *Pharm. rat. Part. 1. Sect. 2. Cap. 1.*
- (4) *Tabul. 21. Figur. 10.*
- (5) *Cent. 12. Observ. 20.*

intrigati nell'è di lui pareti, che non è possibile di estrarli, e cagionano spesse volte de' sintomi estremamente pressanti, che obbligano a spingerli nello stomaco; egli è vero, che questo è un pericoloso rimedio; ma per quanto rischio vi sia nell' appigliarsi a quest' ultimo partito, si può nulladimeno sperare, che non avrà conseguenza così trista, quanto i funesti effetti, che questi corpi producono colla loro dimora nell' *Esófago*. Questa speranza non è senza fondamento; si trovano negli Autori delle osservazioni innumerabili, dalle quali vedesi in fatti, che alcuni corpi estranei molto pericolosi sono stati spinti nello stomaco, e si son incanalati per la via degli intestini, senza cagionare la morte, e neppure disordini troppo notabili, come si vedrà dalla seguente osservazione.

## O S S E R V A Z I O N E XVIII.

**I**L Sig. ENGERRAN dice in un' osservazione data da esso all' Accademia Reale di Chirurgia, che fu chiamato per soccorrere un bambino di 5. anni, che aveva ingollato un nocciolo di pesca, e che trovavasi in grandissimo pericolo per gli accidenti, che gli cagionava nella *Faringe*. Il Sig. ENGERRAN gli mise un dito nella gola, e arrivò a toccare il nocciolo; ma veggendo non esser possibile di ritirarlo per la bocca, lo fece cader nello stomaco. Il bambino restò immediatamente libero dal pericolo imminente, nè risentì più in seguito alcun' incomodo, ed il nocciolo qualche tempo dopo uscì per secesso.

Gli aghi, e gli spilli quando si ingollano, se non presentano prima la punta, possono senza cagionare alcun notabile disordine scorrer tutto il canale intestinale; ma quando questi corpi acuti presentano prima la loro punta, producono degli accidenti, che variano all' infinito.

## O S S E R V A Z I O N E XIX.

**F**AERIZIO ILDANO [1] dice, che una dama avendo inavvertentemente ingollato nell' accocciarsi molti spilli, che aveva in bocca, si sentì immediatamente de' dolori

acu-

[1] Cent. VI. Obs. 36.

acutissimi nell' *Esofago*, che restarono calmati per alcuni rimedj, che le furon fatti; con tutto questo le restò sempre un dolor fisso nell' *Esofago*, soprattutto quando inghiottiva degli alimenti solidi; si sentiva particolarmente dopo il pasto de' dolori pungentissimi in fondo allo stomaco, ed in qualche parte del ventre. Da questi accidenti la Sig. non ne restò libera, che dopo aver resi gli spilli, il che seguì per secesso sei anni dopo.

Non vi è che la speranza sola, che possa provarci che molti corpi estranei di tal natura possano soggiornar tanto tempo nelle prime vie, e non cagionarvi, che degli accidenti sì poco considerabili; e per questo l'osservazione seguente mi è paruto meritar attenzione.

## OSSE R V A Z I O N E XX.

**U**NA ragazza di età di 10. anni rese nello spazio di 15. giorni per secesso più di cinquanta aghi di differenti lunghezze, che ella avea ingollati cinque, o sei anni avanti. PINET [1] che racconta tal fatto, dice, che questa ragazza non sentì per tutto quel tempo, che alcuni dolori interrotti nello stomaco, e nel ventre; e che ella soffrì da varraggio, quando gli rese per secesso, cagionandole de' violentissimi stimoli; la loro uscita fu anche accompagnata da alcune gocce di sangue; ma dopo averli evacuati tutti, questi accidenti si calmarono interamente.

Allor quando la forma de' corpi estranei, o qualche altra circostanza gli fermano in maniera, che non possano estrarsi, ne espellerli per le vie ordinarie, penetrano le parti, aprendovisi de' passaggi, o col produrvi delle infiammazioni accompagnate da cancrena, o da ascesso, pe' quali si fanno strada ad uscir fuori del corpo.

[1] *Zodiac. Medic. Gall. April. 1680. Obs. 5.*

## O S S E R V A Z I O N E XXI.

**M**UYS (1) racconta di un uomo , che nel fumare una pipa , cadde colla faccia innanzi in terra , se gli ruppe la pipa , ed un pezzetto della canna gli restò in fondo alla gola , cagionandogli una grande emorragia ; sopravvenne l' infiammazione con un tumore esterno , che suppurò sotto all' orecchio . Muys aperse l' ascesso , e trovò quel pezzetto di pipa , che avea prodotti tutti quelli accidenti .

Molti osservatori rapportano simili esempi, come sarebbero *Platero*, Lib. IV. Obs. XIII. *Foresto*, Lib. XV. Schol. Obs. XXVIII. *Fabrizio Ildano*, Cent. I. Observ. XXXIII. *Houllier*, Lib. Propr. Observ. XXIV. *Stalpart - Vanderwiel*, Cent. I. Obs. XXI., e tanti altri .

## O S S E R V A Z I O N E XXII.

**P**AREO [2] dice , che alcuni ladri fecero ingollare per forza a un pastore un coltello lungo mezzo piede , col manico di corno ; questo coltello gli restò in corpo circa sei mesi , e gli cagionò vari accidenti pericolosi , e fra gli altri ebbe de' dolori acerbissimi in differenti parti del ventre . Indi cadde in un *marasma*, e se gli formò finalmente un ascesso all' *Inguine* : *GUILLEMET* Chirurgo di *Sommieres* vicino a *Montpellier* gli aperse l' ascesso , e per esso gli levò il coltello , che si presentò al taglio , ed il pastore rimase affatto guarito in brevissimo tempo .

## O S S E R V A Z I O N E XXIII.

**I**L Sig. *VERDUC* [3] racconta , che nell' anno 1697. un contadino di *S. Leu Taverny* Villaggio nella valle di *Mont-*

(1) *Prax. Chirurg. Rational. Decad. III. Obs. VI.*

[2] *Lib. XXV. Cap. XVI. & Schenk. Observ. Med. lib. III. Obs. VII.*

[3] *Patholog. Chirurg. Tom. II. Cap. XXXIII. Artic. III. pag. 318. & Zodiac. Med. Gall. Blegny May 1697. Obs. II.*

*Montmorency* nelle vicinanze di *Parigi* in età di circa 65. anni, forte, e robusto, che aveva dato un po di volta al cervello, ingollò il ferro da affilare di uno strascino, che i macellai, e simil gente, soglion tener sempre a cintola. Questo pazzo se l' ingollò, senza che alcuno se ne accorgesse, e dopo averlo ingollato, non fece il minimo segno di averne incomodo; ed una cosa difficile a crederfi (continua l' Autore) si è, che cinque, o sei mesi dopo se gli formò un ascesso all' *Ipocondrio* destro, pel quale si presentò insieme colla marcia quest' istrumento. Fu estratto con disinvoltura, ed in otto giorni l' infermo fu sanato affatto.

Questa pazza stravaganza, dice il Sig. VERDUC, fu ben tosto seguita da un' altra non punto minore, perchè avendo per caso trovato la zampa di una pignatta di ferro, l' ingollò come aveva fatto dell' affilatojo, senza che la figura disuguale di questo pezzo di ferro potesse fare esprimere a quest' insensato il minimo lamento. La medesima cosa, che era successa la prima volta, seguì anche allora. In capo a sei mesi si formò un ascesso all' *Ipocondrio* sinistro, per dove uscì il corpo estraneo, e l' ascesso con l' istessa facilità si cicatrizzò.

Dice l' Autore, che non fu questa l' ultima stravaganza della pazzia di quel povero uomo. Non si contentò solamente di ingollar di nuovo un coltello da tasca colla sua guaina, che uscì qualche tempo dopo per un ascesso, che si formò alquanto sopra, ed allato alle vertebre de' lombi; il che ebbe un felice successo, perchè il coltello aperse da se l' ascesso nel tempo, che lavorava il terreno. Ingollò ancora in appresso una grande, e grossa botta, che cagionò tanti dolori, che fu obbligato a stimolare il suo stomaco a ributtarla a forza di pugni, che si dette sul ventre, il che però non seguì, se non un' ora dopo averla inghiottita [1].

I corpi estranei, e principalmente gli spilli, e gli aghi si inoltrano qualche volta molro avanti nelle carni, e nel grasso, prima di fermarsi in una parte, e procurarsi esteriormente un' uscita.

H 3

OS.

[1] I Giornali di Medicina pubblicarono in quel tempo questa storia prodigiosa.

## O S S E R V A Z I O N E XXIV.

**I**L Sig. PETIT (1) racconta , che una Signorina fu pregata di liberarla da un corpo estraneo , che l'era restato nella gola nell' inghiottire una cucchiata di zuppa . Fece egli in vano varj tentativi per estrarglielo , ed il giorno dopo ella se lo sentì più basso , al di sotto della cartilagine *Tiroïde* . Ella si servì di un porro, di un manico di frusta di corda , di un osso di balena , e di altro , per procurar di buttarlo giù ; ma tutti i mezzi le riuscirono vani .

Più di un anno dopo quel corpo estraneo si fece sentire vicino all' articolazione delle clavicole collo *Sterno* . Il Sig. PETIT osservò col tatto , che quel corpo era situato per traverso , e ne sentiva le due estremità ; si era tanto accostato alla pelle , che la facea rialzare , e vi formava un' affai visibile prominenza , quando ella torcea il collo dall' altra parte ; in capo a tre mesi il Sig. PETIT riconobbe , che il corpo estraneo si era avanzato nella sostanza adiposa sotto la pelle , che copre la punta della spalla ; propose alla Signorina di estrarglielo , ed ella vi acconsentì ; le fece una piccola incisione , e scoprì uno spillo , che l' estrasse .

Il Sig. RIVALS (2) ci assicura avere estrarro quattro spilli a una Signora , che l' erano penetrati fino al fianco .

Il Sig. le DRAN il padre [3] trovò nel mezzo al braccio di un uomo uno spillo , che era stato ingollato molti anni prima .

Il Sig. le DRAN il figlio [4] ne trovò un altro accanto ad una vena del braccio in occasione di un salasso .

RONDELEST [5] ne ha trovato anche egli uno tutto arrugginito in un ascesso al braccio .

SA-

(1) *Mercur de France*, Novemb. 1721.

(2) *Memoir. de l' Acad. R. de Chirurg.* Tom. I. part. III. pag. 91.

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*

[5] *In Libr. de Aquatil Cap. de Cancr. fluvias.*

SAVIARD (1) ha estratto un ago, che era situato nel muscolo *Deltoides*.

Ma queste specie di corpi estranei vanno talvolta molto più lontane.

Il Sig. PETIT sentì col tatto uno spillo, che era arrivato fino al piede alla radice del dito medio, ed osserva, che non sarebbe stata maraviglia, che rivoltando la punta rimontasse lungo la gamba, e la coscia, perchè la punta fa sempre la strada, e le parti vicine fanno sempre forza per ispingerla.

MOINICHEN (2) racconta di una donna, che avendo inghiottito un ago, non ne risentì alcuno incomodo per lo spazio di quattro anni, verso il termine del qual tempo si sentì un dolor pungente dentro ad una gamba, in cui le comparve un piccol tumore; vi applicò un cerotto di *Aquilon*, ed il terzo giorno il Chirurgo potè colle mollette levarle l' ago dalla punta, colla quale forava la pelle. Un' osservazione somigliante ritrovasi in Bartolino (3).

RODERICO - A - CASTRO (4) ci somministra un caso molto più sorprendente, di un bambino di sei anni, che aveva ingollato un ago, che poi in capo a più di 18. anni gli uscì da se da una gamba.

I corpi estranei appuntati, che si inghiottono, si rendono molte volte per le vie dell' orina, al che deono i giovani Chirurghi star molto attenti, a cagione degli accidenti, che possono produrre questi corpi negli organi per cui passano; per poterne giudicare, e per conoscere quanto questo caso è ordinario, ne riporteremo alcuni esempi, che serviranno di prove.

#### OSSE R V A Z I O N E XXV.

GIULIO CESARE CLAUDINO. (5) racconta di un bambino di sette anni, che ruzzando aveva ingollato un ago da testa della lunghezza di due dita, e che pe'

H 4 due

(1) *Obs. Chirurg. Obs. LXVII.*

(2) *Observ. Med. Chir. Obs. XXI.*

(3) *Barth. Cent. VI. Hist. 99.*

(4) *Lib. IV. de Morb. Mulier. Cap. VI.*

(5) *Respons. Med. 40.*

due primi anni ( perchè quest' ago gli restò cinque anni in corpo ) ebbe de' gran dolori a' reni, e alla vescica; rendè per orina in diverse volte delle piccole pietre, della renella, de' vermi vivi, ed anche una materia nericcia, e puzzolentissima; finalmente questo bambino fu incomodato da una grandissima difficoltà d'orinare, che si convertì in una ritenzion di orina quasi totale. Né i grandi sforzi, che ei faceva per orinare, scopersè all' orifizio dell' *Uretra* un piccolo corpo appuntato, che ei tirò a se, e che si vide, con sorpresa, esser l' ago, che aveva inghiottito cinque anni avanti, sebbene incrostato da una materia gellosa, e pietrosa, di color cenericcio, assai simile nella figura, e nella mole, al nocciolo di una grossa uliva.

In questa osservazione si vede una serie di accidenti, che dovrebbero metterci in gran timore, che simil sorta di corpi estranei non prendano questa strada, quando siamo forzati a fargli cadere nello stomaco; ma ecco in appresso dell' altre osservazioni, che possono assicurare il nostro timore.

### OSSERVAZIONE XXVI.

**DIEMERBROECK** (1) dice, che la sua moglie ingollò uno spillo mediocre nel mangiare, e che lo rese per orina tre giorni dopo, senza il minimo dolore.

**LANGIO** [2] racconta anch' egli di una ragazza, che ridendo, ingollò cinque aghi, che aveva in bocca, e gli rese tre giorni dopo tutti per l' *Uretra*.

Il fatto, che segue, è ancor più notabile.

**ALESSANDRO BENEDETTO** (3) racconta di una ragazza, che disgraziatamente dormendo, ingollò un ago grosso da testa, di cui si serviva per tener su i capelli la notte; lo rese per orina dieci mesi dopo, senza il minimo incomodo.

Suc-

(1) Diemerb. *Anatom. Tom. 1. Chap. XVIII. pag. 218.*

(2) *Lib. 11. Epist. XL.*

(3) *Alex. Benedicti, Anatom. Lib. 111. Cap. 11.*

Succede spesso volte, che gli spilli, e aghi pervenuti nella vescica cagionano delle pietre, servendo di base alle materie atte a petrificarsi [1].

Che questi corpi minuti, e pungenti possano aprirsi insensibilmente un passaggio, ed entrar nella vescica, ne resterebbe molto sorpresi; ma quando sentirete, che si son visti de' pezzetti d' osso, e de' noccioli di alcuni frutti, de' pezzetti di radica di Appio della grossezza di un paolo, de' gambi di orzo, de' granelli d' uva, ec. pigliar la medesima strada, durereste fatica a crederlo, se non bastassero a convincerne le osservazioni seguenti.

# OSSERVAZIONE XXVII.

**P** LATERO (2) nelle sue osservazioni racconta di un uomo, che avendo ingollato, mangiando, de' piccoli officini, gli rendè tutti per l' *Uretra*; e questi per la loro inequaglianza cagionarono un' infiammazione all' intestino *Retto*, che fu seguita dalla suppurazione, e perdita di sostanza; quei piccoli oggetti passarono per quest' apertura nella vescica, di dove uscirono coll' orina.

BARTOLINO [3], e BORELLI (4) raccontano due casi appresso appoco somiglianti.

BARTOLINO [5] parla di un uomo, che avendo ingollato un nocciolo di susina damaschina, ebbe in appref-

(1) *Ved. Binninger. Cent. 1. Obs. xx. Moinich. Obs. Med. Chirurg. Obs. xxii. Tulpius Obs. Lib. 111. Cap. ix. Hildannus, Oper. pag. 710. Transf. Phil. Lister, ann. 1685. num. 168. art. 111. Molyneux, ann. 1700. num. 260. art. 111. Ephemerid. Cent. 1. f. 11. Obs. 94. & Dec. 3. ann. 5. , & 6. Obs. 253. Alex. Benedict. Lib. 11. Anatom. Cap. xxii. Parè, Lib. xxiv. Cap. xix. Jo. Matth. Hess. quest. annex. Cas. 1. Obs. Med. 1. R. Camerac. mem. Cent. vii. part. x. André Brown Obs. de Med. d' Edimbourg. Tom. 14. art. xvi. pag. 360.*

(2) *Toni. 111. Lib. 11. Cap. x. de Mitione, & Cap. xvi.*

(3) *Ephem. Obs. LXXIII. Ann. 2.*

(4) *Borel. Cent. 11. Obs. v.*

(5) *Act. haiffn. vol. v. cap. 105.*

presso una ritenzion di orina per quattro giorni, accompagnata da un vivo dolore alla regione *Lombare* destra, che fu curata come una colica *Nefritica*; in capo a quattro giorni rendè il nocciolo per l' *Uretra*, e nel medesimo tempo usciron l' orine in grande abbondanza.

Nell' *Efemeridi* (1) si trova un caso poco dissimile, di uno, che avendo ingollato molti noccioli di fusine, gli rendè qualche tempo dopo per la medesima strada.

Non staremo a parlare d' un nocciolo di pesca, che nell' istesse *Efemeridi* all' istesso luogo [2] si dice, essere uscito anch' esso per l' *Uretra*, acciocchè non sembri, che siamo troppo creduli; nulladimeno, per non contraddire ad alcuno, si può supporre, che un nocciolo di pesca de' più piccoli, ed un canal dell' *Uretra* de' più grandi si sieno incontrati: in fatti succede sempre per cagione di simili combinazioni, che il caso è il padre de' più maravigliosi, e straordinari fenomeni.

GIULIO ALESSANDRINO [3] ha osservato, che de' pezzetti di radica di appio della grossezza di un paulo, mangiati il giorno innanzi, furono resi per la via dell' orina.

NICCOLA FIORENTINO (4) racconta di un uomo, che avea ingollato de' funghi senza masticarli bene, e ne rendè per orina de' pezzi ben grossi.

PLUTARCO [5] scrive l' istoria di un uomo, che dopo una lunga difficoltà di orinare, gettò per la verga un gambo d' orzo co' suoi nodi.

GIORGIO VESCHIO [6] racconta di un uomo, che era solito a render per orina de' granelli di uva, de' pezzetti di lattuga, ed altri alimenti, dopo avergli mangiati.

Cre-

(1) *Dec. 111. ann. 2. Obs. 150.*

(2) *Ibid.*

(3) *Anatom. Chap. XIV. de la substance des facultes naturelles.*

(4) *Serm. IV. tr. IV. Chap. XXIX. & Diemerbroeck, Anat. Tom. 1. pag. 218.*

[5] *Liv. VIII. des propos de Table, probl. 1x.*

[6] *Obs. 1x.*

Crediamo inutile il rapportare altri esempi di corpi estranei renduti per urina; chi avrà la curiosità di vederne in maggior numero, potrà consultare *Scalpart - Wanderviel*, Cent. 11. Obs. 18. *Bartholin. Act. haffn.* Tom. v. Cap. 105. *Mizaldo*, Cent. 1. Aphor. 111. *Thonero*, lib. 111. Observ. 11. *Bonet. Medicin. Septentr.* lib. 111. Sect. xxix. Cap. xxv. e seg. le *Efemeridi Dec.* 11. ann. 1. Observ. 142. & 168.

Come questi corpi passino dalle prime strade nella vescica, sembra facile a spiegarsi. L'anatomia ci insegna, che essi possono aprirsi in molti luoghi delle strade di un corto passaggio; ma egli è ben difficile a determinare in qual parte degli intestini questi corpi più facilmente si portino ad aprirsi un sentiero; quelli però, che hanno desiderio di spiegar questo fenomeno, passino sopra questa difficoltà, e decidono. Il caso, di cui si tratta, presenta loro delle verisimiglianze troppo lusinghevoli per non lasciarsi sedurre. GIULIO CESARE CLAUDINO (1) crede, che questi corpi forino l'intestino *Ileo*, là dove tocca il fondo della vescica vicino all'osso *Pube*, oppure l'intestino *Colon* nella parte, che passa dietro alla vescica, nella cavità dell'osso *Sacro*; ma abbiamo visto dalle osservazioni di *Platero* (2), *Bartolini* (3), e di *Borelli* [4] sopraccitati, che i corpi estranei, de' quali essi parlano, si aperfero un passaggio pel *Recto* per entrare nella vescica.

Gli aghi, e gli spilli, stati molti anni a penetrare fino nella vescica, non favoriscono nemmeno essi il parere di CLAUDINO, perchè si vede in tal caso, che questi corpi non prendono la via più corra; e da questo si conosce, come le spiegazioni, che hanno più verisimiglianza, e sembran le meglio fondate in congetture, sono molte volte incerte, ed inutili; e quanto hanno ragione di disprezzarle gli uomini saggi, quando non siano provate decisivamente da' fatti. Non usiamo però negare, che non possano questi corpi passar pe' luoghi  
fe-

(1) *Respons. Medicin.* 40.

(2) *Tom.* 111. *Lib.* 11. *cap.* x. *de Mictione*, & *cap.* xvi.

(3) *Ephem. Oby.* 73. *ann.* 2.

[4] *Cent.* 11. *Obs.* v.

segnati da CLAUDINO; ma ciò non basta; questa possibilità non stabilisce, e non determina la realtà di una cosa, che può accadere, e che in fatti accade differentemente .

Il maraviglioso è lo scoglio, in cui si imbattono i dotti, e gli ignoranti; gli uni determinati a non creder nulla alla cieca, negano tutti i fatti, che non possono comprendere; gli altri, che ammirano tutto, e che non conoscono l' impossibilità, credono tutto senza discernimento: condotti da parte, e d' altra, con de' pregiudizj differenti, danno negli estremi opposti; una cieca credulità abbraccia gli errori i più grossolani, e una caricata diffidenza rigetta decisamente molte verità di fatto, assicurate da una testimonianza capace di fare almeno dell' impressione negli spiriti non prevenuti.

Che si può egli ragionevolmente opporre alle prove, che certificano i fatti da noi riportati, e che stabiliscono almeno la possibilità di molti altri contestati da varj Autori, che meritano altronde tutta la nostra credenza?

Molti celebri osservatori raccontano la storia di un flauto lungo quattro pollici, che fu ingollato, e che cagionò varj pericolosi effetti, e che finalmente fu reso per l' ano .

#### OSSERVAZIONE XXVIII.

UN giovane sonando il flauto ricevè uno schiaffo da uno de' suoi compagni, che glielo fece entrare in gola in maniera, che non potè ritirarsi in tempo da impedirlo di introdursi nell' *Esófago*, dove si arrestò qualche tempo, e cadde in seguito nello stomaco, dove si sentiva dal lato destro a traverso degl' integumenti del ventre . Questo flauto gli cagionò per tre giorni de' dolori acerbissimi, e gli impedì il bere, il mangiare, e il dormire; ma finalmente si incanalò per la via degl' intestini, ed egli fu abbastanza fortunato a renderlo per secesso .

Quest' istoria è principalmente riportata a lungo da OLAO WORMIO; *Musci Lib.* VI. *Cap.* IX. da STALPART-WANDER-WIEL, *Cent.* I. *Schol.* in *Obs.* XXI. e da BARTOLINO, *Cent.* I. *Histor.* LXIX. colla figura del flauto rappresentata nella sua grandezza naturale .

Fa.

FORESTO (1) racconta di un uomo, che ingollò un pezzo di legno grosso, e lungo quanto un dito, e che uscì anche esso per secesso, dopo esser rimasto in corpo più di un anno.

I coltelli, ed altri simili istrumenti inghiottiti non sempre forano lo stomaco, o gli intestini per manifestarsi esteriormente formandovi degli ascessi; s' incaminano talvolta nel canale intestinale, e sono spinti per l' ano senza cagionar alcun disordine considerabile.

#### OSSERVAZIONE XXIX.

TYZON (2) dà la storia di un ballerino nominato *Sichard*, che ingollò, in presenza di molti Milordi Inglese, una lama di spada lunga due braccia, che egli fracassò avanti in più pezzi: qualche tempo dopo ingollò in presenza del Re d' Inghilterra due coltelli, ed un rasoio; il Re sospettando qualche inganno ordinò, che se gli legassero le mani dietro il dorso, e Sua Maestà stessa gli mise uno di quei coltelli nella bocca: questi istrumenti furono resi tre giorni dopo per l' ano.

#### OSSERVAZIONE XXX.

AMBROGIO PAREO [3] racconta di un buffone, che ingollò un pezzo di punta di spada tagliente, lungo tre dita in circa, e dodici giorni dopo lo rese per secesso; ma che gli produsse degli accidenti considerabili, e non lo rese, che con grandissima difficoltà, e con de' dolori violentissimi.

MONTUUS [4] racconta un fatto quasi simile, se non che alquanto più rimarcabile, perchè il pezzo della lama della spada era lungo nove dita traverle.

Dopo tutti questi fatti non reherà maraviglia, che altri corpi ancora, come sarebbero cesoje, forchette, cuochiaj

(1) *Decad. 2. volum. 4. Obs. 11. pag. 79.*

(2) Boneti, *Med. Sept. lib. 3. de Æsoph. affectib. sect. 1. cap. 19.*

(3) *Lib. xxv. Cap. xvi.*

(4) *Lib. 1. Tom. 111. Anasc. Morb.*

chiaj ee. , possano scorrere per il canale degli intestini, e ufcir fuori dall' ano .

### OSSERVAZIONE XXXI.

**L**ANGIO [1] racconta di un epilettico, che in un accesso della sua malattia ingollò un pajo di cefoje moltissimo appuntate, lunghe quattro dita, e più di due dita larghe, che gli erano state messe fra i denti; affinchè non si mordesse la lingua. Queste cefoje in capo a nove giorni uscirono per l' ano, senza che in tutto quel tempo ne risentisse egli alcuno incomodo; mangiava, e beveva al suo solito, e non usò altro rimedio, se non che di tanto in tanto qualche bevuta di olio d' oliva .

Nell' Eferueridi [2] d' Alemagna si trovano molti casi in questo genere quasi somiglianti .

Il Sig. le GENDRE primo Chirurgo del Re di Spagna, ha dato all' Accademia Reale di Chirurgia l' osservazione seguente [3] .

### OSSERVAZIONE XXXII.

**I**L detto Autore racconta, che un Uffiziale Spagnuolo, il dì 27. di Marzo del 1714. ingollò una forchetta di argento da tavola, nell' atto, che col manico di essa si flava nettando la radice della lingua; gli scappò la forchetta, gli entrò nell' esofago, e pel suo proprio peso cadde nello stomaco. Allora fu, che ei ne risentì i primi accidenti, e i dolori continuarono in diverse parti del ventre per lo spazio di quindici mesi; ma il dì 20. Giugno 1715. sentì de' dolori vivissimi, che corrispondevano all' Inguine sinistro, accompagnati da un flusso di materie glutinose, biliose, e putride. Questi ultimi dolori non durarono più che cinque giorni, in capo a quel tempo l' infermo rendè per secesso [ senza quasi il minimo dolore ] quel corpo estraneo; che uscì nero, e ronchioso in

(1) *Zodiac. Medic. Gall. Iulli. 1680. Obs. VIII.*

(2) *Dec. 2. ann. 8. Obs. 208., & Dec. 2. ann. 4. Obs. 23.*

(3) *Journal des Sçavans, année 1716.*

in tutta la sua estensione, e come zigrinolo, e avea perduto molto del suo peso.

• O S S E R V A Z I O N E XXXIII.

**P**LATERO (1) racconta di un uomo ubbriaco, che nel mangiar del lattè ingollò un cucchiajo; perchè nel tempo, che lo teneva in bocca, gli fu dato un colpo, che glielo fece entrare in gola, donde cadde ben tosto nello stomaco, e cagionò in breve tempo de' dolori, delle punture, e delle trafitte nel ventre; ma il giorno appresso con molto stento gli uscì per l' ano.

I corpi estranei, che si sono spinti nello stomaco, e che passano pel canale degl' intestini, spesse volte si fermano nell' ano, ove cagionano del dolore, dell' infiammazione ec. I giovani Chirurghi essendo chiamati per simili casi, e avendo scoperto la cagione di simili accidenti, deono subito rimediarvi coll' estrarre quelli corpi.

O S S E R V A Z I O N E XXXIV.

**I**L Sig. QUESNAY (2) racconta la storia di un osso, che essendosi fermato nel basso dell' *Esofago*, lo spinse nello stomaco, e qualche tempo dopo il corpo estraneo si presentò verso l' orifizio del *Retto*: il malato stimolato da dolori, chiamò il Sig. QUESNAY, che immaginandosi la cagione del suo male, introdusse il suo dito nell' ano, e sentì l' osso, che era coricato obliquamente, e intrigato dalla sua estremità inferiore nelle pareti del *Retto*; insinuò sul dito le mollette, e afferrò quest' osso più vicino che potè alla sua estremità superiore, lo spinse più in su per isciogliere l' estremità inferiore intrigata nella parete del *Retto*, indi lasciò l' osso per pigliarlo più basso colle mollette medesime, e lo estrasse senza cagionare il minimo dolore.

OS.

(1) *Cent. III. Lib. II. Cap. VI.*

(2) *Memoir. de l' Acad. R. de Chir. Tom. I. Part. III. pag. 71.*

## O S S E R V A Z I O N E XXXV.

**I**L Sign. FAGER (1) fu chiamato anche esso per visitare un uomo, che si lamentava di dolori vivissimi nell' ano ; egli avea tutti i sintomi di un' infiammazione del basso ventre ; la tensione , e i dolori erano considerabili nella regione della vescica , e tutti questi accidenti erano accompagnati da ritenzion d' orina : si erano già fatti al malato prontamente sette, o otto salassi ; e de' bagni , e gli applicavano sul ventre , e all' ano delle samente , e de' cataplasmi emollienti . Il Sig. FAGER , che vide allora per la prima volta il malato , portò il suo dito nell' intestino Retto : insinuandolo di là da' muscoli Rilevatori dell' Ano , sentì un corpo duro , che era foriermente attaccato all' intestino , e situato quasi trasversalmente ; egli introdusse delle mollette , colle quali afferrò il corpo estraneo , e l' estrasse assai facilmente ; era un osso di monitione della grossezza di una penna da scrivere , e lungo diciassette linee , e acuto dalle due estremità : il malato l' avea inghiottito otto giorni avanti nel mangiare della carne battuta .

## O S S E R V A Z I O N E XXXVI.

**I**L Sig. SAVIARD (2) racconta, che fu chiamato per visitare un uomo, che risentiva de' dolori all' ano , e che credeva cagionati da una fistola . Il Sig. SAVIARD esaminò tutta la circonferenza dell' ano , e non vi osservò nè infiammazione , nè tumore , ma bensì una piccola durezza molto profonda nell' ano ; v' introdusse il dito indice, col quale sentì un osso ; prese una specie di mollette , le insinuò nell' ano coll' ajuto del suo dito fino al corpo estraneo , lo afferrò , colla intenzione di estrarlo ; ma essendo questo corpo ritenuto dalle sue punte , che si trovavano intrigate nelle grinze del Retto, egli fu obbligato per estrarlo , di incidere avanti l' intestino ne' luoghi, dove

(1) *Memoir. de l' Acad. R. de Chir. Tom. 1. Part. 111, pag. 72.*

(2) *Obs. Chirurg. Obs. LXVI.*

ve l'osso si trovava arrestato dalle sue punte; e indi lo estrasse con facilità. Il malato fu prontamente guarito dopo l'operazione dalle incisioni fatte all'intestino, per mezzo di alcune iniezioni vulnerarie, che si fecero nel Retto.

Vi sono talvolta de' corpi estranei, talmente imbarazzati nella *Faringe*, che non possono estrarsi, nè spingerli nello stomaco, e producono talvolta degli accidenti pressantissimi, che se il malato si trova in quel tempo senza soccorso, è sicuro di perdere la vita. In tal caso convien risolversi a far l'operazione della *Broncotomia*, secondo ciò che abbiamo detto, quando ci si presentò l'occasione di parlarne.

I corpi estranei, che si ingollano, passano talvolta per l'*Esophago* facilissimamente nello stomaco; ma sia che essendo troppo grossi di mole, o sia per qualche altra circostanza, non possono incanalarsi per la strada del *Piloro*, per entrar negli'intestini; e in questo caso i Chirurghi devono avere il coraggio di far delle operazioni le più spaventevoli, quando anche ne fosse dubbioso il successo. Convien loro aprirsi un passaggio là dove il corpo estraneo si fa sentire, o per mezzo del tatto, o per mezzo del dolor fisso, che vi cagiona, per andare a cercarlo nello stomaco ancora, dov'è rinchiuso, pronto a produrre la morte.

Le innumerabili guarigioni di ferite considerabili dello stomaco, che troviamo negli osservatori (1), e la

*Tom. III.*

I

quo-

- [1] *Albucasis lib. 2. Meth. Med. cap. 403. Christoph. à Vega Comm. ad Aphor. Matth. Cent. quest. Med. 21. Matth. Cornax. epist. respons. ad D. Ægid. de Hertoge Med. Doct. Fallopius de vuln. cap. 12. Jul. Alex. Annot. ad lib. 6. cap. 4. therap. Galen. Schenk. lib. 3. Obs. 122. Diemerbr. Anat. lib. 1. cap. 6. Bern. Suevus, de insp. vuln. Sennert. prax. lib. 3. sect. 1. cap. 14. Bohnius de renunc. vuln. lethal. Manger, Biblioth. Chirurg. Stalp. Wand. Wiel. Cent. 1. Obs. 39. Jacob. Ætheus lib. Obs. prop. Joann. Franc. Hildesius. Med. Camenicens. Scultet. Obs. pag. 100. Barthol. Cent. 1. Hist. 24. Wolfius, Obs. Chir. Med. Obs. 27. Felix Platerus, Le Dran, Obseru. Chir. Tom. 11. Obs. 89. Ephes.*

quotidiana esperienza devono ancora autorizzarci ad intraprendere una tal' operazione : in fatti , se le ferite fatte in diverse parti di questo viscere da istrumenti pungenti , taglienti , e comprimenti , ed anche da atmi da fuoco , non hanno fatto morire il ferito , e se sono state al contrario perfettamente guarite , perchè non si dovrà sperare un successo così felice da un taglio fatto con arte da un istrumento ben affilato ? Ecco in appresso alcuni esempj notabili del buon successo di tal operazione arrecati da parecchj Autori .

## O S S E R V A Z I O N E XXXVII.

UN contadino (1) Prussiano sentendosi qualche dolor di stomaco , si mise nella gola molto avanti un manico di coltello per eccitare il vomito ; ed il coltello , che ei solamente teneva per la punta , gli scappò di mano , e gli entrò nell' *Esófago* , dove rimase per qualche tempo , cagionandogli de' gran dolori ; spaventato il contadino dal pericolo , in cui si vedeva , volle provar di fare uscire il coltello con farsi tenere col capo all' ingiù ; ma riuscendo inutile il tentativo , bevve della birra in gran quantità ; perlochè il coltello cadde nello stomaco . Allora il contadino si trovò in peggior stato , e consultò tutti i Medici , e Chirurghi di *Konisberg* , i quali finalmente conclusero , che per prevenir gli accidenti pericolosi , a' quali era esposto , conveniva fare un' incisione agl' integumenti del ventre , e allo stomaco , per levarne quel corpo estraneo .

L' infermo era giovine , e risoluto di sottoporsi a tutto , per uscir dal pericolo ov' era ; si dice che fu disposto all' operazione con un leggiero purgante , e con de' rimedj oleosi , e balsamici . Gli fu applicato alla regione dello stomaco un cerotto di calamita , e fu scelto a far l' ope-

*Ephemerid. Dec. 2. ann. 1. Obs. 26. , & Dec. 1. ann. 10. Obs. 131. Zodiac. Medic. Gall. Elegny. Octobr. 1680. Obs. 2.*

- (1) *Histoire de Prusse Part. 11. Chap. 11. Cluverus, Epitom. Histor. lib. 11. Append. Ephemerid. Beckerus , Dec. 2. ann. 5. , & 8. Obs. 167.* \*

L'operazione DANIELO SCHWABEN Chirurgo litotomo , il che seguì in capo a un mese, e mezzo dopo il primo accidente ; fu legato l' infermo sopra un asse , e fu segnato coll' inchiostro il luogo , ove doveva farsi l' incisione , che fu allato all' *Ipocondrio* sinistro . Gli fu fatta un' incisione di due dita per lo lungo , tagliando nel medesimo tempo la pelle , i muscoli , ed il *Peritoneo* ; fatta quest' incisione , non si scopersè subito lo stomaco , perchè essendo vuoto era molto avvallato ; ma il Chirurgo l' aggranciò con un ago curvo , e lo tirò a se ; venne in tal guisa ad accostarsi anche il coltello , e se ne scopersè facilmente la punta fra le membrane dello stomaco ; il Chirurgo fece un' incisione nel luogo dove ella compariva , e n' estrasse prontamente il coltello , che era lungo dieci dita .

Gli Autori , che rapportano quest' istoria , dicono , che estratto appena il coltello , gli orli della ferita dello stomaco vennero a riaccostarsi esattamente , si riunì la ferita degl' integumenti con una sutura incavigliata , come nella *Gastrotomia* , vi si stillarono sopra alcune gocce di balsamo di *Spagna* , e vi si applicò sopra un difensivo . L' infermo osservò una regola di vivere assai esatta , prese de' brodi vulnerari , e balsamici , ed alcuni cristeri lenitivi ; non gli sopravvenne quasi alcun' accidente , e in breve tempo restò perfettamente sanato . Si conserva ancora nella Biblioteca Elettorale di *Konigsberg* questo coltello , ed il ritratto del contadino , a cui successe un tal caso .

Molti simili esempj si trovano in parecchi osservatori .

Leggesi nelle Transazioni Filosofiche della Società Reale di *Londra* (1) di un Tedesco , che avendo ingollato un coltello , gli restò diciassette mesi nello stomaco , e che n' uscì finalmente da un ascesso , che si formò nell' *Ipocondrio* sinistro .

CROLLIO (2) dice aver visto a *Praga* un contadino , che giocando all' osteria , ingollò un coltello lungo die-

12

ci

(1) *Transf. Philos. ann. 1696. num. 219. art. 2.*

(2) *In Praef. Chym. regal. Basil. Ephemerid. Dec. 2. ann. 10. Obs. 1.*

xi dita, che restava alquanto sopra al fondo dello stomaco al lato sinistro, e il manico verso la spina del dorso; in capo a due mesi fu estratto felicemente il coltello per mezzo di un' incisione allo stomaco fatta da FLORIANO MATHIS primo Chirurgo dell' Imperadore; l' infermo fu ristabilito in breve tempo, senza che gli rimanesse alcun incomodo.

Nell' Efemeridi d' *Alemagna* (1) si racconta di una donna Prussiana, che disgraziatamente anch' essa ingollò un coltello lungo sette dita, volendoselo introdurre in gola per eccitarsi il vomito. Le uscì di mano la punta per cui lo teneva, e gli restò confitta nell' alto del palato. Tentò invano di levarselo; ma si affondò sempre più nell' *Esófago*, e cadde finalmente nello stomaco, dove stette tre giorni senza cagionarle quasi il minimo dolore; ma in appresso cominciò ella a sentire delle trafitte, e poco dopo si scopersè al tatto la punta del coltello dalla parte sinistra, e crescendo sempre più i dolori, fu quella donna costretta a cercar soccorso, e a ricorrere al Dottore HUBNER a *Rastemburgo*, che dopo una matura riflessione, assicurato da un gran numero di esempj di ferite allo stomaco felicemente sanate, e da alcune simili operazioni riuscite già molte volte, l' undecimo giorno dell' accidente le fece un' incisione all' *Ipoconario* sinistro, dove corrispondeva la punta del coltello, che ei trovò aver già forato lo stomaco, e aver promossa una piccola suppurazione alla ferita di questo viscere. HUBNER con delle piccole mollette estrasse il coltello, e l' inferma in breve tempo restò guarita.

BERNARDO DI SUAUBE (2), CROLLIO (3), e SENNERT (4) fanno altresì menzione di un uomo, che avea ingollato un coltello. Questo era un contadino di *Boemia*, che nell' anno 1601. ingollò a *Praga* un coltello lungo nove pollici, il quale dopo esser restato sette settimane nel suo stomaco ne uscì da un' apertura, che si fece da se, ed il malato fu in appresso perfettamente guarito.

GIOR-

[1] *Cent. ix. ann. 1720.*

[2] *De Inssect. vulgerv.*

[3] *Prax. Basilic.*

[4] *Prax. lib. 1. Part. 1. sect. 1. cap. 15. pag. 398.*

GIORGIO LOTHUS, e ROGER HEMPSING, dicono [ in un Trattato particolare in lingua tedesca ] aver veduto un giovine in età di 22. anni, che nell'anno 1645. a *Royauxmont* in *Prussia*, nel mese di Maggio, ingollò per accidente un coltello lungo più di due palmi; il manico scendendo il primo, cadde nello stomaco, e che sei settimane dopo gli fu estratto da un Chirurgo per mezzo di un' incisione fatta a questo viscere. Il malato guarì in appresso perfettamente in capo a un mese. Questo coltello fu dato in appresso da DANIELLE BECHERO Medico di *Danzie* al Dottor OTTONE HUERNIO Professore d' Anatomia, e di Medicina nell' Accademia di *Leiden*, dove lo conservano ancora al dì d' oggi nel Teatro anatomico fra un' infinità d' altre cose curiose, e rare.

Tutti questi esempj devono incoraggiare in simil caso il Chirurgo a venire all' operazione, poichè pel di lei mezzo si tolgono gl' infermi dalle mani di una morte inevitabile.

Si deve nulladimeno osservare, che il buon successo delle sopradette operazioni ha dovuto dipendere in gran parte dal luogo dello stomaco, in cui si è fatta l' incisione, perchè non vi è dubbio esser molto pericoloso l' aprirlo, o alla parte superiore, o in fondo, per cagione de' vasi, che dominano lungo la grande, e la piccola incurvatura di questo viscere.

Conviene ancora osservar le differenti situazioni, che prendono le dette incurvatures, secondo che lo stomaco è ripieno, o vuoto; imperciocchè essendo ripieno, la sua grande incurvatura si fa, che sporge innanzi, e la piccola si ritira indietro; e allora che è vuoto, si raggruppa, e in conseguenza i vasi delle due incurvatures si trovano poco distanti gli uni dagli altri. Crediamo, che tornerebbe bene, per evitare gl' inconvenienti, che si incontrano in questi due casi, non far l' operazione, nè quando lo stomaco è troppo pieno, nè quando è troppo vuoto; ma allora che è mediocrementemente ripieno, perchè in tale stato il di lui fondo non si presenta abbastanza per esporre ad esser aperti i vasi, che vi dominano, e i suoi lati hanno un' estensione maggiore, che quando lo stomaco è vuoto. Per istenderlo mediocrementemente, si può far prendere all' infermo una quantità sufficiente di brodo, e far l' incisione agl' integumenti, a fine di scoprir questo viscere.

re. Si può altresì cominciare a forarlo con un *Troicart*, dilatar la ferita da un lato, e dall' altro, che vale a dire, scanfare di introdur l' istrumento verso la parte superiore, o verso il fondo dello stomaco, per timor d' intaccare i vasi.

Per procurar l' esito de' corpi estranei arrestati nella trachea servono talvolta tutti i rimedj, che possono eccitare il vomito, la tosse, e lo starnuto, come si vedrà dalle osservazioni seguenti.

### OSSERVAZIONE XXXVIII.

**H**AGENDORN [1] racconta di una ragazza, che mangiando delle fusine, ingollò un nocciolo, che per disgrazia le sdruciolò nella trachea, e la mise tosto in un imminente pericolo di restar soffogata; la sua voce era fiacca, e rauca, e gettava per bocca delle flemme tinte di sangue. Ricorsero immediatamente a' rimedj oleosi, e pettorali, ed anche a' vomitivi, ma invano; finalmente le fu dato un rimedio acrimonioso all' estremo, e irritante, che le risvegliò una tosse violentissima, ed agevolò l' uscita di quel nocciolo fuori della trachea.

### OSSERVAZIONE XXXIX.

**R**IEDLINO (2) ci dà anch' egli la storia di un giovanetto, a cui in distanza fu gettato in bocca un pisello, che gli entrò nella laringe, e gli cagionò immediatamente una grandissima difficoltà di respiro, e una tosse delle più violente. Gli fu data subito a bere una buona dose d' olio, che gli mosse il vomito, e procurò l' espulsione del pisello.

SO-

[1] Bonet. *Med. Sept. lib. II. de Oris affect. Sect. 9. Cap. 2.*

[2] Bonet. *Med. Sept. lib. VII. Paraleipom. ad lib. II. Sect. VII. Obs. I.*

OSSERVAZIONE XL.


L' Istesso Autore (1) racconta ancora di un bambino, che ingollò un piccolo ossetto, il quale gli entrò nella trachea, e RIEDLINO essendo arrivato appunro in tempo a foccorrerlo, gli soffì nel naso con forza della polvere di mughetti, la quale gli eccitò degli starnuti violenti, che fecero uscire il piccolo osso.

MUYS (2), e VERDUC (3) hanno potuto anche essi con felice successo espellere i corpi estranei restati nella trachea, con procurare lo starnuto, ed il vomito. Quest' ultimo non si dimentica al suo solito di inculcare i rimedj diaforetici, e volarili, che ei crede propri in simil caso a dereterminare gli spiriti animali, a scorrere in abbondanza a i muscoli della laringe per espellerne i corpi estranei in essa arrestati. Il Sig. VERDUC nel luogo cirato propone altresì di far ingojare al malato dell' olio di mandorle dolci, e de' bocconi di burro fresco: questi medicamenti, dice egli, potranno giovare, perchè dolcificando, e lubrificando i passaggi, il corpo estraneo potrà più facilmente uscire negli sforzi, che farà il malato per riburrarli; ma se questi rimedj oleosi, ed untuosi non bastano, ci consiglia ricorrere prontamente agli emetici per eccitare sforzi più violenti, e più frequenti. I linimenti grassi, e le unzioni fatte sul collo, e lungo la trachea possono ancora, secondo il medesimo Autore, esser vantaggiose per raminorbidire i muscoli, e le cartilagini, e per facilitar l' uscita de' corpi estranei, che minacciano di soffogare i malati.

(1) *Ibid. Scholion.*

(2) *Obs. Chir. Dec. VII. Obs. IX.*

(3) *Parabul. Chir. Tom. II. Chap. XXIX.*



# DELL' ANGIOTOMIA,

O S I A

## TRATTATO

*Del Salasso, o della Cavata del Sangue.*

**I**L Salasso, o la Cavata di sangue è un' operazione, per mezzo della quale si fa un' apertura a un vaso sanguigno, con una lancetta per tirare una porzione di sangue dalla sua massa.

L' origine del salasso è oscurissima, ed è così antica quanto la medicina; esso praticavasi avanti IPPOCRATE; e avendone questo grande uomo conosciuto molto bene l' utilità, ei lo consiglia in diverse malattie, e confessa averlo fatto spesso volte con felice successo. GALENO, racconta, che una capra molto sottoposta ad una infiammazione dell' occhio, essendo stata ferita da un ramo di un albero, che le fece spargere molto sangue, trovossi per tal mezzo guarita. Se crediamo a PLINIO, l' Ippopotamo, o il cavallo marino, quando trovassi troppo ripieno di sangue, se ne va sulla riva del Nilo a strofinarsi il ventre alle punte delle canne nuovamente tagliate, e quando i suoi vasi sono sufficientemente vuotati, si avvolta nel fango per turar le ferite fattesi.

Ma poco importa il sapere a chi dobbiamo l' invenzione di una sì utile operazione, di cui gli effetti sono così ammirabili, quanto è oscura la sua origine.

Vi furono però tuttavia de' Medici tanto antichi, quanto moderni, come ERASISTRATO, PARACELSO, VAN-HELMONT, PORZIO, BONTEKOE, GEHEMA, ed altri, che stimarono quest' operazione, come estremamente pericolosa, ed illecita, e che diedero a coloro, che la mettevano in pratica, il nome di struggitori, e macellai del genere umano. Ma checchè ne dicano questi Autori, la quotidiana esperienza ci dimostra, che tutti gli

obbietti loro sono deboli, e ingiusti, e che non v'è rimedio in medicina più efficace, e più atto del salasso, e che reca un più pronto soccorso per guarire, o per prevenire le malattie, quando esso è fatto a tempo, e con prudenza.

Due sorte di cavate di sangue vi sono, una si fa alle vene, si nomina *Flebotomia*; e l'altra alle arterie, e chiamasi *Arteriotomia*. Quest'ultima non si pratica se non che all'arteria temporale, e dietro le orecchie, ove le arterie hanno un punto di appoggio sul cranio, per facilmente comprimerle. In ogni altro luogo l'apertura dell'arteria è pericolosissima, ed anche mortale; essendovi un gran numero di esempi di persone morte per aver preso nel cavarle sangue un'arteria per una vena.

L'*Arteriotomia* reca sovente un pronto sollievo ne' gran dolori di testa, nell'emicrania, nella cefalalgia, nelle vertigini, nel letargo, ec.

FERNELIO [ 2. 18. ] SEVERINO ( *Effic. med. part. II.* ) TULPIO ( *obs. 1. 48.* ) e CATHERWOOD, hanno fatto i loro sforzi per introdurre l'uso dell'*Arteriotomia* ne' casi d'apoplezia, e preferirla alla *Flebotomia*; ma non hanno avuti seguaci.

### *Dell' Arteriotomia nell' Arteria Temporale .*

Per aprire l'arteria temporale, essendo quella, che ordinariamente si apre, non si applica la legatura; si sente col dito indice una delle sue branche, che si tiene fiso col pollice della mano sinistra, e si apre nell'istessa maniera, che la vena nella *Flebotomia*. Per quest'operazione, alcuni preferiscono l'uso del gammaut, in vece della lancetta.

Il sangue, che viene dall'apertura dell'arteria, è vermiglio, ed esce per iscosse, che corrispondono all'azione delle tuniche delle arterie, cioè a dire a' moti, di *Sistole*, e *Diastole*. Quando si è cavata la quantità di sangue sufficiente, si riaccostano le labbra dell'incisione, e si mettono sopra tre, o quattro piccole compresse graduate, la prima delle quali avrà un pollice in quadrato, e le altre via via più grandi a proporzione, acciocchè  
la

la compressione sia più forte. Si manterranno queste compresse colla fasciatura chiamata solare. Per farla, si prende una fascia lunga dodici braccia, e larga tre dita avvolta a due capi. Si pone il mezzo della fascia sulle compresse, conducendo i due capi alquanto obliquamente intorno alla testa, di maniera che uno de' capi faccia un giro circolare sulla fronte, e l'altro sull'occipitale, e si ritorna sopra la parte offesa, dove si incrociano i capi formando una specie di nodo, simile a quello che fanno i legatori. Si conduce indi uno de' capi per di sotto al mento, e l'altro sulla sommità della testa, per discendere dal lato opposto sotto il mento, ed in appresso sulla parte offesa. L'altro capo, che era stato condotto sotto il mento dal lato della parte offesa, si fa ascendere dal lato opposto sulla testa per venire sullà parte affetta, a farvi un secondo nodo di legatore accanto del primo sulle compresse. Si fanno in appresso molti giri circolari attorno alla testa per finire il rimanente della fascia, osservando di comprimere alquanto sopra i nodi. Una fasciatura circolare ben fatta, produce il medesimo effetto.

La *Flebotomia*, è (come abbian già detto) un'operazione, per mezzo della quale si fa un'apertura a una vena, con una lancetta per trarne una sufficiente quantità di sangue necessaria per ristabilire, o per mantenere la salute.

La maggior parte degli uomini si immaginano, che non vi sia cosa più facile del fare una cavata di sangue. Siano con esso loro di accordo, che non vi sia cosa più facile, quando quelle vene, che si debbono aprire, sieno grosse, e superficiali; ma però debbono essi accordarsi con tutti coloro, che fanno professione di cavar sangue, che vi sono braccia, in cui le vene sono così piccole, e profonde, che quasi è impossibile sentirle, ed è pericolosissimo arrischiarsi ad aprirle; imperciocchè si va a rischio di aprire le arterie, di pungere i nervi, le aponeurosi, i tendini, che sono vicini alle vene; dal che ne seguono sempre pericolosissimi accidenti, come violentissimi dolori, convulsioni, infiammazioni, cancrena, emorragie copiose, aneurismi, ed anche talvolta la morte all'inferno. Di modo che non si può aver mai attenzione, che basti, nel far quest'operazione, poichè la

reputazione, e il buon credito del Chirurgo possono perdersi dalla parte della poca destrezza, come per le disgrazie, che ne verrebbero dietro alla temerità sua .

E' assolutamente necessario, che il Chirurgo sia ambidestro, cioè a dire, che cavi sangue ugualmente colla mano sinistra, che colla destra; imperocchè bisogna che faccia il salasso del braccio destro colla mano destra, e quello del braccio sinistro colla man sinistra . Fa duopo, che vi si avvezzi subito, che comincia a imparare a cavar sangue, affine di acquistare in ambedue le mani quella destrezza, che richiede l' operazione di cavar sangue; che non sia bevitore, per timore che essendo chiamato in un tempo, che ha la testa ripiena di vino, non sia obbligato di fare una di quelle cavate di sangue difficili; che abbia in oltre la mano sicura, e leggiera, il tatto delicato, la vista chiara, e penetrativa, e l' animo intrepido, e che adoperi una buona lancetta, poichè senza queste qualità, si corre rischio, o di fare il salasso bianco, cioè a dire di non aprir la vena, o ciò che è peggio, di cagionare qualche danno funesto all' infermo .

Le vene che ordinariamente si aprono sono la frontale, o la preparata, la ranina, o la ranula, la jugulare, la cefalica, la mediana, la basilica, la cubitale, la salvatella, e la safena .

Le vene si aprono in tre maniere, cioè, per lo lungo, quando i vasi son grossi; obliquamente, quando son mediocri; e per traverso, quando son piccoli, o profondi .

Non basta l' avere scelta la vena, che si vuol aprire, bisogna ancora stabilire il sito dove deve aprirsi, il quale deve essere sempre il più apparente, e al di sotto delle cicatrici de' precedenti salassi, imperocchè se si facesse il taglio al di sopra delle cicatrici, il sangue non uscirebbe così bene, perchè avendo esse ristretto il diametro della vena, non può il sangue uscire così libero come al di sotto delle cicatrici, laddove la vena ha maggiore diametro; e perciò un Chirurgo, che vuol risparmiare un braccio, a cui è solito di far de' salassi deve sempre cominciar dall' aprire la vena, il più alto che si può, poi scendendo sempre più, fa via via i tagli  
gli

gli uni sotto, e accanto agli altri, e in questo modo egli fa sempre buoni salassi.

Nel far l'apertura del vaso, si considerano due tempi; cioè, quello nel quale si insinua la lancetta nella vena, chiamato *Punzione*; e l'altro nel quale si ritira la lancetta dalla vena per aggrandirne l'apertura, nominato *Elevazione*.

L'emissione di sangue produce quattro effetti; cioè, sminuisce la sua quantità; lo distorna dal portarsi verso alcune parti in così grand'abbondanza; lo determina a circolare verso certe parti; e siccome la parte rossa del sangue più facilmente si separa, che la parte bianca, cagiona perciò l'aumentazione proporzionale di questa; il che ha fatto distinguere il salasso riguardo a' suoi effetti, in *Evacuativo*, in *Revulsivo*, in *Derivativo*, ed in *Spoliativo*.

IL SALASSO EVACUATIVO è quello, ove ci proponiamo di sminuire il volume del sangue, per via della quantità, che n' esce dall' apertura di un vaso. Questa specie di salasso rilassa tutte le parti, rende a' solidi il loro tuono, e la loro forza elastica, e fa per conseguenza, che i liquori siano più triturati, e più divisi per mezzo della contrazione delle arterie; che il sangue circoli più agevolmente sino ne' piccoli vasi; e che le secrezioni siano più libere, e più abbondanti; il sangue per questo mezzo si purifica; si tolgono gl' imbarazzi, e i rimedj agiscono più efficacemente.

IL SALASSO REVULSIVO è quello, per mezzo del quale si impedisce il sangue di portarsi con tanta abbondanza verso alcune parti; ma per produrre un tal' effetto, bisogna aprire la vena, che corrisponde all' arteria più lontana della parte inferma; per tal mezzo si determina una più gran quantità di sangue a portarsi verso le parti più remote dalla parte malata; e si sminuisce tanto più la quantità di quello, che cola nella parte malata, che riceve il sangue de' vasi opposti a quello, ove si cava sangue.

IL SALASSO DERIVATIVO è quello, pel quale determiniamo il sangue a portarsi con maggiore abbondanza verso qualche parte. Per produrre questo effetto è necessario aprire la vena nel luogo medesimo, ove si vuole aumentare la quantità del sangue; imperocchè il san-

gue

gne trovando una minor resistenza nel luogo dell' apertura della vena , che nelle altre parti , si determina a portarvisi in più grande abbondanza .

Il SALASSO SPOLIATIVO è quello , per mezzo del quale ci proponiamo di sminuire la quantità proporzionata della parte rossa del sangue . I salassi frequenti producono quest' effetto, perchè [ come abbiám già detto ] la parte bianca del sangue si separa molto più prontamente , che la parte rossa . Lo producono più presto ne' vasi grossi , che ne' piccoli , perchè i vasi grossi contengono a proporzione più parte rossa , che i piccoli .

### *Della Cavata di Sangue della Fronte .*

Per fare questo salasso , si ferrerà il collo del malato , con una salvietta , o con un fazzoletto , per comprimere la vena jugulare , e perciò rendere i suoi rami più visibili . Quando la vena sarà aperta , si farà tenere al malato inchinato il capo , acciocchè il sangue non gli cada negli occhj , o nella bocca . Quando si stimerà essere abbastanza uscito il sangue , si comprimerà l' incisione colle dita , quando [ come spesso accade ] non cessi di scorrere da se , e dopo ripulita la fronte , e la faccia dell' infermo , vi si metterà sopra il taglio una compressa , e indi la fasciatura unitiva .

### *Della Cavata di Sangue delle Ranule .*

Per fare questo salasso , si pone intorno al collo la legatura per fare gonfiare le vene ranule , si solleva in appresso la lingua col pollice , e l' indice della man sinistra , osservando di guarnire le dette dita di panno lino , affine che la lingua non isdruciolì dalle dita , e colla man destra si prende la lancetta dalla bocca dove si era posta , e si aprono l' una dopo l' altra queste due vene , poichè una non darebbe sangue abbastanza per sollevare l' infermo . Il sangue si suol fermare quando è tolta via la legatura ; ma posto che l' emorragia segua , l' infermo terrà in bocca un poco di aceto , o se  
que-

questo non basta , si applicherà sull' incisione un poco di vitriuolo , o di alume , o un piomacciuolo tuffato in qualche acqua stitica . Di rado avviene tuttavia , che l' emorragia sia violenta ; ma se il salasso non è copioso , non ha quasi effetto veruno ne' mali di gola .

Alcuni Autori stimano il salasso delle ranule grandemente salubre nella squinanzia , e infiammazione della gola , massimamente quando l' avrà preceduto quello del piede , del braccio , o del collo , perchè in tal guisa si evacua appoco appoco il sangue denso , e ristagnato .

### *Della Cavata di Sangue della Jugulare .*

Per fare questo salasso , si mette una legatura più serrata che nell' ordinario alla parte inferiore del collo , e si fa chiudere dall' infermo medesimo , o da un assistente fino a tanto , che le vene si tieno gonfiate abbastanza ; ovvero si porrà una fascia intorno al collo , che l' infermo , o l' assistente tirerà in giù verso lo sterno . In questo modo venendo le vene jugulari ad essere compresse da ogni lato , maggiormente si gonfieranno , senza togliere al malato il respiro . Si dovrà poscia eleggere quella , che più apparisce , quando è attaccato il capo , o la gola ; ma quando la malattia è da una parte sola del capo , o in uno degli occhi ; in tal caso sarà meglio aprire quella della parte offesa . Dopo di aver cavato una quantità sufficiente di sangue , si leva via la legatura , e si comprime il taglio colle dita , e vi si applica sopra una compressa , e la fasciatura chiamata il *Retentivo del Collo* .

Lungo tempo è , che nella squinanzia si usa il salasso delle vene jugulari , nelle infiammazioni del cervello , nella mania , nella malinconia , nelle infiammazioni degli occhi , nell' apoplezia , ne' dolori di capo , nel letargo ec. e molti Autori moderni l' hanno raccomandato come attissimo a prevenire l' affluenza violenta del sangue , e l' ammassamento , e ristagno degli umori nella parte offesa . Oltre di che questa cavata di sangue non è in se pericolosa , perchè queste vene si stendono da ambidue i lati  
del

del collo fixo alle tonsille , e non sono coperte , che dagl' integumenti , onde sono molto grosse , e visibili .

### *Della cavata di Sangue del Braccio .*

Per fare questo salasso , molte circostanze debbonfi osservare , cioè , avanti l' operazione , nel tempo che si fa , e dopo fatta , le quali circostanze si offerveranno in tutte le altre specie di salassi .

Avanti di cavar sangue dal braccio , è necessario preparare l' apparecchio , consistente in una fascia larga un buon pollice , o due dita traverse , e lunga due braccia e mezzo , o tre braccia , e una piccola compressa quadrata a più doppi , per comprimere la vena . Si prende in appresso il braccio del malato , e si fa la scelta del vaso , che si vuole aprire , osservando con molta attenzione il luogo dove è passata l' arteria , se è la vena basilica ; o il tendine del muscolo bicipite , o la sua aponeurosi , s' è la vena mediana , per iscanfarle nel far l' incisione della vena , imperocchè succede qualche volta , che questa vena trovasi posata direttamente sul detto tendine , il quale in alcuni soggetti fa uno sporto ; per iscanfarlo bisogna in tal caso far mettere il braccio del malato in pronazione , e allora questo tendine , che è attaccato dietro la piccola apofisi del raggio , si nasconde per così dire , e si affonda .

Si farà in appresso la legatura un pollice distante al di sopra del luogo dove si deve aprir la vena ; dopo di ciò si prende la lancetta , ed avendola aperta , si mette in bocca , osservando , che la sua punta sia voltata dalla parte del braccio , ove si vuole cavar sangue ; si fa indi serrare la mano al malato , il che contribuisce molto a far gonfiar la vena ; si pone il pollice d' una mano sulla vena , che si vuole aprire , e col medio , e coll' indice dell' altra mano si fanno delle fregagioni di giù in su lungo il cubito , e sul tragitto del vaso , per farlo maggiormente gonfiare ; gonfiata che è la vena , si tiene assicurata col pollice abbracciando coll' altre dita il braccio del malato , e coll' altra mano si prende la lancetta tenendola coll' indice , e col pollice alquanto piegati ; posando poi l' estremità dell' altre dita sul braccio del

ma-

malato, si insinua dolcemente la lancetta, più, o meno perpendicolarmente sino nel vaso, di cui se ne aggrandisce l'apertura nel ritirar la lancetta.

Dopo aver cavato una quantità sufficiente di sangue, si leva la legatura, si fa piegare alquanto il cubito del malato, si avvicinano le labbra dell' incisione, tirando un poco gl' integumenti col dito; si puliscono i luoghi del braccio, dove vi sia del sangue; si pone indi la piccola compressa sull' incisione, e si applica la fasciatura atta per questo salasso, per mantenere riaccostate le labbra dell' incisione, facendo tenere il braccio piegato al malato.

Avanti di procedere alla cavata di sangue è necessario di tener preparato un bicchiere di acqua, e altre acque di odori per servirsene in caso, che il malato si svenisse.

### *Della cavata del sangue dalla Mano.*

Questa cavata di sangue si pratica alle due vene della mano, una delle quali è la salvatella, e l' altra è un ramo della vena basilica. La prima si stende lungo la parte esterna del dorso della mano verso il dito mignolo, e qualche volta nella sinistra è chiamata *Splenica*; perchè molti antichi Medici stimarono, che l' aprir questa vena fosse cosa salutare nelle malattie della milza. Il ramo della cefalica è situato fra l' indice, ed il pollice; così chiamata dagli antichi Medici, credendo, che l' aprirla fosse rimedio efficace alle malattie della testa.

Quantunque sia cosa evidente, che il salasso della mano è più difficile di quello del braccio, e che tutte queste diverse opinioni degli Antichi non hanno fondamento veruno, tuttavia producendo esso lo stesso effetto, che quello del braccio, possono succedere de' casi, ne quali si debba adoperarlo, massimamente se l' infermo gli averà fede, o se le vene di quella parte siano più apparenti di quella del braccio.

Per fare più agevolmente questo salasso, dee l' infermo fregare, e immergere la sua mano nell' acqua calda, acciocchè le vene si gonfino, e diventino più vi-

visibili. Si puone in appresso la legatura immediatamente al sito del corpo per mantenere il gonfiamento delle vene; si rasciugli poscia la mano, e poi si apra il vaso nel luogo più apparente, tenendolo assicurato col pollice, come abbiamo detto di sopra. Se il sangue non esce in ispiello ripieno, si metta di nuovo la mano nell' acqua calda, e quivi si lasci fino a tanto, che si sia cavata una bastevole quantità di sangue. Si rasciugli in appresso la mano, si preme l' apertura colle dita, si ponga una piccola compressa sopra l' incisione, e per di sopra la fasciatura, chiamata il *Revesciato per detto salasso*.

### *Della cavata di sangue dal Piede:*

Per poter fare questo salasso più facilmente, si devono far mettere i due piedi dell' infermo nell' acqua calda, fin tanto che le vene sieno bastantemente gonfiare, e scegliere delle due la vena, che più apparisce. Si ponga in appresso la legatura due dita traversè sopra i malleoli, e si rimetta il piede nell' acqua calda per accrescere il gonfiamento della vena. Posso poscia il Chirurgo un ginocchio in terra, ed il piede dell' infermo sopra il suo ginocchio dritto se è il piede sinistro, o sul sinistro se è il piede dritto, il qual ginocchio sarà posato sull' orlo del vaso, che contiene l' acqua, l' asciughi con una fucietta, che egli terrà addosso, e prendendolo colla man sinistra se è il piede dritto, o colla man destra se è il piede sinistro; si assicuri della vena, come si è detto di quella del braccio. Se le vene non fossero visibili abbastanza al luogo de' malleoli, si aprano quelle, che sono disotto, o nella parte media della gamba, ed in tal caso si farà la legatura due dita traversè di sopra al sito, dove si vuol fare il taglio, per rendere più visibili le vene; indi si apra il vaso nella maniera che abbiamo detto di sopra. Si riceva il sangue in tazze, e se non ispiella in arco, si metta di nuovo il piede nell' acqua calda; il che farà, che il sangue uscirà agevolmente, e che il taglio non si fermerà, il che qualche volta accade. Quando sarà uscita una sufficiente quantità di sangue, il che si conoscerà dal tempo; in cui esce, dalla tardanza, o velocità dell' uscita, dalla rossez-

za dell' acqua , e soprattutto dalle forze dell' inferno , si cavi la legatura mentre che il piede è ancora nell' acqua , poi si levi il piede dall' acqua , si asciughi , e si mettano la compressa sul taglio , e la fasciatura , chiamata *lo Staffa* .

Non basta avere una perfetta cognizione dell' operazione della Flebotomia ; bisogna ancora essere istruito di tutti gli accidenti , che possono seguirla , sia per prevenirgli , o per rimediarci quando sono seguiti . Questi accidenti sono il *Trombus* , l' *Ecchिमoma* , il tumore linfarico , la puntura dell' aponeurosi del muscolo bicipite , quella del suo tendine , dell' arteria ; del periostio , a quali si può aggiungere la sincope , o mancanza , che sopravviene qualche volta al malato , e ciò che chiamasi *salasso bianco* .

Tutti questi accidenti si distinguono riguardo al loro grado , in *leggieri* , in *mediocri* , ed in *gravi* .

Il *Trombus* è un tumore formato da un sangue sparso , e grumoso negl' integumenti in conseguenza di una emissione di sangue .

Quando l' apertura fatta alla vena non è parallela con quella della pelle , o che si presenti all' incisione un pezzetto di grasso , o sia che la vena è forata da banda a banda ; allora una porzione del sangue non potendo uscire facilmente , si insinua nel corpo cellulare della pelle , e cagiona questo tumore . Per impedire che il *Trombus* non aumenti , non bisogna levare , che appoco appoco il pollice , col quale si tiene assicurata la vena , e non allentare la legatura . Quando , malgrado queste precauzioni , non si può cavare una quantità sufficiente di sangue , o che il tumore cresca ; in questo caso , si fa un' altra incisione nella medesima vena al di sotto del tumore , o si apre un' altro vaso .

Si procura la risoluzione del sangue sparso , applicando sopra il tumore una compressa inzuppata nell' acqua comune , e in appresso in qualche acqua spiritosa . Si può mettere ancora nella doppiatura della detta compressa un poco di sal comune , per facilitarne la risoluzione .

L' *ECCHIMOMA* è una contusione leggiera , o superficiale , che non offende altro , che la pelle , o il suo corpo cellulare . Si può definire un tumore superficiale , molle , rosso , livido , o giallognolo , con poco dolore ,

e infiammazione, prodotto da uno scolo di sangue ne' vasi linfatici della pelle, o del grasso, o da un piccolo spandimento di sangue negl' integumenti .

Le freghe reiterate sopra il braccio d' una persona grassa, la pelle della quale è delicata; la legatura lasciata troppo lungo tempo serrata, l' estensione del braccio avanti la perfetta riunione del vaso; una piega fatta dalla compressa, o dalla fascia; la puntura del vaso da banda a banda; finalmente il *Trombus*, sono le cause ordinarie dell' *Ecchymoma* .

Per rimediare a quest' accidente si frega la parte con qualche liquore spiritoso, come acquavite, quella di lavendola, o spigo, acqua vulneraria ec., e si applica sopra una compressa inzuppata in questi medesimi liquori .

Il **TUMORE LINFATICO**, che sopravviene nel luogo della puntura dopo il salasso, è formato da una linfa sparsa da' vasi linfatici, che sono stati aperti nel cavar sangue. Questo tumore non canzia il colore della pelle; egli è senza dolore, e spesso volte rilucente .

Per guarire questo tumore, vi si applica sopra una compressa a più doppi, inzuppata in qualche acqua spiritosa, osservando di serrare un poco la fasciatura. Se questo rimedio non è sufficiente, si fa sul tumore una piccola apertura col lancerrone per dar esito alla linfa sparsa, e si fa in appresso sul luogo aperto una leggiera compressione .

La **PUNTURA dell' APONEUROSIS del MUSCOLO BICIPITE** è qualche volta seguita da accidenti. Il dolore, che si fa sentire nell' istante del salasso al di sopra, o al di sotto dell' incisione, e la resistenza, che il Chirurgo sente alla punta della lancetta, che trovasi qualche volta spuntata, sono i segni, che fanno conoscere, o almeno dubitare della puntura di questa aponeurosi .

Gli accidenti, che seguono ordinariamente questa puntura sono un dolor vivo al braccio, e al cubito, un gonfiamento, una tensione, una infiammazione, e finalmente un ascesso di sopra, o di sotto l' aponeurosi .

I rimedj che si impiegano per prevenire, o per calmare questi accidenti, sono il salasso reiterato secondo il bisogno, una esatta regola nel vivere, i dilavanti, i cataplasmi anodini, ed emollienti; e i risolutivi, quando è pas-

passato il dolore . Se il deposito d' umori , in vece di risolversi , si termina per suppurazione , se ne farà l' apertura , osservando le regole , che abbiám prescritte nel Capitolo vi. della Patologia parlando delle Posteme in generale , e si medica la piaga , che ne risulta , secondo le regole dell' arte .

Nel penetrare troppo avanti nel braccio colla lancetta , o il malato nel muoverlo nell' atto del salasso , si può nell' aprire la mediana pungere il tendine del muscolo bicipite , che trovasi ordinariamente situato sotto . Il dolore vivo , che si fa sentire al momento della puntura per tutto il braccio sino all' acromion , e la resistenza , che il Chirurgo sente alla punta della lancetta , fanno conoscere la puntura di questo tendine .

Gli accidenti che l' accompagnano ordinariamente sono il dolore , il gonfiamento , la tensione , l' infiammazione di tutto il braccio , la febbre , il moto convulsivo , gli ascessi , e qualche volta la putrefazione . Per rimediare a tutti questi accidenti , si fanno al malato de' frequenti salassi , se gli fa osservare una esattissima regola di vivere , si somministrano interiormente , ed esteriormente de' rimedj capaci di calmare il dolore , e la violenza degli altri accidenti ; si cuopre la parte infera con un cataplasma anodino , o emolliente . Se questi mezzi sono insufficienti bisogna scuoprire il tendine , e mettervi sopra un piummacciuolo inzuppato nello spirito di trementina ; ed è anche necessario qualche volta di tagliare per traverso il tendine , per salvare al malato il suo braccio .

La situazione delle arterie , riguardo alle vene esteriori del braccio non essendo uguale in tutti i soggetti , è di una grandissima importanza di riconoscere dalla pulsazione l' arteria vicina alla vena per evitar di aprirla nel fare un' emissione di sangue , o aprendo la vena in un luogo lontano dall' arteria , o introducendo la lancetta nella vena con molta precauzione . Ma succede talvolta , che malgrado tutte queste attenzioni , il Chirurgo nell' aprire la vena basilica , ha la disgrazia di pungere l' arteria , che è situata sotto di essa . La lancetta può avere divisa solamente qualcuna delle tuniche dell' arteria , o averle aperte tutte ; nel primo caso , l' accidente non si scorge , che qualche tempo dopo , e mai nel momento della cavata di sangue . Il sangue trovando nel luogo

K ;

del-

della divisione di alcune tuniche dell' arteria minor resistenza che altrove, dilata, e distende appoco appoco nel luogo della divisione le tuniche, che sono ancora intiere e si forma in quel luogo un tumore aneurismale per dilatazione .

Questo tumore è nel principio molto piccolo , non cangia il color della pelle , e vi si sente un moto di pulsazione simile a quello dell' arteria . Si può guarire quest' aneurisma facendo una compressione esatta , e continua nel luogo del tumore, dopo aver fatto rientrare il sangue che lo fermava .

Quando tutte le tuniche dell' arteria sono state divise , si vede l' accidente subito , perchè il sangue dell' arteria esce con impeto , e per così dire per salto , seguendo il moto della pulsazione , il suo colore è molto più rosso , e più vermiglio , che il sangue della vena ; si coagula prontamente , una compressione fatta sopra l' arteria brachiale ne ferma il corso , dove che una compressione fatta sopra il cubito non gl' impedisce di uscire .

Quando si riconosce , che il sangue viene da una arteria , conviene senza spaventarsi , osservare se l' apertura dell' arteria corrisponde esattamente a quella degl' integumenti , il che si riconosce quando il sangue esce a pieno spillo e zampillando , senza formar tumore alcuno intorno all' apertura ; quando ciò sia , si lascia uscire il sangue , finchè il malato si svenga , per aver la libertà di applicare un apparecchio convenevole nella maniera che diremo in appresso . Se poi al contrario l' incisione degl' integumenti non corrisponde a quella dell' arteria il che si riconosce dal sangue , che nell' uscire urta nella pelle , e si spande intorno all' apertura , aumentandosene il tumore a misura , che il sangue sgorga ; in tal caso si farebbe un grave fallo , lasciando uscire il sangue finchè il malato venisse a svenirsi , perchè prima che ciò succedesse vi sarebbe uno spargimento di sangue sì considerabile sotto gl' integumenti , che ci obbligherebbe a venire all' operazione dell' aneurisma , imperocchè quel sangue stravasato impedirebbe alla fasciatura il comprimere sull' arteria . Subito dunque , che si riconosce l' apertura degl' integumenti non esser parallela a quella dell' arteria ; l' unico rimedio è di fermare immediatamente il sangue

gue per mezzo del torcolare, e applicarvi in appresso l'apparecchio seguente.

Si comincia ad applicare sul tumore, prima di levar via il torcolare, o sul taglio, se si sia lasciato svenire il malato, un pezzettino di carta sugante masticata, e bene spremuta, e sopra a quello una piccola compressa della larghezza dell' unghia, e su questa varie compresse via via più grandi, finchè si conosca la loro altezza essere molto maggiore del livello del braccio, affinchè la fasciatura non venga a pigiare altro, che l'apertura dell'arteria. Si fa piegare alquanto il cubito, affinchè restandosempre in questa situazione, la fasciatura non si smuova.

Questa fasciatura è la stessa, che si adopra nel cavar sangue, se non che ella è molto più lunga; si mette lungo il tragitto de' vasi una compressa a più doppi, per rallentare la circolazione del sangue in quella parte sostenendola con una fascia, osservando di serrarla più fortemente verso l'incisione dell'arteria, che negli altri luoghi. Si fa tenere il braccio al collo, e si avverte il malato a non ismuoverlo in conto alcuno. Si lascia così per tre, o quattro giorni l'apparecchio, se pure qualche accidente, non obblighi a levarlo.

Tre, o quattro giorni dopo si disfa l'apparecchio, e se si vede, che il pezzettino di carta masticata sia ancora attaccato all'incisione, non bisogna toccarlo, anzi si torna a rimettere l'apparecchio, e si aspetta a levarlo in capo a due, o tre altri giorni. Se la carne viene a cader da se, egli è un buon segno; ed allora quando si vede colare dall'apertura qualche poco di marcia, vi si mette un liquore balsamico, e spiritoso, e mai niente di umido, o d'oleoso. Si raccomanda all'infermo di continuare il riposo, e farà molto bene il cavargli sangue due, o tre volte dall'altro braccio.

Quando la compressione è ben fatta, e continuata lungo tempo, ella procura ordinariamente una perfetta riunione dell'arteria; ma se è fatta male, uno se ne avvede ben presto dallo spandimento di sangue, che si insinua nel corpo cellulare della pelle; ciò che obbliga a levar l'apparecchio, e procedere all'operazione dell'aneurisma. Vedetene il dettaglio nel nostro Manuale d'

Operazioni di Chirurgia Tom. III. Cap. VI. pag. 73. e seguenti .

Nell'aprire la safena al malleolo interno; la cubitale, o la radiale verso il carpo, e l'arteria, o la vena temporale, si può pungere il perioftio nell'immergere la lancetta troppo avanti, o nel fare il malato qualche movimento. I legni che fanno conoscere quest' accidente, sono il dolore, che si fa sentire al di sopra, o al di sotto dell' incisione, e la resistenza, che si sente alla punta della lancetta, che trovasi qualche volta spuntata. Le conseguenze della lesione del perioftio sono un dolore, una tensione, e un' infiammazione, che si stende lungo l'osso, ove si trova il perioftio offeso.

Quando questi accidenti non sono considerabili, alcune compresse inzuppate in una quarta parte di acqua-vite, e tre parti d' acqua comune tepida sono sufficienti per rimediarvi.

Quando l' infiammazione è dissipata, si medicherà l' incisione della cavata di sangue con un cerotto di diachilon semplice, o gommato, per farne suppurare gli orli.

Quando gli accidenti sono violenti, si pone sopra la parte inferma un cataplasma anodino, e sulla piccola piaga un poco di suppurativo, che mantenendola aperta, eccita sempre uno stillamento di umori, ed anche una piccola suppurazione.

Quando il dolore, e l' infiammazione sono svanite, si applica un cerotto di diachilon sulla piaga, e si cicatrizza coll' unguento di litargirio, o di cerusa, o con quello di diapontolice, ec.

Può succedere ancora, che nell' aprir la safena il Chirurgo venga a pungere, insieme col perioftio, un piccolo cordone di nervo, che accompagna questa vena.

Quando il Chirurgo taglia affatto questo piccolo cordone di nervo, non ne succede al più, che un intormentimento, che non è di durata; ma se detto nervo non è stato, che leggermente intaccato, vi sopravviene allora un dolore, che si fa sentire fino alla parte superiore della gamba, ed anche qualche volta sino all' alto della coscia; spesse volte queste parti si intormentiscono, e sono ancora dolose con scuotimento, quando si toccano, e anche dopo, che è saldata la puntura.

Può

Questi accidenti non sempre così felicemente si terminano ; obbligano alcune volte a incidere , e distaccare il periostio infiammato , troppo teso , e minacciante di putrefarsi , ciò che cagionerebbe una gran dilacerazione nella parte offesa . L' incisione , che si è fatta per distaccare il periostio , scuopre l' osso , il quale si deve medicare secondo le regole dell' arte , come nelle ferite fatte nelle parti molli .

Può succedere un altro inconveniente , cioè , un' infiammazione , ed anche un piccolo ascesso nel luogo dell' incisione . Non mancano di attribuirne la colpa al Chirurgo , benchè spesso volte il malato ne sia solo la causa per la sua imprudenza , e per l' impazienza , che avrà avuto di caminar troppo presto .

Per prevenire questi accidenti , il Chirurgo avrà cura di tenere per lungo tempo il piede del malato nell' acqua calda ; di fare delle leggieri confricazioni sulla parte della gamba , e del piede , e di stringere assai la legatura , per ben fermare la vena avanti di aprirla , osservando di aprirla per lo lungo , piuttosto , che in un' altra maniera .



R A C C O L T A  
D I  
O S S E R V A Z I O N I

*Molto curiose, ed istruttive per la pratica  
della Chirurgia.*



O S S E R V A Z I O N E I.

UN uomo cadde da circa 20. pertiche di altezza, e si fece una soluzione del continuo, che arrivava dalla fronte fino all' occipitale, e la pelle gli pendeva da' lati fino sulle spalle. Il Sign. le MAIRIE Chirurgo maggiore dello Spedale Militare di *Strasburgo* gli lavò immediatamente la testa con dell' acquavite mescolata con acqua pura, perchè l' acquavite sola avrebbe troppo irritata la parte; indi vi fece dodici punti di sutura, ed il malato guarì perfettamente.

O S S E R V A Z I O N E II.

UN uomo cadde all' indietro dall' altezza di dodici piedi, non vi fu alcuna frattura, nè alcun sintoma, che dinotasse, che vi fosse del sangue extravasato fra le *Meningi*; ma cadde in un sonno letargico, e malgrado le cavate di sangue dal piede, e i vescicanti, non vi era modo di farlo rinvenire. Il Sig. le MAIRIE gli applicò un vescicante sopra la testa, e vi fece delle scarificazioni; poi gli lavò la testa con dell' acquavite, e immediatamente l' infermo alzò il capo, ponendosi a guardare con sorpresa tutti gli astanti senza proferir parola, e ricadde nel suo letargo, come prima; ma dopo qualche tempo ritornò in sé, avendo però perduto affat-

to la memoria, senza ricordarsi di essere stato malato, e senza riconoscere la sua moglie, e i figliuoli, di maniera che, per finirla, bisognò insegnargli a parlare, dicendogli ogni cosa pel suo nome.

Vi sono già molti esempi di persone guarite da ferite di testa con lesione del cervello, e perdita della sua sostanza; ma se ne trovano sì pochi nelle Opere, che i Chirurghi comunemente leggono, che crediamo far piacere al lettore di narrargliene alcuni, per incoraggiarlo ad intraprendere la guarigione di simili ferite, ed è in questa considerazione, che registreremo le seguenti osservazioni.

### OSSERVAZIONE III.

**I**L Sig. DUCAN BAINE, Chirurgo a *Pembroke* [1] racconta di un giovanetto nominato Guil. Lloyd in età di 8. anni essendosi trattenuto a strappare i crini della coda di un asino, ne ricevè un calcio un pollice in circa sopra l' orbita dell' occhio sinistro, dal quale ne rimase così sfordito, che fu creduto morto. Ebbe un getto di sangue dal naso, dagl' orecchi, e dalla bocca, e fu trasferito in questo stato a *Pembroke* distante due miglia. La ferita si stendeva fino al piccolo angolo dell' orecchio; nell' esaminarla il Sig. DUCAN BAINE trovò nell' osso una frattura di figura triangolare, lunga tre quarti di pollice, l' angolo inferiore della quale era sfondato, e alquanto distaccato dalle parti vicine. Egli fece un' incisione a traverso la ferita, per iscoprire sufficientemente l' osso, ed avendola in appresso medicata, cavò cinque oncie di sangue al malato, e gli fece dare un lavativo, che non potette ritenere. Gli fece prendere una cucchiajata di mistura antispasmodica, a cui aggiunte alcuni grani di polvere di *Guttura*. Nel corso della notte ebbe tre attacchi fieri di convulsione. La mattina dopo la frattura fu trovata nello stato quì sopra notato. Il Chirurgo applicò la vite di un trapano alla parte inferiore del pezzo di osso fratturato, e con questo mezzo, egli alzò abbastanza l' angolo

(1) *Essais de Med. de la Societé d' Edimbourg. Tom. Art. XXIX.*

golo superiore per potere portarvi sotto l' estremità di una spatola sottile senza comprimere la *Dura - Madre*, tirò poi in fuori colla vite la parte inferiore del pezzo di osso, mentre che colla spatola veniva ad alzarlo dalla parte superiore, e lo distaccò affatto, rilevandolo dall' angolo superiore. Il ragazzo portò la mano alla ferita, e quando il pezzo di osso fu separato, l' infermo gettò alcuni lamenti, che furono i primi segni di vita, che diede d' allora in poi, che aveva ricevuto il colpo. Si ripulì la ferita di tutti i piccoli corpi estranei, che potevano esservi rimasti; si mise sulla *Dura - Madre* un pezzetto tondo di panno lino imbevuto nello spirito di vino, mescolato col mel rosato, e per di sopra delle compresse, sostenute con una fasciatura convenevole.

Dopo mezzo giorno gli fece dare un secondo cri-  
stero, che ritenne, e che qualche tempo dopo lo fece andare copiosamente per secesso. La notte seguente, ebbe un' attacco di convulsione; il giorno dopo l' infermo parlò con facilità, e a proposito; fu medicato esattamente ogni giorno, e molte volte uscì dalla ferita una piena cucchiajata da caffè della sostanza del cervello; contuttociò il ragazzo guarì perfettamente in capo a due mesi, e mezzo.

#### OSSE R V A Z I O N E IV.

**I**L Sig. LAMBERT celebre Chirurgo di *Marsiglia* (1) racconta di un Lacchè in età di 15. in 16. anni, che ricevè una sassata nel mezzo al parietale destro, il cervello restò offeso, e l' infermo diede in convulsione dalla parte della percossa, e cadde in paralisi dal lato opposto. Questi accidenti furono accompagnati da febbre, da delirio, e da una diarrea considerabile. La sostanza del cervello diventò nera, vi fu applicato un medicamento composto di due parti di spirito di vino, e una di mel rosato; il cervello gonfiò, e la di lui consistenza era più floscia del solito, il che obbligò il Chirurgo a tagliare ogni giorno una porzione della sostanza del cervello putrefatta.

II

(1) *Comm. sur la Carie, chap. v. pag. 296.*

Il diciottesimo giorno il malato cadde dal letto, e tutta la sostanza del cervello, che sboccava fuori per l'apertura dell'osso, si staccò per questa caduta; e restò nell'apparecchio; ma l'effusione continuò a mandar fuori la sostanza del cervello, che era nera, e che si andava via via tagliando ogni giotto.

Il 35. giorno bevve, e si ubbriacò, allora la sostanza del cervello maggiormente gonfiandosi uscì considerabilmente fuori, e il paziente ubbriaco mise la mano sotto l'apparecchio, e tirò via tutta la porzione di quella sostanza, strappandola con violenza. Il giorno dopo fu trovato il cervello in migliore stato; quasi tutto quel, che vi era di corrotto era stato portato via, e si scopersse esser vicino il *Corpo calloso*. In vece del livido successe un color vermiglio, tutta la corruzione restò superata, e l'infermo guarì. Gli restò nulladimeno la paralisi, e divenne anche soggetto a moti epilettici; ma lo spirito si ristabilì interamente.

Si può dunque in conformità di quest'infermo soddisfare interamente alle indicazioni, che naturalmente si presentano in simil caso. Il Chirurgo timido, che non osava tagliare di quella sostanza corrotta, se non quanto se ne presentava ogni giorno fuori del cranio, si adoperava invano, poichè la parte morta, e corrotta, che vi restava, faceva ogni dì nuovi progressi, e contribuiva molto ad accelerare l'avanzamento della putrefazione. Quindi vi è molta apparenza, che l'infermo sarebbe morto, se da per se portato via non avesse la cagione di un tal progresso, strappando tutta quella porzion di cervello, che avea dato in corruzione.

#### OSSE R VA Z I O N E V.

**I**L Sig. PALFIN (1) racconta di un cert' uomo dimorante a Parigi nel borgo di S. Vittore, che avendo ricevuto un colpo di pistola carica di molte piccole palle, ed in poca distanza, nella parte anteriore del collo sotto le cartilagini, che compongono la *Laringe*; le palle nello slargarsi, gli rasarono la pelle sotto il mento in  
molto.

(1) *Anatomie Chirurgicale*.

molti luoghi ; ma una , o due di queste avendo trapassato la *Trachea* , ne stritolarono i primi anelli , e vi fecero una ferita anteriormente con perdita di sostanza , e capace di ricevere la punta del dito , nè si potè riconoscere per dove potessero essere uscite le palte .

Dopo la ferita sopravvenne all' infermo uno spurgo di sangue , e un *Emfisema* considerabilissimo , che si stendeva , non solo sotto gl' integumenti del collo , ma su quelli ancora della testa , delle braccia , del petto , e fin sotto quelli del basso ventre ; talmente che sembrava un mostro , gonfiato come un pallone . L' *Emfisema* veniva prodotto dal non essere il taglio della *Trachea* parallelo alla ferita della pelle , e della carne ; di maniera che nell' uscir continuamente l' aria dalla *Trachea* , tanto nell' ispirazione , che nell' espirazione , e trovando un ostacolo nella pelle , si insinuava nelle cellette adipose , e cagionava quest' accidente . Per ripararlo , il Sig. ARNAUD famoso Chirurgo di Parigi , dilatò la ferita degl' integumenti , e lasciò allo scoperto l' apertura della *Trachea* , per dare un esito libero all' aria , o sivero , per poter agevolmente rinchiuderla per mezzo di un pezzetto di carta masticata , e dell' applicazione di un convenevole apparecchio , tanto che non potesse entrarvi l' aria esterna , ne uscirne . In quanto poi all' *Emfisema* formato in tutta l' estensione degl' integumenti sopradetti , parte si dissipò per li pori della pelle , e parte rientrò ne' vasi per mezzo di fomite carminative , e risolutive . Il ferito guarì dopo qualche tempo perfettamente , che sarebbe forse restato soffogato dall' enfisagione senza il pronto soccorso della Chirurgia . Il Sig. Du CHESNE Chirurgo di Parigi , che era stato presente alla cura di questo ferito , somministrò quest' osservazione al Sig. PALFIN nel tempo che fu a Parigi l' Anno 1694 .

#### OSSERVAZIONE VI.

IL Sig. LE MAIRE racconta di un soldato de' dragoni , che ricevè una sciabolata sul naso , che glielo tagliò dalla radice fino alla commessura delle labbra . Quando lo medicò per la prima volta eran già otto giorni , che avea ricevuto il colpo ; onde gli convenne rinnovar l' emorragia col tagliar alquanto degli orli della ferita ,  
il

il che bisogna sempre praticare in simil caso , per procurarne la riunione . Indi fece de' punti di futura , vi applicò quella specie di fasciatura , che chiamasi lo *Sparviere* , e lo guarì perfettamente. Ved. il Trattato delle Fasciature .

## OSSE R V A Z I O N E VII.

**I**L Sig. DIONIS (1) racconta, che la moglie di un No-  
rajo di *Parigi*, ingelosita della moglie di un macel-  
lajo, che credeva amica del suo marito, andò una mat-  
tina a trovarla alla macelleria, e dopo fattile i rimpro-  
veri, che le ispiravano i suoi sospetti, diè di mano a  
un coltello della bottega, e le dette un colpo sul naso,  
che glielo staccò quasi affatto; pendeva in giù, e non  
si atteneva, se non a un' ala, e qualche poco alla sua  
colonna, l' altra ala essendo tagliata affatto.

Le fu immediatamente ricucito, e si riattaccò, non  
essendovi rimasta, che pochissima deformità. Si riporta  
questa osservazione per incoraggiare i giovani Chirurghi a  
far l' stesso in casi simili.

Si leggono in alcuni Autori (2) degli esempi, che  
provano, che un naso staccato affatto dal viso, può riun-  
nirsi. Questo però sembra difficile a crederci; pare ben-  
sì più naturale, che il naso, essendovi stata tagliata la  
punta, possa riunirsi al braccio, in cui si sia fatta un'  
incisione, e che indi, tagliando dal braccio quel che è  
necessario, corregga in qualche parte la deformità di tal  
mancanza nel naso.

TAGLIACOZIO famoso Chirurgo di *Bologna* ha fatto  
un Trattato verso la fine del secolo sedicesimo, per giu-  
stificare una tal pratica, di cui è egli il restauratore,  
e FABRIZIO ILDANO racconta un esempio del buon suc-  
cesso di simile operazione.

TAGLIACOZIO aveva imparata questa operazione da  
alcuno della famiglia de' *Bojani*, gente data alla medi-  
cina di padre in figliuolo; ed egli è stato il primo fra'  
Mo-

(1) *Cours d' Oper. de Chir. pag. 588.*

(2) *Traité d' Oper. de Chirug. del Sig. de Garengeot, Tom.  
111. pag. 55.*

Moderni, che abbiano scritto, o per dir meglio, assolutamente il primo; posciachè il metodo da' *Bojani* tenuto, e da lui rettificato più non rassomiglia a quello degli Antichi.

Non possiamo impedirci di dire, che il togliimento totale del naso non farebbe di una considerazione sì grande, anche per riguardo alla deformità, che cagiona una tal perdita, se fossimo ben sicuri di ciò che ha esposto TAGLIACIOZIO in una lettera, che egli scrisse al MERCURIALE Professore in *Padova* sulla restaurazione del naso, e di quel che dice nel suo Trattato concernente questa particolare Chirurgia. Imperocchè quest' Autore, dopo avere spiegato la maniera, colla quale egli innestava un nuovo naso su' vestigi di quello, che era stato tagliato, dice, che questa *Prosthesis* gli riusciva sì felicemente, che l' arte in ciò facea vergogna alla natura, essendo impossibile di distinguere un naso rifatto col suo metodo, da un altro formato dalla natura medesima; e prende per testimonj di ciò, che sosteneva, tutti quelli, che avevano veduto quattro operazioni fatte da lui, nel corso del medesimo anno, su quattro soggetti differenti, de' quali tre erano Italiani della città di *Piacenza*, e l' altro era un gentiluomo Fiammingo della città di *Anversa*.

Egli risponde in seguito ad una obiezione, che i Medici, e i Chirurghi del suo tempo facevano contro questa Chirurgia, allegando, che una tal operazione non potea farsi senza mettere i malati a una lunga, e fastidiosa tortura, per lo spazio di 40. giorni, il che pochissimi erano capaci di sopportare; oltre che quest' operazione era difficilissima pel Chirurgo.

Ora l' Autore pretende al contrario, che essi si ingannano, e che la situazione, in cui bisognava, che i malati restassero per facilitare il successo di quest' operazione, era molto sopportabile, e che vi sono molte altre operazioni nella Chirurgia che si fanno, le quali sono più difficili di questa.

Ma come è assai naturale il credere, che un nuovo naso così rifatto richiegga più di riguardo, che un altro, per timore di non esporli a distruggere la sua aderenza negli sforzi cagionati a quest' organo nel soffiarsi il naso; MUSITANO risponde, che un naso così rianuo-

vato contrae delle aderenze sì stabili, e sode dopo un certo tempo, che bisognerebbe tanta violenza per istrapparlo, quanto se fosse un naso formato dalla natura.

Quell' Autore, per prova di ciò, racconta la storia assai piacevole di un gentiluomo Italiano, a cui fu rifatto un nuovo naso dalla sua propria carne, in luogo di quello, che gli era stato portato via per accidente: dicendo, che questo gentiluomo dopo la sua guarigione, avendo sempre paura nel soffiarsi il naso di strapparselo, in vece di soffiare con forza, come suol farsi ordinariamente, si contentava di insinuare nelle sue narici il lembo della sua pezzola voltato a guisa di tasta, per nettare: il che veggendo il Chirurgo che l'avea curato, gli domandò, chi l'obbligava a pulirsi così il naso; ed il malato avendogli fatto intendere il timore, che avea di strappare il suo nuovo naso nel soffiarselo con isforzo, questo Chirurgo lo prese pel naso, e lo strascinò in quella maniera per tutta intorno la sua camera, per convincerlo, che il suo naso avea delle aderenze molto più stabili di quel, che si credeva.

Del resto, senza voler trattare di pura favola tutti i fatti rapportati da TAGLIACOZIO, che era nel suo tempo il più famoso Chirurgo d' *Italia*, dopo FARRICIO d' ACQUAPENDENTE, al sentimento di un Autore contemporaneo; questi stessi fatti essendo altronde certificati da gran personaggi, a' quali dobbiamo tutta la nostra credenza, restano ancora sopra di ciò molte difficoltà, che non sono facili a togliersi; cioè, perchè mai un' operazione così utile, e in cui entra ancora del maraviglioso, non ha continuato a praticarsi? Perchè mai fra un sì gran numero di eccellenti Professori, che fioriscono in *Euroa*, sì pochi ve ne sono, che l'abbiano messa in uso? Perchè non veggiamo, che da altri sia stata praticata questa ristaurazione del naso, fuorchè da BRANCA SICILIANO Chirurgo di *Catania*, da BALDASSAR PAVONIO suo discepolo, da ARANZIO, e da TAGLIACOZIO, tutti due Chirurghi di *Bologna*?

Come mai ha potuto darsi, che non sia stata tentata in questo secolo, in cui la Chirurgia è stata sollevata al più alto grado di perfezione? Specialmente nel furore di quest' ultime guerre, che hanno dato luogo ad un gran numero di mutilazioni, per le quali questa ope-

ope-

operazione sarebbe stata di un grand' ajuto, quando sia vero, che possa riuscire così felicemente, come gli Autori sopraccitati ce l' assicurano, e come lo prova la seguente osservazione.

## O S S E R V A Z I O N E V I I I.

**G**IO. BATTISTA HELMONT (1) racconta, che un certo uomo della città di *Brusselles* avendo ricevuto in battaglia un colpo nel naso, che glielo tagliò affatto, andò a trovar TAGLIACOZIO, che era allora Chirurgo a *Bologna*, perchè gli rifacesse un naso; ma non volendo sottoporsi all' incisione, che sarebbe convenuto fargli al braccio, accordò con del danaro un facchino, perchè si lasciasse staccare dal suo braccio quanta sostanza bisognava per rifargli il naso, il che riuscì perfettamente; ma la cosa sorprendente, e straordinaria è, che tredici mesi in circa dopo il ritorno di quel tale a *Brusselles*, quel nuovo naso, che gli era stato innestato su gli avanzi di quello che avea perduto, si agghiacciò tutto in un tratto, e qualche giorno dopo diede in corruzione. Essendo stata ricercata curiosamente la causa di un sì subito cangiamento; si trovò, che il facchino, che avea somministrata la materia per quell' organo, era morto nel medesimo istante, che il naso si era agghiacciato. Lascio al lettore il far le sue riflessioni, e investigar le cagioni di un fenomeno sì straordinario.

Del resto non bisogna immaginarsi, che i Chirurghi qui sopraccitati siano stati gl' inventori di questa Chirurgia, poichè CORNELIO CELSO ne ha parlato nel suo libro VII. Cap. IX., e ne ha fatto conoscere i vantaggi, e gl' inconvenienti: non era nè anche incognita a GUIDO da GAULIACO; poichè nell' articolo delle ferite, tratta di ciarloni ridicoli quelli, che contavano allora sulla possibilità del successo di questa restaurazione; ed il famoso AMBROGIO PAREO, uno de' più celebri Chirurghi del suo secolo, dice essere stato testimonia della riuscita di questa maravigliosa operazione, nella persona di un gentiluomo Cadetto della casa di *Saint-*

L. 2

Thoir.

(1) *Trattato della guarigione magnetica delle ferite.*

*Tebian*, il quale essendo annojato di pottare un naso d' argento , che lo esponeva alla burla de' suoi coetanei , si determinò a fare un viaggio in *Italia* , per porli tra le mani di un famoso Chirurgo , che rifaceva de' nasi di carne ; il che eseguì , e ritornò effettivamente d' *Italia* con un naso di carne , il che fu ammirato da tutti . L' operazione del TAGLIACOZIO è cotanto ardita , e sì poco credibile , che fu necessario , che il Sig. RENEAUME citasse illustri personaggi , come FICINO , e FABRIZIO ILDANO , che erano stati testimoni del suo buon esito . Certi altri , come ALESSANDRO de BENEDICTIS , VESALIO , SCHENKIO , PAREO , FALLOPPIO , GIO. BATTISTA CORTESIO , ne scrissero ammettendola per vera : specialmente il GORMELINO Dottor di Medicina della Facoltà di *Pargi* , cita una lettera , in cui CALENZIO invita il suo amico OPPIANO a venire a vedere i miracoli di un Siciliano nominato BRANCA ; il quale rifaceva i nasi perduti appunto per mezzo dell' operazione del TAGLIACOZIO . Questo Siciliano vicino alla Calabria aveva potuto impararla , o dalla tradizione de' *Bojani* , o da TAGLIACOZIO medesimo .

Il Sig. RENEAUME da tante testimonianze persuaso a non credere chimerica l' operazione , pensò a perfezionarla dopo il TAGLIACOZIO , come questo l' aveva perfezionata dopo i *Bojani* . Ei crede , che se ne possa abbreviare la cura , e ridurla a 17. , o 16. giorni , facendo nel tempo stesso le due diverse ferite , che il TAGLIACOZIO non fa , che nell' intervallo di 15. giorni tra l' una , e l' altra .

Non ci estenderemo di più su questo punto , mentre l' occasione di far quest' operazione non può non essere rarissima , per rispetto a taluno , che ne merita la pena . Basta lo averle tolta via l' idea dell' impossibilità , e forse anche dissipata la beffa , a cui altri avrebbe potuto esporre la proposta .

#### OSSERVAZIONE IX.

UNA ragazza , in età di 10. anni in circa , nel cacciare dal letto si tagliò quasi affatto la lingua ; fu condotta dalla madre a un Chirurgo , che voleva finir di tagliargliela ; ma la madre pensò di consultar prima il Sig.

Sig. le MAIRE, il quale disse, che l'avrebbe guarita, se volesse lasciarsi far la futura; siccome quest'organo è un pezzetto delicato, specialmente per le donne, ella vi acconsentì; vi fece egli tre punti di futura, e gli assicurò con delle piccole compresse, dopo di che vi mise sopra del mel rosato, il che andò replicando ogni giorno; proibì alla madre di darle nulla per bocca per dodici ore, e nulla di nutrimento solido, se prima non fosse fatta la riunione; ordinò alla ragazza di non proferir parola, e siccome ella avea paura di perder ciò, che avea più caro, osservò esattamente gli ordini del Chirurgo, e non fece il minimo moto colla sua lingua, e in tre giorni fu perfettamente guarita.

## O S S E R V A Z I O N E X.

**I**l Sig. PAILLOT presentemente Chirurgo maggiore de' Bombardieri al servizio di S. M. I. in Toscana mi ha comunicato la presente osservazione. *Gaetano Cecconi di Livorno*, in età di 30. anni, Bombardiere a Firenze, ricevè disgraziatamente un' archibufata nel braccio destro; l'ingresso della ferita era nella parte superiore, e anteriore, ed il regresso rimaneva alla parte superiore, e posteriore del braccio, con un' emorragia considerabile; la prima cosa che fece il Sig. PAILLOT, fu di sentire il polso, ma non gliene trovò, il che l'indusse a credere, che la palla nel tragitto della ferita, che era di incirca a cinque dita, avesse offesa l'arteria brachiale. Subitamente fu fermata l'emorragia con de' rimedi convenevoli; si trasportò il malato in un letto; ed il primo apparecchio gli fu levato cinque ore dopo per esaminare più accuratamente la ferita, d'onde uscì molto sangue accagliato; ma non sopravvenne altrimenti l'emorragia, e fu medicata con delle pezzette bagnate nell'acqua vite. L'infermo avea il polso dall'altro braccio piccolo, e frequente, si sentì de' brividi tutta la notte, e non si riscaldò, che il giorno dopo, in cui la febbre divenne continua: al braccio ferito vi era una considerabile infiammazione dalla spalla fino alla punta delle dita; e il pollice, e l'indice aveano perduto ogni senso, il che servì di indicazione per cavargli sangue dall'altro braccio, come fu fatto replicatamente nel me-

desimo giorno. Le due bocche della ferita erano risecche, e livide, e lo spazio fra l'una, e l'altra divenne nero, e s'andava sempre più avvallando. Il Sign. PAILLOT fu obbligato a tagliare quell'intervallo fra le due aperture, e farne una sola; fatta l'incisione si scopre una lacerazione considerabile nel passaggio della palla; la ferita era profonda, e nera, e minacciava di dare in corruzione; onde fu medicata con una decozione vulneraria, ed emolliente. La febbre era continua, e tutti i sonniferi ordinarij non bastavano a conciliare il sonno al ferito; il dolore acerbissimo superava tutti i più efficaci rimedj. L'infermo avea de' brividi, che gli duravano un'ora, e restò in questo stato lo spazio di quattro giorni, in cui fu medicato regolarmente due, e tre volte il giorno, con tutto quello, che l'Arte può somministrare di più convenevole in simil caso; ma con tutto questo non si vedeva nella ferita cambiamento alcuno, anzi vi era grande sliramento, ed enfagione al cubito, e le dita erano di un color giallo. Tutti questi accidenti determinarono il Sig. PAILLOT a tener consulta, alla quale furono chiamati il Sig. KAYSER allora Chirurgo maggiore del Reggimento delle Guardie, ed altri Chirurghi del medesimo Reggimento, i quali avendo esaminata la ferita, e veggendo lo stato dell'infermo, che andava ogni dì perdendo di forze, risolvettero di comun consenso di farne l'amputazione; fu proposta al malato; ma egli pregò, che si differisse l'operazione al giorno seguente. Fu medicata la ferita alle ore otto della sera, e nella notte fu bagnata molte volte con dell'acquavite canforata. Il malato prese il suo solito sonnifero, che gli procurò due ore di riposo, e allo svegliarsi si sentì un piccolo sudore leggiero; nel resto della notte prese qualche altro poco di sonno, benchè interrotto, per la paura forse, che aveva di perdere il giorno appresso il suo braccio, come sarebbe infallibilmente seguito, se alle sette della mattina il Sig. PAILLOT, nel levar l'apparecchio, non avesse scoperto un cambiamento notabilissimo nella ferita, l'infiammazione del braccio molto scemata, calmato il dolore, e gli orli della ferita disposti alla suppurazione. L'operazione fu differita, e sulla sera fu creduta inutile, fu medicata la ferita con una decozion vulneraria, ed emolliente, e fu.

furon fatte delle unzioni spiritose, e anodine su tutto il cubito. La crosta si andò appoco appoco separando, e il ventesimo giorno cadde affatto; la ferita diventò bella, e vermiglia, e fu allora medicata con una decozione vulneraria, e ballamica, finché non si riempisse in fondo di buone carni. Si continuarono le unzioni spiritose sul cubito, che restò edematoso fino al trentesimo giorno. La ferita cominciò a cicatrizzarsi, e le carni crescevano talmente, che bisognò ricorrere a' corrosivi, e medicarla con delle fila asciutte fino al quarantesimo giorno, in cui restò affatto cicatrizzata.

Convien notare, che in tutto il tempo della cura non si sentì al polso, nè alla piegatura del braccio, e nemmeno alla ferita il minimo moto d'arteria, se non che il trentesimo giorno dopo, che il malato ebbe fatto qualche moto col braccio, si fece sentire leggermente al polso, e questa piccola momentanea pulsazione diventò in appresso continua, il braccio riprese le sue forze, e il ferito sei mesi dopo fu in istato di fare il suo servizio. Tutto quel, che gli è rimasto d' incomodo, è di non poter ferrar l' indice della mano.

## O S S E R V A Z I O N E X I.

**L**ario Schveinhaube in età di 55. anni anspezzata allora nel Reggimento delle Guardie, e al presente nel primo Reggimento in Toscana di S. M. Imperiale, nella compagnia di Dorquevaux, venne all' ospedale Militare di Firenze il dì 9. ottobre 1753. all' occasione di un' infiammazione erisipelatosa, che occupava tutta la parte capelluta della testa, e la fronte, stendendosi alla radice del naso, le orecchie, fino alla parte infera dell' occipitale. Quest' infiammazione si terminò per suppurazione; ed il Chirurgo, che lo medicò nel principio della malattia, sentendo la fluttuazione della marcia, si contentò farvi un piccolissimo taglio, nella parte più eminente della testa, per mezzo del quale uscì quantità di materia.

Nel mese seguente, cioè, il primo di novembre, che io entrai di servizio nello spedale, nell' esaminare il malato per medicarlo, e premendo colle dita per tutta la testa, restai non poco sorpreso nel vedere, che

esse affondavansi, come nella pasta, o nelle mele cotte, ed in quel mentre vidi zampillare da quella piccola apertura, che gli era stata fatta, una gran quantità di marcia verdastra, e puzzolentissima. Giudicai necessario per dar un libero scolo a queste materie di far col gammaut un' incisione in croce lunga quattro buone dita traverso nel luogo dove trovai il taglio già fatto; e per mezzo di quest' incisione uscirono più di due libbre di detta marcia. Sopravvenne in conseguenza di tal' incisione una piccola emorragia, che fermai facilmente per mezzo d' una compressione fatta con piumaccioli imbevuti nell' acqua stitica, e spremuti, e con compresse, il tutto sostenuto dalla fasciatura chiamata *la Capellina a due capi*, o *Bervetto di Ippocrate*. La seconda volta, che medicali il malato, uscì gran quantità delle medesime marcie, che continuarono a scolare ancora per tre, o quattro giorni; si stabilì di poi una lodevole suppurazione, che andò insensibilmente sminuendo. Io gli faceva delle iniezioni deterfise fatte coll' agrimonia, coll' aristolochia, e collo scordio, a cui vi aggiungeva il mel rosato, e l' essenza di mirra, e d' aloes. Reiterava dette iniezioni ogni volta, che io medicava il malato, mettendo delle compresse espulsive, e graduate imbevute nel medesimo liquore, aggiungendovi una quarta parte d' acquavite, intorno alla testa, per impedire il soggiorno delle materie nelle parti più declivi della testa, ed obbligarle ad evacuarli.

Convien notare, che uscivano in più volte colla suppurazione de' pezzi del *Pericranio*, alcuni larghi quanto una moneta di cinque paoli, e per conseguenza il cranio trovavasi in più luoghi scoperto, i quali luoghi io medicavo con de' piumaccioli imbevuti nello spirito di vino rosato col mel rosato. Questa gran piaga si mondificò, si fece la regenerazion delle carni, la suppurazione cessò affatto, e si cicatrizzò, senza veruna sfoliazione degli ossi del cranio, che erano stati scoperti, e privi del loro *Pericranio*; ed ebbi la soddisfazione, avanti di finire il mio mese di servizio, di vedere il malato perfettamente guarito, ed uscire dallo spedale. Egli gode ancora presentemente qui in porto Ferrajo d' una perfetta salute.

## O S S E R V A Z I O N E XII.

**I**L Sig. VERDUE (1) racconta, che una donna ricevè un gran colpo all'occipitale, che penetrava fino alla sostanza del cervello, del quale uscì fuori una piccola porzione. La ferita si stendeva dall'occipitale fino alla tempia sinistra, e scendeva alla parte superiore del naso; il muscolo temporale, e i suoi vasi erano troncati affatto: con tutto questo essendo stata due giorni senza l'uso della parola, e de' sensi, ricuperò in poco tempo la salute, e si trovò perfettamente guarita.

## O S S E R V A Z I O N E XIII.

**I**L Sig. DU VERNEY (2) racconta di aver fatto l'apertura del cadavere di un bambino di otto in nove anni, morto di un *Idrocefalo*, e avergli trovati gli ossi del cranio, cioè, il coronale, i parietali, e l'occipitale, grossi più di due linee, e la *Dura-Madre* talmente attaccata alla superficie di questi ossi, che fu obbligato a tagliarla intorno intorno al cranio; ne uscì quasi tre pinte di un'acqua chiara, e senza odore, e non trovò nel cranio alcuna sostanza del cervello, a riserva della midolla allungata, che nasceva da un monticello situato nel centro della sella dello *Sferoide*. I nervi ottici non avevano il diametro, che son soliti avere in quell'età; del restante tutte le altre parti del corpo si trovarono ben condizionate, e il bambino era in buono stato. Gli occhi solamente parvero al Sig. DU VERNEY più piccoli del solito, e non potè sapere, se le funzioni della vista, e della favella fossero abolite; ma in quanto alle funzioni animali, vi è luogo di credere, che si facessero, giacchè il bambino era arrivato fino all'età di otto in nove anni.

OS.

[1] *Patholog. Chirurg.* Tom. 1. pag. 248.

[2] *Traité des maladies des Os.* Tour. 11. pag. 3. Obs. 1.

## O S S E R V A Z I O N E XIV.

**I**L Sig. LA MOTTE (1) racconta di un uomo, a cui una ruota di una carretta carica . . . . fracassò la gamba, e vi era una eccessiva contusione, e un tale stracciamento degli ossi, che si sarebbe potuta far l' amputazione con un solo colpo di coltello; gli ossi erano interamente scoperti; e finalmente dopo la riduzione, se si può dare un tal nome all' operazione, che si fece, parve una suppurazione considerabilissima, accompagnata da una enfagione smisurata, e da un odore cadaverico; però il Sig. LA MOTTE, rassicurato dal buon temperamento del malato, dalle sue forze, e dalla favorevole stagione; veggendo di altronde, che non vi era nè febbre, nè vivi dolori, differì l' amputazione; fortuna per l' infermo, poichè egli si trovò sì perfettamente guarito in capo a un anno, che si serviva liberamente della sua gamba, senza che vi fosse la minima deformità.

## O S S E R V A Z I O N E XV.

**I**L Sig. DU VERNEY il giovane (2) racconta, come un uomo in età di 40. in 42. anni, di buon temperamento fu ferito la vigilia di S. Tommaso 1701. da una stoccata nella parte media inferiore, ed interna del braccio destro: il colpo penetrava salendo obliquamente quattro, o cinque dita trasverse, il sangue uscì con impeto, ed il ferito ebbe tosto uno svenimento. In questo stato fu portato dal primo Chirurgo più vicino; il quale si assicurò dell' arteria per mezzo di una compressione, e di una forte legatura fatta sopra il gomito. Rinvenuto il ferito dal suo svenimento fu condotto in casa sua; si aprì l' ingresso della ferita, si introdussero nel fondo di essa delle fila imbevute in certi liquori astringenti, colle quali si turò bene la ferita, e tutto l' apparecchio fu sostenuto da una forte fasciatura. Il ferito fu salassato, ridotto a brodi leggerissimi, e alla tisana. Egli non fu medicato, che do-

(1) *Traité Complet de Chirurgie. Tom. 14.*

(2) *Memoir. de l' Acad. R. des Sc. de Paris ann. 1702.*

dopo 48. ore ; si levò l'apparecchio eccettuati i piumasciuoli per umettare solamente le compresse , e fascie , si usò la medesima cautela per la fasciatura come la prima volta , e si continuò appresso a poco nella stessa maniera fino alla vigilia di S. Genovesa ; il sangue uscì abbondantemente ; si fece ancora una piccola incisione , e si medicò il ferito quasi come la prima volta , quantunque fossero già alcuni giotni , che il malato si era accorto , che il cubito mutava di colore , ma però non avea dolore . La febbre era continua , e ardente , l'inquietudine , e la veglia grandissima . Finalmente il giorno di S. Genovesa si trovò non solamente il cubito gangrenato , ma ancora , che la putrefazione si era avanzata fino alla parte interna del braccio . Il malato , e gli assistenti spaventati , chiesero consiglio , e furono scelti tre Chirurghi avvezzi a vedete casi grandi . Questi esaminarono il malato , e la malattia ; il cubito era interamente cadaverico , come anche la parte interna del braccio fino all'ascella , e l'osso del braccio scoperto dalla putrefazione fino a tre , o quattro dita trasverse dall'ascella . Il progresso della putredine , la febbre con oppressione , le gote livide , il polso piccolo , e vacillante persuasero ad abbandonarne la cura alla natura , contentandosi d'ajutarla per mezzo de' rimedi tanto interni , che esterni .

Il medesimo giorno si presentò una donna nominata *Genovesa* , la quale promise di guarire il malato ; i due Chirurghi , che lo curavano , glielo abbandonarono . *Genovesa* cominciò a fregar con un unguento tutto il braccio , e il cubito , senza riguardo a ciò che era cadaverico , e poi coprì il tutto con de' panni lini , che essa fermò con degli spilli sino alla sera , che rimedicò il malato nella stessa maniera ; e ordinò , che si dessero al malato degli alimenti succulenti , e del miglior vino : in 24. ore la suppurazione cominciò a stabilirsi ; ella continuò la stessa maniera di medicare , ed ogni volta la piaga pareva più bella , la putredine separandosi con facilità rimaneva attaccata a' panni lini , o alla carta sugante , di cui spessissimo si serviva . Fu proposto a *Genovesa* di separare il cubito nella giuntura , tanto a cagione del cattivo odore , che a causa che era quasi separato dalla putredine ; ma ella non volle , dicendo , che non occorreva toccarlo ,  
men-

mentre il suo rimedio farebbe tutto ciò, che farebbe necessario.

In fine tutto il cubito si staccò interamente dal braccio nella giuntura sei settimane dopo, contando dal giorno che *Genovesa* cominciò a curare il malato: continuò a mettere sull'osso del braccio scoperto, come fu tutto il resto, il suo unguento, senza verun riguardo al marciume, che pareva stillare fra l'osso, e le carni, nè ad alcun' altra circostanza. L'esito non fu meno felice; imperocchè un mese dopo la separazione del cubito, la porzion dell'osso del braccio, che era stata scoperta, cadde, e si separò interamente dal resto dell'osso sano.

Avanti questa separazione non si sapeva ciò, che diventerebbe questa gran porzione di osso, nè il lembo di pelle dalla parte posteriore del braccio; si era ancora temuta l'emorragia: ma tutto questo non intrigava punto affatto *Genovesa*; ella continuò la sua maniera di medicare, scorsero de' sughi nutritivi da ogni fibra restante, ogni tubo venne ad allungarsi. Finalmente il braccio acquistò la sua lunghezza naturale, l'estremità parve figurata, come naturalmente deve essere, e la cima del lembo della pelle si rovesciò sulla parte inferiore dell'osso, e lo coprì a mezzo. Restò solamente lungo la parte interna una cicatrice disforme a guisa di crosta un po' squammosa; il che si farebbe agevolmente evitato, se si fosse impedito agli orli della pelle di rovesciarsi in dentro; e ciò è accaduto perchè non poteva attaccarsi all'osso, e perchè non si è avuta l'attenzione di accostare gli orli dopo la caduta dell'osso.

Tutto ciò è seguito nel corso di quattro mesi, senza che l'infermo abbia avuto un accesso di febbre, nè alcuno incomodo; fu purgato due volte, e gode di una perfetta sanità.

#### *Riflessioni sopra questa straordinaria cura.*

Vi è luogo di credere, che la putredine sia stata cagionata dalla maniera di medicare il malato; imperocchè, oltre che si era fortemente ferrato il luogo della ferita vi si era ancora posta una grossa compressa lungo il tragitto dell'arteria fino sotto l'ascella, di maniera che la materia del nutrimento era stata tolta al cubito, e a' luoghi premuti dalla fasciatura. Si può scansare que-  
sto

Ro disordine , o facendo la legatura al vaso , quando sia possibile , o servendosi della fasciatura aneurismale , che è una specie di brachiere , o ponendo all' orifizio del vaso della miccia d' Alemagna , o del *Crepitus Luti* , o sia *Lycoperdon* preparato , o non preparato , che è una specie di fungo ; ma quando si adoperino i due ultimi rimedj , bisogna far tenere il fungo , o la miccia , finchè sia attaccato , ed incollato al vaso , indi far uso della miccia , o delle polveri assorbenti , e delle balsamiche , e nell' una , e nell' altra di queste occasioni trattenere la circolazione nella parte .

La grande emorragia , quattro copiosi salassi , ed un severissimo regolamento nel vivere aveano esaurito , e tolto le parti balsamiche del sangue dell' infermo ; così spogliato della sua parte untuosa , e chiosa , non ha potuto ripararsi , nè somministrare delle materie capaci di ravvivare la parte ferita ; il che ha cagionato la febbre , ed accresciuta la putredine , non essendo addolcita , e corretta co' mezzi convenevoli . Subito dopo che il malato ebbe preso de' buoni alimenti , cominciò a star meglio , il progresso della putredine cessò , e la vita cominciò a manifestarsi mercè uno stillamento , che pose de' limiti fra la parte sana , e la parte morta . Vi è luogo di giudicare , che i vasi siano stati cauterizzati , o turati da' luoghi corrosivi , come l' avrebbero potuto essere da' caustici ordinarj , o dalla legatura , poichè l' arteria non ha dato sangue nel tempo della suppurazione , quantunque non fosse compressa in alcuna maniera , quantunque ella fosse vicina al suo tronco , e che il malato prendesse de' buoni alimenti , e del buon vino ; la maniera dolce , e insensibile , onde si è fatta la suppurazione , e la separazione delle parti morte , o cauterizzate , ha dato il tempo all' arteria di separarsi ; il che fa ben conoscere , che non bisogna mai affrettare la caduta della crosta , nè la legatura de' vasi , ove sianfi applicati . Al contrario , è d' uopo servirsi di rimedj capaci di assorbire le umidità superflue delle vicinanze , affinchè la legatura , o la crosta resti più lungo tempo , e dia luogo alle carni , e a' vasi di allungarsi , di unirsi , e di opporsi all' impulso del sangue .

Si deve medesimamente pensare , che la maggior parte delle precauzioni , che ordinariamente si prendono per fare sfogliar gli ossi , o in tutto , o in parte , sono spesso

volte inutili, o nocevoli, essendo questa l'opera della natura. Il maggior segreto è di conservare alla parte il suo calor naturale, o aumentarlo, quando è languente; e sovente ciò si fa con una maniera molto semplice, come si vede dall'osservazione precedente, e in breve tempo, malgrado il disordine, in cui era il braccio, e le poche carni, che vi restavano. In tal'occasione, per esempio, il brusco, il trapano, e il cauterio, farebbono stati inutili; si poteva segar l'osso, allor quando la putredine fu slacciata; ma non si farebbe per questo risanato l'infermo più presto, poichè senza dubbio la sfoliazione sarebbe stata ritardata, e il malato non avrebbe acquistato un allungamento di parti, che gli tengono luogo di braccio.

Si son veduti molti Chirurghi aspettare la sfoliazione, o separazione di una porzione di qualche osso fino a sette in otto mesi, ed anche degli anni interi inutilmente, non ostante l'uso delle fila asciutte, dello spirito di vino, de' caustici, e del brusco, o sia *raschiatojo*, mentre che altri ne venivano felicemente a capo in minore spazio di tempo.

*Unguento di Genovesa, o Balsamo interno, ed esterno.*

Prendete olio d'oliva tre libbre, acqua di rosa mezza foglietta, cera nqva mezza libbra, trementina di Venezia una libbra, sandalo rosso in polvere due oncie.

Bisogna far bollire il tutto in una pignatta di terra nuova con tre mezze fogliette di vino rosso; avendo bollito mezz'ora, leverete la pignatta dal fuoco, e lo lascierete raffreddare; dopo di che separerete il balsamo dal vino, e le polveri, che restano in fondo della pignatta.

Serve questo rimedio non solamente per ogni sorta di ferite, o penetranti, o non penetranti, per le ulcere cancrenate, reumatismi, ed ogni sorta di dolori, anche interni, come alla pleuretide, colica, dolori di testa, ec., ungendo caldamente, e prendendone due dramme per bocca. Adoperasi anche in tutte le febbri maligne.

Questo rimedio serve ancora contro il morso degli animali velenosi.

Nelle ferite, che penetrano nelle cavità, bisogna schizzetrarne nella ferita, o farne prendere col brodo di

vitello , di cappone , o altro , oppure con alcune acque , o tisane vulnerarie .

## O S S E R V A Z I O N E XVI.

**I**L Sig. LITRE (1) racconta di un uomo in età di 34. anni di una buona costituzione , ma debole di spirito da 3. anni in quà , che cadde in un violento acceso di pazzia , durante il quale essendo al letto coricato sulla schiena , si diede diciotto coltellate nel ventre , senza sentire , per quanto disse al Sig. LITRE , alcun dolore , immaginandosi solamente di cacciare il coltello in un mucchio di butirro . La lama di questo coltello era lunga cinque pollici , e avea sette linee di larghezza presso il manico , andando sempre sminuendo fino alla punta .

Dieci di queste ferite non intaccavano che alcuni degl'integumenti del ventre ; ma le otto altre penetravano nella capacità con lesione di alcune parti , che ivi sono contenute . Lo specillo mi assicurò della penetrazione di queste ferite ; gli accidenti , che sopravvennero , mi fecero comprendere , che alcune delle parti contenute erano ferite . Questi accidenti furono la febbre , la tensione del ventre , la respirazione difficile , e dolorosa , le nausea , il vomito , la diarrea ec.

Fra le materie , che l' infermo rendeva per bocca vomitando , vi erano de' filetti di sangue , de' quali gli uni erano neri , e gli altri di un rosso cupo . Nelle materie , che uscivano per secesso , vi si osservavano de' piccoli coaguli , e de' filetti di sangue . I coaguli erano neri , e i filetti di un rosso chiaro . La diversità di questi colori del sangue verisimilmente derivava dal maggior , o minor soggiorno , che avea fatto nella cavità dello stomaco , e degl'intestini .

Quantunque questa malattia paresse incurabile pel gran numero delle ferite , per la natura , e la situazione delle parti offese , e per gli accidenti , onde furono seguite ; il malato non per tanto guarì nello spazio di due mesi , nella maniera seguente .

Que-

(1) *Memoir. de l' Acad. R. des Sc. de Paris ann. 1705.*

Quest' uomo fu salassato sette volte dal braccio i quattro primi giorni ; cioè , tre volte il primo giorno , due il secondo , ed una solamente il terzo , ed il quarto . Ogni volta gli furon cavate dodici oncie di sangue ; osservò durante il corso della malattia una regola di vivere tenuissima , ed esattissima . Il suo brodo era fatto con vitello , pollame , e gamberi , e vi si aggiungeva di quando in quando della lattuga , della porcellana , e della cicoria dolce . Si facea la sua tisana con fiori di tussilagine , la radice di consolida maggiore , i capillari , e le foglie di rosolaccio . Prendeva qualche volta la sera dell' emulsioni , del giulebbe di papavero bianco , o del laudano .

Con tutti questi mezzi il Sig. LITTRE si propose di calmare l' agitazione degli spiriti , di rendere della consistenza al sangue , di far cessare le nausea , il vomito , e la diarrea , di prevenire il singhiozzo , e la tosse , e di fermare lo scolo del sangue delle ferite penetranti nella capacità , lo spargimento del quale poteva avere delle pericolose conseguenze .

Fece tenere l' infermo coricato sulla schiena , perchè essendo in quella situazione , allorchè venne a ferirsi , il Sig. LITTRE sperava , che si spargerebbe nella capacità del ventre minor copia delle materie contenute nella cavità degl' intestini , congiunturando che soffero forati , per la situazione delle ferite , e pel sangue , che l' infermo rendeva per bocca , e per l' ano .

Si medicava l' infermo una volta il giorno nel principio della malattia , e in appresso ogni due , tre , o quattro giorni una volta . Ne' sei primi giorni si mise nella ferita più grande , e più bassa di quelle , che penetravano nella capacità , una tasta di fila molle , ottusa nella piccola estremità , e ricoperta di balsamo d' *Arceo* , per conservare in tal guisa uno scolo alle materie , che potevano essere sparse , o spargerli nella cavità del ventre . Ma veggendo , che ne usciva poca cosa , e che la tasta impediva la riunione di questa ferita , il Sig. LITTRE la sopprime , contentandosi di farvi mettere , come nell' altre , un semplice piumacciolo ricoperto del medesimo balsamo .

Nella metà della cura si fece uso del balsamo verde , invece di quello di *Arceo* , e verso la fine si bagnarono i piumaccioli nell' acqua vulneraria : finalmente ogni

ogni volta che si medicava, si asciugarono poco, e molto dolcemente le ferite, e si lasciarono esposte all' aria meno che fu possibile.

Il malato, essendo così guarito delle sue ferite, stette ancora dello spirito meglio assai, che non era stato per innanzi, riprese la sua calma naturale, e la sua condotta fu più regolare di prima. Si presumeva, che questo nuovo stato sarebbe di lunga durata, sul fondamento de' buoni effetti della quantità de' rimedj, che gli erano stati fatti, e sull' esatta dieta da lui osservata durante il corso della malattia, e che prometteva di continuare in avvenire. Ma per disgrazia si trovò falsa la congettura fatta, imperocchè diciassette mesi dopo, quest' uomo essendo caduto in un nuovo accesso di pazzia, si gettò giù da una finestra di un terzo piano sulla strada, e morì sul fatto.

Credeasi comunemente l' utero sì delicato, che una graffiatura, un colpo di unghia vi cagioni un' infiammazione, e tovente la morte, e che la minima ulcera in essa sia sempre incurabile. Ciò non ostante il Sig. TAUGEON fece vedere all' Accademia Reale delle Scienze di Parigi una lettera scritta al Sig. DRONIS dal Sig. CIRON Chirurgo della marina a Brest, la quale riferiva, che una notabilissima ferita nella matrice non avea cagionata la morte. Eccovi il fatto molto compendiato, e ridotto a i soli punti essenziali (1).

#### OSSERVAZIONE XVII.

**U**NA Lavandaja di Brest in età di 34. anni, di un temperamento robusto, gravida di 6. o 7. mesi, essendo caduta violentemente sulla punta di una palizzata della città, si fece tre, o quattro dita al di sotto dell' ombilico una ferita larga due dita. Di lì in poi ella cessò di sentire il suo feto. Versò per la vulva 8., o 10. giorni dopo, molto sangue mischiato di putredine, e questo scolo durò 8., o 10. giorni. La ferita del ventre essendo stata curata col metodo ordinario, questa donna ritornò in assai buono stato, ricominciò a lavorare,  
 Tom. III. M pag.

[1] *Hist. de l' Acad. R. des Sc. de Paris, ann. 1709.*

passò il nono mese della sua gravidanza, e giunse al quindicesimo senza notabile incomodo. Allora si formò un tumore nel sito del ventre, ov' era stata ferita; il tumore venne ad aprirsi da se medesimo, uscirono pel corso di 49. giorni delle materie di buona qualità; indi si disseccò, e si cicatrizzò. Il ventesimo settimo mese dalla gravidanza, tornò il tumore, ma assai più considerabile, e in tre giorni diventò grosso quanto un pallone. Fu aperto, e ne uscirono due pinte di materie puzzolentissime, di cui l' evacuazione sollevò molto l' inferma. Il terzo giorno della medicazione vennero fuori delle piccole ossa, e finalmente di giorno in giorno vennero le une dopo le altre tutte le ossa di un piccolo scheletro di sei in sette mesi. Certamente era stata forata la matrice dalla punta della palizzata, e il feto vi era stato ammazzato da quel colpo; vi si era imputridito, ed in seguito ne era uscito per l' apertura della ferita, non essendo più che uno scheletro, ove le sue ossa ne erano uscite per la medesima apertura le une dopo le altre. Nulla può essere più contrario, che questa storia all' estrema delicatezza, la quale viene attribuita alla matrice: o se, come vi è apparenza, questa delicatezza le viene attribuita con ragione, niente prova meglio che non bisogna mai disperare di alcuna cura. Non dobbiamo tralasciare di dire, che questa stessa donna si trovò incinta di un falso germe il quartodecimo mese dopo la sua caduta; del quale falso germe si sgravò con una considerabile perdita di sangue.

### OSSE R V A Z I O N E XVIII.

**I**L Sig. MERY (1) racconta, che a i 17. Ottobre dell' anno 1701., una ragazza in età di 27. in 28. anni, venne nel grande Ospedale di Parigi all' occasione di un' ernia formando un tumore, il quale estendevasi dall' inguine sinistro fino nel mezzo della coscia. Il suo diametro era di circa sette a otto pollici; era duro nella sua parte superiore, molle nell' inferiore; l' inferma vomitò.

[1] *Memoir. de l' Acad. R. des Sc. de Paris. ann. 1701.*

mitava gli alimenti, che prendeva, e andava nondimeno assai liberamente per secesso.

Si tentò invano la riduzione delle parti, che erano contenute in questo tumore, ciò che fece pensare di venirne all' operazione; ma il Sig. MERY non vi acconsentì per due ragioni; la prima, perchè l' ernia essendo molto antica, avea luogo di credere, che le parti, le quali erano uscite fuori della cavità del ventre, dovevano essere aderenti nel tumore; la seconda, perchè l' inferma andando, come si è già accennato, assai liberamente per secesso, non giudicava perciò l' operazione di una necessità assoluta. Non volendo però starli al suo solo parere, chiamò il dì 18. i Sigg. DEBOURGES, MORIN, HEMERAIS, e AFFORTI, Medici del detto spedale, perchè visitassero l' inferma, e dicessero il loro parere sopra ciò, che far si doveva. I loro sentimenti furono divisi, giudicando gli uni l' operazione necessaria per impor fine al vomito, e gli altri non trovando a proposito di farla; perchè sembrava loro come impossibile superare l' aderenza dell' intestino, senza cagionare la morte all' inferma. L' opinione di questi ultimi fu seguitata; ma perchè uno di essi fu di sentimento, che vi fosse dell' acqua nel tumore oltre le parti, il Sign. MERY esaminò con maggior attenzione, che non avea fatto di prima, e sulla relazione, che loro fece, di sentire effettivamente nel basso del tumore un liquore ondeggiante, furono di parere di aprirlo. Per mezzo della punzione, che vi fece col *Troicart*, ne uscì in circa una pinta di sierosità tinta di sangue, e molto fetida, lo che gli fece giudicare, che le parti rinferrate erano cancrenate.

Due giorni dopo il Sig. MERY replicò la punzione, perchè il tumore erasi riempito; il liquore, che ne uscì questa seconda volta, era molto più puzzolente della prima, più torbido, ed avea minor tintura di sangue, donde trasse questo prognostico, che la cancrena dell' intestino era degenerata in un' intera putrefazione. Non ostante lo stato deplorabile, in cui trovavasi allora l' inferma, il suo polso sostenevasi, il suo ventre era senza dolore, e rendeva gli escrementi per l' ano; ma vomitava la maggior parte degli alimenti, che essa prendeva.

La sanie cadaverica, che estrasse la seconda volta, che fece la punzione al tumore di questa zittella, continuò a colare pel corso di tre giorni per le due aperture che vi fece, senza alcun miscuglio di escrementi. Passati quei giorni, la cancrena cominciò ad attaccare gl' integumenti del tumore, che caderono appoco appoco in un' intera putrefazione; ed allora la materia, che uscì per le due aperture, che vi avea fatte, parve mischiata di escrementi, segni evidenti, che l' intestino imputridito era finalmente scoppiato. La cancrena non fece un progresso molto grande negl' integumenti; ella si limitò, e non descrisse, che un circolo di tre, o quattro pollici di diametro, che egli tagliò subito che la natura parve da se stessa farne la separazione.

Quella parte corrotta degl' integumenti essendo portata via, venne a scoprire parecchie circonvoluzioni d' intestini tenui interamente imputriditi; non erano aderenti negl' involti, che loro vengono somministrati dagl' integumenti; ma due circonvoluzioni dell' intestino *Colon*, che vi erano altresì contenute, vi erano naturalmente nnite da un lato della loro superficie esteriore. Tutto quello, che era passato di quell' intestino nel tumore, non era niente alterato, il che apparì subito dal suo color rosso, e vermiglio, il quale si è sempre conservato lo stesso in tutt' il restante della malattia.

Dopo aver separato ciò, che era corrotto degl' integumenti, il Sig. MERY tagliò il medesimo giorno le circonvoluzioni degl' intestini tenui, ne trasse ancora il giorno seguente colle sue dita la lunghezza di circa un piede; di maniera che l' inferma perdè almeno quattro, o cinque piedi de' suoi intestini.

Quantunque di poi non vi sia stata più comunicazione alcuna degli intestini tenui co' grossi, ciò non ostante uscirono di tempo in tempo alcuni escrementi per l' ano, i quali verisimilmente sono stati ritenuti nel *Colon* dopo l' operazione, ove hanno soggiornato pel corso di sette settimane, poichè l' inferma ne ha ancora reso il dì 11. di Dicembre. Può darli anche, che questi escrementi venissero dallo scarico delle glandole, e che si ragunassero nel *Colon* di questa zittella, come fanno in quello del feto rinchiuso nell' utero.

Ben-

Benchè gli alimenti mal digeriti, e gli escrementi mal condizionati dopo l' operazione uscissero liberamente per l' apertura dell' intestino tenue, che si è unito nell' inguine, nulladimeno il vomito dell' inferma continuò ancora di poi pel corso di parecchi giorni, ma senza sentire dolore alcuno nel ventre.

Il suo stomaco non ristabilendosi, che appoco appoco, non ritenne, che gli alimenti, che l' inferma bramava con desiderio di mangiare, e rigettava quelli, pe' quali aveva dell' avversione, quantunque fossero migliori degli altri; quindi si è veduta vomitare del pollo, che aveva mangiato, e digerire dell' aringa.

In seguito il suo stomaco divenuto più forte, non vomita più niente oggidì di tutto ciò, che ella prende; le succede solamente, quando mangia delle frutta verdi, de' porri, o delle rape cotte, di renderli per l' intestino aperto, appresso a poco, tali quali essa gli ha ingojati.

Ciò che avvi di assai notevole in questa donzella, che ha perduto quattro, o cinque piedi di intestini tenui, si è, che quando non carica troppo il suo stomaco, e che non prende, che degli alimenti di facile digestione, ella rende degli escrementi di una consistenza così soda, come solevano avere, quando passavano per l' intestino *Colon*, ed uscivano per l' ano; altrimenti le sopravviene la diarrea.

Finalmente essa va rimettendosi di giorno in giorno nel suo buono stato, ciò, che addita aver perduto solamente gli ultimi quattro, o cinque piedi dell' *Ileon*, di modo che la maggior parte degli intestini tenui essendo rimasta nel ventre, tutto ciò che ella prende di liquido ha il tempo, ed ancora bastevol copia di condotti per passare col chilo nel suo riserbatojo.

Al giorno d' oggi, 17. Dicembre, resta ancora a questa donzella sotto l' Inguine un tumore più grosso di un uovo di pollo d' India. Questo tumore ha un' apertura di tre, o quattro linee di larghezza, e più di mezzo pollice di lunghezza. Siccome la cicatrice che lo circonda è molto assiondata, non vi è apparenza che essa apertura scemi di più; e siccome gi' intestini grossi sono quelli, che formano la maggior parte del volume

di questo tumore, e che vi sono naturalmente uniti agl' integumenti, vi è luogo di credere, che esso conserverà sempre la medesima grossezza, sicchè può dirsi, che la malattia di questa povera donzella non può ricevere una più perfetta guarigione.

Eccovi adesso tutta la condotta tenuta dal Sign. MERY da due mesi in qua, che ha avuto l' attenzione di medicare questa inferma. Durante i primi giorni applicò sul tumore delle fomentate, e de' cataplasmi emollienti, colla speranza di potere, col rallentare gli anelli de' muscoli, ridurre nel ventre le parti, che n' erano uscite, e che formavano questo tumore; nel che non ha potuto riuscire. Quando poi si accorse, che andava impallidendo il color naturale degl' integumenti, e che ritenevano l' impressione delle dita, si servì di cataplasmi risolutivi, e fortificanti per risvegliare il calor naturale. Non così tosto venne a comparire la cancrena, che egli applicò l' unguento di storace per opporsi al suo progresso, e lo continuò fino alla separazione dell' escara. Dall' ultima punzione fino a questa separazione, schizzettò nel tumore dell' acqua vulneraria, di cui si è dopo sempre servito, tanto per resistere alla putredine, che per mondificare l' ulcera. Per tal' effetto mise nella sua cavità de' piumacciuoli imbevuti di questo liquore, che coperse in seguito con un cerotto di minio, e con una compressa bagnata nel vino rosso; lo che continuò di fare fino al punto di guarigione, in cui trovavasi presentemente questa povera donzella, che di lì a non molto fu condotta all' Ospedale generale, d' onde poi è uscita per andare a servire. In quel tempo essendo stata obbligata a curvarsi per fregare un pavimento, ed il ventre essendo ristretto, mercè questa incomoda situazione, l' è accaduto, che l' intestino *Ileon*, unito agli anelli de' muscoli, venne appoco appoco spinto nel tumore restante, che dilatò la sua apertura d' un pollice, e mezzo, e che in fine uscì al di fuori per la lunghezza di mezzo piede, rovesciandosi come fa il *Recto*, quando cade nell' ano. La *flussione*, l' infiammazione, e la cancrena superficiale, che sopravvennero a quest' intestino, durante i calori grandi del mese di Agosto, hanno obbligato questa povera donzella a rientrare nell' ospedale.

dale grande, per ivi ricevere quel foccorso, di cui ella ha bisogno.

E' molto tempo, che l'esperienza avendo fatto conoscere al Sig. MERY l'estremo pericolo, che corrono coloro, che sono assaliti da ritenzione d'urina, quando per sollevarli trovansi costretto, [ per non potere siringarli ] di fare un' apertura nel *Perineo* per entrare nella vescica, perciò egli si è sempre immaginato, che farebbe cosa assai più sicura fare al di sopra degli ossi del *Pube*, una punzione nel corpo di questo viscere per trarne l'urina.

L'occasione di far questa prova presentossi il mese d'Agosto 1701., come si vedrà dalla seguente osservazione.

### OSSERVAZIONE XIX.

IL Sig. MERY [1] racconta di un povero uomo in età di sessant'anni in circa, che non potendo urinare da vent'otto ore in qua, venne al grande ospedale per cercarvi il foccorso, di cui aveva bisogno. Si tentò parecchie volte di siringarlo; ma non si potè venirne a capo. Il Sig. MERY lo fece bagnare, prese dell'emulsioni fatte co' semi freddi, collo sciroppo di limone, e l'acqua di parietaria. Tutti questi rimedj essendogli stati inutili, il Sig. MERY prese finalmente la risoluzione di fare al di sopra degli ossi del *Pube*, accanto alla parte esterna inferiore del muscolo dritto del ventre, una punzione nel corpo della vescica col *Troicart* munito del suo cannello.

Ne uscirono almeno tre fogliette d'urina, che parve ad un tratto mischiata di marcia, e di viscosità. Il Sig. MERY lasciò il cannello nella vescica soltanto fino al giorno seguente, perchè essendo d'acciajo, temeva, che le parti punte ne venissero a patire. Quel giorno si passò senz'urina, lo che l'impegnò verso la sera a replicare la punzione pel medesimo sito, avendo la precauzione d'introdurre nella vescica il *Troicart* corredato del suo cannello d'argento, di cui credè, che

M 4

le

[1] *Memoir. de l'Acad. R. des Sc. de Paris. ann. 1701.*

le parti non venissero a patirne tanto. Egli lasciò pel corso di due giorni questo cannello nella vescica, alla fine de' quali l'orina cominciò a scorrere appoco appoco per la verga, il che lo indusse a ritirare il cannello. Il primo giorno della punzione si lasciò il cannello aperto per dar luogo all'orina di uscir fuori liberamente, e per tal mezzo porgere occasione alla vescica di ristabilirsi. Il secondo, ed il terzo giorno egli chiuse il cannello, contentandosi di aprirlo durante questi due giorni di otto in ott' ore, a fine di rimettere le fibre carnose della vescica in istato di contrarsi per espellere l'orina per l'uretra, o pel cannello in caso, che il collo della vescica non potesse cedere allo sforzo delle fibre del suo corpo. L'infermo passò la notte dal terzo al quarto assai tranquillamente, ed il giorno seguente evacuò per la verga, secondo che ei gli disse, due pinte d'orina.

A' dieci fu perfettamente guarito della punzione, sulla quale il Sig. MERY applicò nel principio una compressa imbevuta nel vin rosso, e sulla fine un cerotto di minio. Qualunque egli abbia fatta la punzione accanto alla parte inferiore del muscolo dritto, per entrare nella vescica, ed evitare l'arteria, e la vena epigastrica, che serpeggiano sulla superficie interna di questo muscolo; ei crede però, che essa possa farli senza alcun rischio, immediatamente al di sopra della *Simfisi* degli ossi del *Pube*, fra i due muscoli piramidali, il che il Sig. MERY ha provato di poi con un esito felice.

Sulla fede soltanto dell'esperienza, si può credere, che si risanino le stoccate nello stomaco, il che sarà anche provato dalle seguenti osservazioni.

#### OSSERVAZIONE XX.

**I**L Sig. DU VIVIER [1] Chirurgo maggiore del Reggimento de' Dragoni di *Linguadoca*, racconta di un Dragone del medesimo Reggimento, che avendo ricevuto una stoccata in quel viscere, venne subito a vomitare del sangue, e degli alimenti, il che gli fece giudica-

[1] *Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Paris. ann. 1723.*

care, che il colpo apriva l'orifizio superiore dello stomaco, facendo obliquamente un tragitto d'intorno a sei pollici. Medicò egli il ferito, e lo fece salassare sette volte in ventiquattr'ore, il che però non impedì, che non lo assalissero una gran febbre, e che non vomitasse ancora più di una scodella di sangue. Non ostante per via di una dieta esattissima coll'uso delle vulnerarie, e dell'acqua di sedo, e con quello de' cristerj, scemò la febbre il terzo giorno, restando soltanto il singhiozzo, e de' frequenti sospiri; ma finalmente in capo a 18. giorni fu risanato. Due mesi dopo ebbe una febbre terzana, onde per iscacciarla gli fu dato l'emetico, il quale lo fece vomitare buona copia di sangue, forse perchè le scosse dello stomaco avevano riaperta la superficie interna della ferita: ma il Sign. du Vivier lo liberò ancora da quest' accidente. Il che gli costò più tempo del primo, poichè vi vollero due mesi interi.

## O S S E R V A Z I O N E XXI.

Lo stesso Sig. du Vivier [1] non tralasciò di impiegare questo stesso emetico, che aveva riconosciuto per sì pericoloso in un'altra ferita dello stomaco. Un Uffiziale dopo d'aver dissolutamente seduto a tavola dieci ore, ricevette una sboccata, e lo stesso Sign. du Vivier a cagione del vino, che ne usciva, e pel sito della ferita, giudicò, che forasse lo stomaco nel suo fondo. La ferita esteriore era di circa tre linee. Un altro Chirurgo voleva salassarlo; ma egli fu di parere, che si facesse uso dell'emetico, perchè se lo stomaco, il quale era assai carico, e teso venisse a sollevarsi da questo eccessivo peso, le sue parti divise si raggiungerebbero, e la ferita, la quale non poteva essere, se non che piccola, diminuirebbe di molto in un istante. Questa decisione, benchè ardita, fu approvata. Si cavò sangue al ferito, dopo che lo stomaco fu vuotato, tutto il resto si fece giusta l'ordinario, e secondo che conveniva, di modo che la guarigione fu perfetta.

Ip.

[1] *Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Paris. ann. 1723.*

IPPOCRATE, ARISTOTILE, e GALENO hanno creduto, che le ferite del fondo della vescica fossero assolutamente mortali: varj Autori moderni hanno decisamente provato il contrario col mezzo delle osservazioni; e ne riferiremo ancoia due, che confermano la medesima verità. Siccome le osservazioni sopra questo soggetto sono rare, queste perciò potranno non esser giudicate interamente inutili.

## OSSERVAZIONE XXII.

UN Muratore di Laufana [1], dell' età di 25. anni, ricevette l' anno 1724. un' archibufata nel basso ventre; la palla, che pesava un' oncia, entrò nella parte sinistra dell' addome, un pollice distante dagli ossi del *Pube*, e due dita dalla linea bianca, forando la parte inferiore del mulcolo retto, l' arteria epigastrica, il fondo della vescica, e l' osso sacro nelle loro parti laterali sinistre, ed uscì lontano tre dita accanito, e al di sopra dell' ano. Le tuniche de i vasi spermatici del lato sinistro furono ferite, il che cagionò un' infiammazione nel testicolo sinistro, e nello *Scroto*. Fu notabile la lacerazione della vescica, poichè l' orina non ebbe corso più, se non per le ferite: Non v' ebbe alcun intestino, nè alcun nervo notabile offeso.

L' infermo ebbe delle grandi emorragie pel corso d' alcuni giorni, vomiti, diarrea, sogni, delirio, febbre continua, con una sete, che non poteva estinguerfi, le estremità inferiori fredde, e rigidità in tutto il suo corpo. Passò sei, o sette giorni senza evacuare, e senza poter inghiottire nè alimenti, nè rimedj; in capo a tre, o quattro giorni appena potevasi sentire il suo polso, e ad ogni momento si credeva vederlo spirare. Quelli, che intendono queste materie, agevolmente suppleranno ad alcune circostanze meno importanti, che noi omettiamo in questo racconto, per timore di renderlo troppo prolisso.

S' impiegaron tutti i rimedj tanto interni quanto esterni, che la Medicina, e la Chirurgia apprestar possan per

[1] *Hist. de l' Acad. R. des Sc. de Paris. ann. 1725.*

per un male composto di tanti mali diversi. Ciò che parve desse speranza di guarigione furono delle iniezioni, che il Sig. MARTIN Dottore in Medicina fece nella vescica. Cagionarono elleno la dissoluzione di un sangue coagulato uscito dalle ferite, che otturava l'orifizio di questo viscere, ed opponevasi all'uscita naturale dell'orina. Dopo che le ferite non furono più imbevute di questa orina travasata, cominciarono a cicatrizzarsi, ed in capo a sette settimane, l'infermo fu sano. Nella parte inferiore del ventre null'alto reslogli, che una piccola fistola, la quale appena rese due goccioline di marcia per giorno. Ei lavorò come prima. Questa relazione è stata trasmessa dal Sig. TRAYTORES uomo di un merito conosciuto, e segnata dal Sig. MARTIN, e dal Sig. DOUE' Chirurgo, i quali senza dubbio avranno avuto la parte principale in una cura sì difficile.

Quest'osservazione diede motivo al Sig. MORAND di riferirne una simile.

### OSSE R V A Z I O N E XXIII.

DETTO Sig. (1) racconta di un soldato degl'invalidi, che avendo ricevuto un'archibufata nell'*Ipogastro*, che forava il fondo della vescica, la palla vi rimase dentro; dopo la perfetta guarigione della sua ferita, ei fu incomodato da una gran difficoltà di orinare, ed essendo siringato gli fu ritrovata la pietra. Se gli fece l'operazione della litotomia al grand'apparato, e gli fu estratta una pietra assai grande, la quale aveva per nocciolo la palla entrata per la ferita del fondo della vescica, e intorno la quale si erano incrostate le materie somministrate dalle urine. L'infermo guarì benissimo.

Egli dunque ha avuto due cicatrici nella vescica. Una nel suo fondo per via del colpo d'archibugio, e l'altra nel suo collo per l'operazione della litotomia, e le due ferite si sono per conseguenza ugualmente ben chiuse. Sopra somiglianti operazioni si è intrapreso di far l'operazione della pietra coll'alto apparato, differente, come già si fa, dal grande.

OS.

(1) *Hist. de l'Acad. R. des Sc. de Paris, ann. 1725.*

## O S S E R V A Z I O N E XXIV.

**I** Sigg. PIAT, e CUSMONT Chirurghi di Chartres [1] raccontano di una fanciulla, che andando alla campagna su di una carretta, questa disgraziatamente per essa rovesciandosi, un pezzo di legno della medesima chiamato ridolo, li entrò nella testa dal lato destro, sicchè ruppe in varj pezzi l'osso chiamato *Bregma*, lacerò la dura, e la pia madre, e cagionò un' effusione della sostanza propria del cervello. La fanciulla tratta di sotto alla carretta cammìnd 15. in 20. passi, dopo di che si svenne, e perdette la cognizione per lo spazio di quattr' ore. Lo spargimento della sostanza del cervello continuò i sei primi giorni, e si fece un grandissimo scolo di sierosità. Tutte queste cose cessarono il settimo giorno, e comparve un *fungo*, che si formava nelle lacerazioni delle due membrane. Fu curata secondo le regole ordinarie. Nel corso de' primi quindici giorni, cadeva l'inferma in profondi letarghi, ed in delirj, avendo oltre a ciò una diarrea, ma poco violenta. Le durò la febbre 30. giorni, e finalmente fu perfettamente guarita da i Sigg. PIAT, e CUSMONT. Da ciò apparisce, che non vi ha terita per grande, che sia, della cui guarigione debbasi disperare.

## O S S E R V A Z I O N E XXV.

**U**N Carrozzajo (2) del Porto di Oriente, dell' età di 37. anni, stando sopra un palco in pericolo, fu rovesciato dal pelo del montone, e l' ariete gli venne a cadere sulla testa. La metà del coronale, i due parietali, e quasi tutto l' occipitale furono spogliati della coronna capellura, e del pericranio, la pelle totalmente sollevata, ed il tutto trovavasi nel cappello del ferito. Una seconda ferita larga un pollice, occupava la parte media, ed inferiore del coronale dal lato destro, e divideva la palpebra superiore in due parti con una frattura sensibi-

(1) *Hist. de l' Acad. R. des Sc. de Paris. ann. 1706.*

(2) *Hist. de l' Acad. R. des Sc. de Paris. ann. 1739.*

sibile del coronale. La parte superiore dell' osso del naso era fraccassata, e questa frattura era composta di una ferita, che penetrava fino al vomere. Non vi era altra frattura che questa, e quella del coronale. Non osservavasi alcun sintomo di effusione nel cervello. Questo accidente accadde a dì 15. Ottobre 1738.

Il Sig. Du FAY Medico dell' ospedale della compagnia dell' Indie in Oriente, e che ha scritto questa relazione al Sig. GEOFFROY ebbe cattiva opinione dello stato di questo pover' uomo. Gli fece fare primieramente de' salassi revulsivi, lo pose in una rigorosissima dieta, e lo curò non solamente secondo tutte le regole dell' arte, ma con tutta l' attenzione necessaria all' applicazione delle migliori regole.

Noi ommettiamo tutto questo racconto della cura, per dar qui solamente ciò che ebbe di più singolare.

L' infermo fu sempre senza febbre. Solamente le mutazioni dell' aria gli causavano vivi dolori, seguiti alle volte da sogni, e da inappetenza.

Dopo il nono giorno si cominciò a vedere lo stabilimento d' una buona suppurazione. Alcuni giorni dopo si vennero a separare delle piccole porzioni del pericranio. In ogni medicazione il Sig Du FAY vedeva dilatarsi sopra tutte le ossa scoperte una rugiada, che durò pel corso di due mesi.

Durante tutto il tempo che fu aperta la ferita del naso, scollò una materia pituitosa, mischiata di un sangue nericcio: ma la ferita essendo stata riunita al termine di sei settimane, il medesimo scolo prese la via del palato, e l' infermo sputò ciò, che usciva da quella ferita del naso.

A dì 14. Maggio 1749. tutto era terminato, tutte le ferite cicatrizzate. La cotenna, che era stata interamente levata ( siccome è stato detto ) venne a riprodursi da se medesima; il che sarebbe già assai da ammirare: ma quello che lo è ancora maggiormente, si è, che questa riproduzione si fece solamente dalla banda dell' occipite; le parti, che eran per ricoprirlo, si prolungavano a guisa di zampa d' oca, ed appoco appoco si stesero su i parietali, l' occipitale, ed il coronale.

## OSSERVAZIONE XXVI.

**IL** Sig. de la MORTE (1) parla di una donna molto lesta, che essendo calcata giù da un albero molto alto su i piedi, non ebbe dalla parte sinistra, che un' ecchimoma considerabile, ma il piede destro piegossi sì violentemente sul lato, che la tibia forando gl' integumenti, non solamente uscì della lunghezza di tre, o quattro dita, ma si affondò nella terra. La fibula si ruppe due dita in circa distante dall' articolazione. Un' orribile contusione, unita al cattivo stato della parte, fece prendere a' Chirurghi, chiamari in consulta, il partito per l' amputazione. Ma il Sig. de la MORTE, veggendo la malata essere nel fiore dell' età, vigorosa, e di un buon temperamento, e che il male era in una parte inferiore, credette, che sarebbe sempre a tempo di far l' amputazione, e fece alla meglio la riduzione delle parti fratturate. Egli impiegò nel tempo stesso i rimedj proprj, a calmare i dolori. Riuscì finalmente tanto bene, contro ogni apparenza, che dopo l' esfoliazione delle porzioni della tibia, e della fibula, che erano state esposte all' aria, l' inferma fu assai ben guarita per fare tutte le sue funzioni; non le restò, che dell' inflessibilità nell' articolato del piede. Non sopravvenne alcuna convulsione durante la cura.

Il morbo venereo cagiona il più delle volte la carie degli ossi, e questa carie fa de' progressi così insensibili, che ella non si manifesta, che per mezzo delle fratture, che produce alla minima occasione; il che l' è comune collo scorbutto, e col *Rachitis*. Crediamo far piacere al lettore il produrre a questo proposito l' osservazione di ILDANO indicata da BAUDA.

## OSSERVAZIONE XXVII.

**UN**' uomo in età di 60. anni fu travagliato durante due mesi verso le articolazioni dell' umero, e del gomito destro, di un dolore ottuso, prodotto da una  
got-

(1) *Traité complet de Chirurgie.*

gotta pituitosa , per la quale non fece verun rimedio , stando d' altronde benissimo di salute , si contentò solamente di tenere la parte in riposo . Volendo l' infermo mettere un guanto dalla parte malata , azione , che non richiede un grande sforzo , si ruppe trasversalmente il braccio a quattro , o cinque dita al di sotto della spalla . Si fece la riduzione , e tre giorni dopo , mentre che il Medico , ed il Chirurgo levando l' apparecchio credevano la frattura in buono stato , riconobbero un' altra frattura nel medesimo osso verso l' articolazione del gomito . Vi si pose un apparecchio convenevole ; ma il callo non formossi in due mesi di tempo , ed il malato essendo morto di un' ulcera inveterata ne' reni , si vidde nella dissezione del braccio , che l' omero era interamente cariato .

### OSSERVAZIONE XXVIII.

**I**L Sig. Du VERNEY [1] parla di un Canonico , che volendo salire sopra una scala per prendere un libro della sua biblioteca ; caddo dall' altezza di circa 12. piedi , e urtò vivamente la parte media della gamba sinistra . Fecesi un tumore lungo la parte anteriore della gamba con ecchिमoma . Il dolore fu vivissimo . I salassi , che gli furono fatti , e l' applicazione de' topici concorsero a mitigare il dolore , e a sminuire l' ecchिमoma , e il tumore . In capo ad alcuni giorni il malato si credè guarito , e camminò in conseguenza . Andandosene al letto , si accorse di un rossore alla parte anteriore di questa gamba , con anche un po di tensione . La notte fu assalito da un così eccessivo dolore , che non potè resistervi . Determinossi a far sul luogo più eminente un' incisione , che arrivava fino all' osso , dalla quale ne uscì una sierosità sanguinosa , che parve aver soggiornato fra il periostio , e l' osso . Il periostio era distaccato più di due dita trasverse . Non fu difficile di giudicare di dove provenivano quegli accidenti , poichè apparì una frattura in lungo molto distesa . Furono obbligati a prolungare l' incisione da i suoi angoli , dalla quale il malato trovossi mol-

[1] *Traité des Maladies des Os.* Tom. 1. pag. 167.

molto sollevato . Per accelerare la sua guarigione , ed evitare gli accidenti , che sono da temere in queste specie di malattie , si ebbe ricorso al trapano perforativo , ed alla esfoliazione , il che riuscì , atteso , che la fessura non penetrava sino nel canale della midolla . Il malato fu risanato in meno di due mesi .

#### OSSERVAZIONE XXIX.

**I**L Sig. DU VERNEY [1] racconta di un giovine in età di 15. a 16. anni , a cui una ruota di carretta ruppe la gamba sinistra , verso la sua parte inferiore , con ferita . La frattura fu ridotta , e si adoprò la fasciatura a diciotto capi . Questo giovine non si lamentò niente per tutto il corso della cura . Quando volle cominciare ad appoggiarsi sulla sua gamba , sentì un dolor ottuso alla parte anteriore , alquanto al di sopra della frattura , il quale si aumentò appoco appoco . Comparve in quel luogo un punto nero . Si sentì col tatto una fluttuazione , e non si indugiò punto a far un' incisione sino all' osso ; dalla quale ne uscì della marcia , ed in appresso una materia nera . Dopo avere nettato la ferita , si trovò il peristio putrefatto in quel luogo , e vi si scuoprì una fessura , della quale essendo leggiera si procurò l' esfoliazione , ed il malato non istette gran tempo a guarire .

#### OSSERVAZIONE XXX.

**U**NA guardia del Corpo [2] essendo a cavallo con molti de' suoi compagni ricevè verso la parte media della gamba un calcio dal cavallo del suo vicino . Quantunque fosse cogli stivali , sentì incontamente un dolore vivissimo , ed acutissimo , che insensibilmente dissipossi ; ma la sua gamba restò intormentita , di modo che non potè muoverla . Essendo arrivato a casa sua , fu obbligato a mettersi a letto . Il Chirurgo che lo visitò , osservò che il colpo avea fatto una forte impressione alla pelle , senza che essa avesse però mutato colore . Egli applicò i

to-

[1] *Traité des Maladies des Os. Tom. 1. pag. 168.*

[2] *Traité des Maladies des Os. de M. du Verney.*

topici convenienti. Il malato 24. ore dopo si lamentò di un gran calore alla circonferenza della parte colpita, e la pelle diventò arida, secca, di colore di limone, durissima, ed insensibile. Come essa non era più ravvivata, fu portata via come cancrena secca, ed il malato in poco tempo fu guarito.

Tre mesi dopo, essendo di servizio alla Corte, fu assalito da un dolore pungente, che impediva il suo esercizio. Ritornò a *Parigi* per farsi curare. Dopo aver provato senza successo differenti topici, andò all' Ospedale della Carità. Un Frate laico, che ivi esercitava allora la Chirurgia, dopo aver tentato diversi rimedj, gli propose di far un' incisione nel luogo del dolore, dubitando che vi fosse *Exostosis* all' osso; il che inquietò molto il malato, ma per riguardo de' vivi dolori, che ei soffriva, vi si sottopose. Fatta l' incisione, l' osso parve di un colore oscuro, un po' eminente, e con una fessura, molto apparente, lunghissima, e profondissima. Fu aggrandita la ferita da alto, e da basso; il malato fu medicato colle fila asciutte; fu tranquillo, e si addormentò. Nel levare il primo apparecchio, non fu difficile di assicurarsi della malattia. Si adoprò nel momento lo scarpello, ed il mazzapicchio per toglier via l' eccedente dell' osso, il che fu replicato una seconda volta a cagione di certi dolori, che il malato diceva sentire nel corpo dell' osso. Negli ultimi colpi di detti istrumenti, uscì dal fondo della fessura un liquore giallastro, e puzzolentissimo; il che sollevò molto il malato. Nella medicazione seguente si applicarono sulla cresta della tibia tre corone di trapano, le une accanto alle altre; si portarono via i tramezzi; e la midolla trovossi putrefatta. Il malato fu curato con molta diligenza, ed attenzione. Alcuni avevano pensato all' amputazione; nulladimeno si cercò di conservar la parte, ed il malato fu perfettamente ben guarito in capo a quattro mesi in circa.

### OSSERVAZIONE XXXI.

UNA donna in età di 45. a 50. anni fu obbligata di passare per le unzioni mercuriali. Le sopravvenne una piaga, o per dir meglio un' ulcera alla gengiva sopra uno de' lati della mascella inferiore. Il Chirurgo,  
 Tom. III. N chq

che curava questa donna si avvide, che la porzione di quest' osso era allo scoperto. Parve in appresso, che fosse separata dalla porzion sana; il che l' indusse ad aumentar l' apertura dell' ulcera, dalla quale ne cavò la metà della mascella, e per la grande attenzione, che il Chirurgo ebbe in questa cura, non restò in questa donna, dopo la guarigione, alcuna deformità, poichè alla vista il mento conservava la sua rotondità ordinaria.

## O S S E R V A Z I O N E XXXII.

**U**N Pittore cadde da un caleffe; la ruota gli passò sopra tutta l' estensione del petto dal lato dritto. Egli perdè la cognizione, e sputò del sangue nel momento, che gli uscì ugualmente dal naso. Fu portato in casa sua, e prontamente soccorso. Il Chirurgo chiese l' ajuto di un suo collega. L' esame del suo male fu fatto con attenzione, e si riconobbe, [ essendo il malato coricato sulla schiena senza potere muoversi ] che la clavicola era fratturata, come anche tutte le vere costole, e le prime delle spurie. Lo stato dell' infermo non potè permettere di far un apparecchio convenevole. Si contentarono adunque di applicar sotto le spalle un guanciale alquanto duro per allontanare il braccio dal tronco, perchè i pezzi fratturati della clavicola potessero essere mantenuti; si applicarono parecchie salviette a doppio lungo le costole dal lato sinistro, e delle compresse imbevute in un difensivo ordinario sulle costole fratturate; ed il tutto fermato per mezzo di due salviette intorno al corpo. Il malato fu salassato otto, a nove volte nello spazio di 24. ore, e con tal mezzo furono prevenuti gli accidenti. Allora si provò di farlo mettere a sedere sul letto per far la riduzione della clavicola colla fasciatura conveniente, e potere applicare l' apparecchio per le costole; ma non potè restare se non coricato sopra il dorso. Bisognò in conseguenza rimettergli il guanciale fra le due spalle, per impedire, che i pezzi della clavicola non cangiassero di luogo. Le salviette graduate applicate sopra il lato sano erano per fare un punto di appoggio, che impediva alle costole fratturate di non portarsi all' indentro per mezzo dell' apparecchio; il respiro trovavasi per intervallo molto fastidioso per via della situazione,  
in

in cui era l' infermo , e perchè il ventre avea della tensione . Si superò quest' accidente , facendo con un lenzuolo un viluppo , che si mise sotto alle ginocchia dell' infermo ; essendo esse così piegate , i muscoli del basso ventre , ma fra gli altri i muscoli retti , si rilassarono appoco appoco , il che sollevò molto l' infermo . Lo lasciarono in questa situazione pel corso di quasi tre settimane ; e quando parve che stesse meglio , lo rimisero all' ordinario , ed il malato fu risanato .

## O S S E R V A Z I O N E XXXIII.

UN particolare volle fermare i cavalli d' una carrozza . Fu rovesciato in terra , e la ruota anteriore gli passò sulla parte media della gamba , onde i due ossi furono fratturati . Siccome la gamba diventò gonfiata , ed anche si scorciò , non si manifestò nè spargimento di sangue , nè tumore ; si riconobbe solamente , che la porzione inferiore della tibia spingeva la pelle in fuori un pollice in circa . Dopo fatta la riduzione degli ossi , ed applicata la fasciatura ordinaria , non avendo considerato la frattura come complicata , il malato si lamentò di un intormentimento in tutta la gamba seguito da scuotimenti ; il che obbligò a disfare la fasciatura . Tolto affatto l' apparecchio , apparve un tumore della grossezza di una piccola noce ripieno di un fluido . Allora si ricorse alla fasciatura a diciotto capi , e si usò del vin caldo per procurarne la risoluzione . Avendo continuato questo rimedio tre , o quattro giorni senza successo , il tumore non essendo nè aumentato , nè diminuito , il parere fu di dar esito al fluido contenutovi , il che fu eseguito . Ne uscì un sangue vivissimo ; ma la gran quantità , che ne usciva , fece giudicare , che l' arteria tibiale anteriore era aperta ; il che obbligò a dilatar l' incisione , sperando di poterne fare la legatura ; ma fu impossibile . Dunque per fermare il sangue , convenne di ricoprire la ferita con delle fila bagnate nell' acquavite , il che riuscì . Si medicava il malato due volte il giorno . La suppurazione si stabilì verso il quinto giorno . Si ebbe cura di non cavare tutte le fila , perchè l' arteria venisse a consolidarsi ; ma i sughi ossi destinati alla formazione del callo non trovandosi limitati , portaronsi fino sopra il tu-

N

rac.

raccio di fila , che turava l' imboccatura del vaso , il che cagionò una considerabile infiammazione in tutta l' estensione della ferita , e la suppurazione fu intercettata . Si attribuì quest' accidente al soggiorno delle fila . Per timore di cancrena fu deciso di levar via le fila , cariche d' una materia , la quale , senza dubbio , avea fermentato pel suo soggiorno . Cessarono gli accidenti , ristabilissi la suppurazione ; e ad ogni medicazione trovaronsi i piummaccioli carichi della materia del callo ; il che cessò in pochi giorni . Vi è tutto il luogo di credere , che l' arteria si trovasse compressa , sì dalla fibula , che da i sughi ossei , che si sparvero in tutta la circonferenza della frattura per formare il callo , poichè il sangue fu fermato . Il malato fu guarito , all' eccezione di una leggiera deformità , che gli restò nel luogo della frattura .

#### OSSERVAZIONE XXXIV.

UN' uomo , in età di 20. anni in circa , ebbe una frattura all' omero distante due dita trasverse dalla sua articolazione col cubito . La porzion superiore sortiva fuori degl' integumenti più di un dito trasverso . L' olecranio era uscito fuori della sua cavità per la rottura de' ligamenti ; il raggio era separato dall' ulna . Si dilatarono gl' integumenti , si rimisero i pezzi in situazione , quanto fu possibile ; non vi fu alcuna esfoliazione , ma sopravvennero molti accidenti , che non cessarono , che per mezzo di parecchi ascessi , che formaronsi nell' articolazione . Il malato però guarì ; ma gli restò un' *Ankylotis* all' articolazione .

#### OSSERVAZIONE XXXV.

UN Vetturino ebbe il condile esterno del femore separato totalmente per lo lungo da una ruota di una carretta , con ferita , rottura de' ligamenti , e di molti tendini ; il che cagionò de' pericolosissimi accidenti , e degli ascessi . Il malato fu nulladimeno guarito , come il precedente , per mezzo de' salassi , della dieta , de' rimedj propri ad impedir la cancrena , e d' una buona

na situazione, e senza muovere le parti offese, avendo messo in uso la fasciatura a diciotto capi.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVI.

UN ragazzotto essendo incomodato da un tumore freddo al cubito, se gli tolse l' ulna tutta intera alla riserva dell' *Aposifi* inferiore, e di un pezzo dell' olecranio. Egli fu perfettamente risanato, e si è servito del cubito, e della mano malata, quasi colla medesima facilità, che dell' altra. Questa esfoliazione cominciò per una carie.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVII.

ROONHUISEN celebre Chirurgo d' Amsterdam dice, che nel 1664. una persona fu incomodata nel braccio destro da un gran dolore, che continuò quasi pel corso di tre mesi. Questo dolore si fece sentire in appresso al braccio sinistro, e nello stesso tempo fecesi uno spargimento di bile considerabilissimo, che cagionò una itterizia universale. Dopo alcuni giorni venne a formarsi un tumore alla testa, immediatamente al di sopra della sutura *sagittale*, presso al luogo, in cui si unisce colla *lamdoide*. Il tumore era indolente, e grosso quanto un uovo. Un Medico ordinò alcuni rimedj, e dubitando, che esso potesse essere cagionato da qualche lue venerea, fece fare al malato l' unzione mercuriale, che diminuì il volume del tumore; ma poco tempo dopo si aumentò molto il tumore, e diventò dolorosissimo. Il dolore non cessò, se non dopo averne fatta l' apertura, la quale diede esito ad una sierosità molto acrimoniosa. L' ulcera, che ne risultò, essendo quasi guarita, si rinnovò il dolore, il che obbligò i Chirurghi a riaprire il tumore; ma il malato n' ebbe poco sollievo, perchè l' umore corrosivo avea già cariato l' osso.

Veggendosi il malato in uno stato così deplorabile, fece chiamare i più abili Medici, e Chirurghi della Città, i quali conclusero, che egli non potea guarire, che per mezzo di una seconda salivazione, ma non vi si potè risolvere. Visse vicino a due anni in quel tristo stato; e siccome il dolore cresceva di giorno in giorno, furò.

furono costretti ad aprire ancora un' altra volta il tumore ; ma la carie essendosi inoltrata fino alla tavola inferiore , si giudicò , che l' unico mezzo per procurare la guarigione , era di portar via l'osso cariato per mezzo del trapano , perchè la sanie corrosiva , che scolava , cadeva sulla *Dura - Madre* ; la qual cosa cagionava de' dolori insossribili . L' infermo avendo acconsentito all' operazione , il pezzo cariato fu tolto via , ed il malato si trovò molto sollevato , e senza dolore durante tre settimane ; ma nel momento , che la piaga cominciò a serrarsi , si rinnovò il dolore così forte , come avanti , il che obbligò il Chirurgo a raschiare molto avanti l'osso tutto in torno al foro del trapano , ma senza procurargli sollievo alcuno ; di modo che fu costretto di scoprire una maggior porzione dell'osso , per riconoscere il progresso della carie . Il giorno seguente trovossi , che ella si inoltrava più avanti della larghezza di cinque a sei linee . Si fece fare una corona di trapano capace di contenere tutto l'osso cariato , ma siccome non si potea portar via il pezzo dell'osso , che era stato segato , imperciocchè il foro del primo trapano era ripieno di carni , che erano unite a questo pezzo , servironsi di tanaglie incisive per tagliare , e toglier via l'osso a pezzi ; dopo di ciò il malato fu perfettamente guarito .

#### OSSERVAZIONE XXXVIII.

UN giovine (1), in età di 26. anni , ebbe l'osso parietale destro forato nel mezzo da una freccia armata di un ferro molto acuto , e che avendo voluto ritrarla , disgraziatamente il ferro restò nella ferita , il legno essendosi rotto vicino ad essa . Malgrado questo accidente egli fu assai tranquillo fino al settimo giorno ; ma dopo aver fatta un' incisione , si scoprì un foro circolare nell'osso parietale , egualmente la punta del ferro . Se gli applicò due volte il trapano , si portò via una considerabile porzione del cranio , e si separò dalla *Dura - Madre* la parte contigua all' apertura fatta dal ferro . Ma egli fu impossibile di estrarre il ferro . Il la-

to

(1) *Journal des Sçavans pour le mois d' Avril de l' Année 1735.*

to opposto a quello della ferita diventò paralitico, sopravvenne una abbondante suppurazione, e apparve sopra il cervello un gran numero d'escrescenze fungose. In capo a tre mesi, si sentì colla tenta il ferro nella sostanza del cervello: Il Chirurgo fece tutto il suo possibile per estrarlo; ma il ferito cadde nelle convulsioni, le quali gl'impedirono di continuare l'operazione. Verso la fine del quarto mese il ferro da se si presentò all'orifizio della ferita, d'onde s'estrasse colle mollette, e questa ferita, in apparenza sì pericolosa, ventri giorni dopo cicatrizzossi. Vedesi da un gran numero d'altre osservazioni riferite da diversi Autori, che egli è qualche volta a proposito il lasciare nelle ferite i corpi estranei, che ivi sono intrigati, poichè la natura stessa viene in appresso a liberarsene per mezzo de' suoi propri sforzi.

## O S S E R V A Z I O N E XXXIX.

**P**AREO [1] racconta la storia di un uomo, che ricevè una stoccata alla gola, che gli tagliò una parte della *Trachea*, ed una delle vene jugulari, donde ne sopravvenne un'abbondante emorragia, e un fischio cagionato dall'aria, che usciva per la ferita; si riunirono le labbra per mezzo della sutura, e vi si applicarono sopra de' rimedj astringenti. Poco tempo dopo, l'aria essendosi insinuata nella membrana cellulare, cagionò un'estraordinaria distensione, non solamente nelle parti contigue alla ferita, ma ancora per tutto il corpo. L'infermo avea il viso così gonfiato, che non gli si scorgeva nè il suo naso, nè i suoi occhj. Disperavasi interamente della sua guarigione; quando un Chirurgo molto abile nella sua professione, avvisossi di fare parecchie scarificazioni sulla pelle, colla intenzione di dar esito all'aria; il che ebbe tanto successo, che il malato ricuperò la salute, con grande stupore di tutti quelli, che erano stati testimoni della sua situazione.

## OSSERVAZIONE XL.

UN uomo ricevè un sì violento calcio d' un mulo , che avea l' unghia ferrata , onde la fronte ebbe frattura , e sfondamento ; gli si levò un pezzo del cranio di figura rotonda col trapano , affin di potere con più agevolezza sollevare , e toglier via l' osso fratturato , e sfondato . Siccome la frattura stendevasi dal mezzo della fronte fino al piccolo angolo dell' occhio , PAREO , che curava l' infermo , non volle arrischiarsi a portar via una sì considerabile porzion d' osso ; ma contentossi di alzar l' osso di maniera , che non premesse più la dura - madre , ed il malato ebbe la fortuna di esser risanato ; e il frammento d' osso , che era separato affatto dal resto del cranio , ma che si atteneva ancora al pericranio , si riattaccò interamente .

## OSSERVAZIONE XLI.

PAREO dice di un Capitano , che ebbe una porzion dell' osso frontale , di circa tre dita di lunghezza , e altrettanto di larghezza , tagliata da una sciabolata : di modo che si vedeva tutta scoperta la dura - madre . Questo largo frammento d' osso , che teneva ancora al pericranio , pendente cogl' integumenti sul viso del ferito , formava uno spettacolo orribile . PAREO avea subito pensato di tagliare affatto e l' osso , e gl' integumenti ; ma temendo , che fosse un troppo esporre la dura - madre , con lasciarla così scoperta , e senza ricovero , dopo aver ripulito tutto il sangue , che copriva la dura - madre , vi applicò sopra l' osso cogl' integumenti , e mantenne il tutto per mezzo di tre punti di sutura , che egli fece a differenti luoghi , affinchè restasse nel suo sito . Questo metodo riuscì , e per ciò si può dire , che non bisogna mai disperare di nulla in simil caso , dopo che una porzion sì considerabile d' osso , che era interamente tagliata , ha potuto riattaccarsi , e ciò in un uomo , che avea già ricevute molte altre ferite . La natura sa sovente provvedere essa stessa alla sua propria sicurezza ne' casi i più pericolosi , come lo dimostra la seguente osservazione .

OS.

## OSSERVAZIONE XLII.

UNA ragazza di 9. a 10. anni ricevè diciotto stoccate al capo, senza contare molte altre alle braccia, e al corpo. Tutte quelle ferite della testa offesero il cranio, e qualcheduna portò via alcune porzioni dell'osso fino al *Diploe*, ed alcune altre tutta la grossezza del cranio fin alla dura-madre. Questa testa sinuzzata era fasciata come conveniva, e le si levavano le fascie ogni due giorni. Ogni volta che si medicava, se ne estraevano delle scheggie, che si erano attaccate alle fila, e si erano separate da se senza cagionare alcun nuovo accidente, ed i frammenti, che si attenevano ancora al pericranio, rigermogliarono, e riempirono le ferite dove il cranio era stato tagliato; di modo tale, che in cinque settimane questa ragazza, che avea ricevute tante ferite, fu di tutte risanata. Ora vi è da considerare in questo caso, che non si fece monificazione artificiale; imperocchè tutto quello, che non potea riattaccarsi, si separò per mezzo della spontanea suppurazione.

## OSSERVAZIONE XLIII.

PARRO [1] parla di un giovane, che battè sì fortemente il capo sul palco, che ad un tratto perdè l'uso di tutti i sensi, dopo di ciò sopravvennero la febbre, il delirio, ed altri terribili accidenti. Il settimo giorno sudò abbondantemente, e starnutò, e gli uscì per la bocca, e per le narici una gran quantità di marcia; per mezzo di che tutti i sintomi si calmarono, e l'infermo fu guarito.

## OSSERVAZIONE XLIV.

ILDANO [2] racconta il caso di un giovine in età di 14. anni, che giuocando ricevè un colpo di una palla di le-

(1) *Lib. x. Cap. xxiii.*

(2) *Hild. Obs. Chirurg. Cent. iv. Obs. 111.*

legno alla parte sinistra dell' osso coronale . Cascò in terra dal colpo , e vomitò della bile , e continuò in seguito a vomitare tutto quel che beveva , e mangiava . Due mesi dopo , siccome era sempre in cattivo stato , se gli fece una perforazione al cranio , dalla quale uscì con veemenza una considerabile quantità di marcia . Dopo ciò la sostanza del cervello non essendo più ritenuta cominciò a sporger in fuori : per questo fu d' uopo tagliarla col mezzo di un filo , che si legò intorno di essa . Immediatamente dopo apparì di nuovo un altro fungo simile al primo uscendo fuori tre dita , che tagliossi col medesimo metodo . Si reiterò questa divisione tante volte , che si era portata via una quantità di questi funghi , grossa in tutto quanto il pugno . Nulladimeno l' infermo fu perfettamente sanato .

#### OSSERVAZIONE XLV.

**F**ABRIZIO ILDANO [1] racconta, che un uomo di circa 40. anni avendo ricevuto all' osso parietale sinistro un colpo d' una palla di ferro, che pesava più di una libbra , e mezza , ne fu il cranio considerabilmente sfondato , e fratturato . Egli fu atterrito dal colpo , e restò disteso in terra come morto . Non solamente ne perdè la favella , la vista , e l' udito ; ma ancora il lato del suo corpo opposto a quello della testa , che avea ricevuto il colpo , fu assalito da paralisi . Contuttociò rialzandosi la parte del cranio , che era stata sfondata , ed impiegando degli altri rimedj convenevoli , restò perfettamente guarito .

#### OSSERVAZIONE XLVI.

**I**L medesimo Autore [2] parla di una donna , che ricevè un colpo all' osso parietale destro , il quale vi fece una contusione accompagnata da frattura , e da sfondamento dell' osso . Subito dopo ella vomitò un umore bilioso assieme con quello , che avea mangiato , che non  
era

(1) *Obs. Chirurg. Cent. II. Obs. III.*

(2) *Cent. I. Obs. XI.*

era ancora digerito. Il lato sinistro diventò paralitico, e il destro ebbe de' moti convulsivi. Eppure guarì, quantunque una gran quantità della sostanza del cervello fosse uscita fuori dalla ferita.

## O S S E R V A Z I O N E XLVII.

**R**UISCHIO [1] racconta un esempio d'una cura ardita di un canchero alla lingua, donde dopo l'estirpazione di esso, si applicò il cauterio attuale per distruggere le radici, che potevano essere rimaste. Una donna aveva da lungo tempo un tumore duro, e maligno nella lingua, il quale dopo molte incisioni, era sempre ritornato. RUISCHIO, ed un Chirurgo molto abile, col quale ei consultò sopra questa malattia, deliberarono, che non vi era altro mezzo, che di estirpare da capo il canchero, e di applicare in seguito sulla parte il cauterio attuale. L'inferma, che era una donna cetaggiosa, si sottopose a questa crudele operazione, e la soffrì quasi senza dolersi, quantunque se le rimettesse il cauterio più volte, e che se le applicasse con forza. Quando le escare furono cadute, la piaga si cicatrizzò, e l'inferma fu interamente risanata.

## O S S E R V A Z I O N E XLVIII.

**I**L Sig. de la MORTE [2] parla di un Capitano, che ebbe il braccio talmente fracassato fino all'omero, che non vi era più nè calore, nè senso nella parte. Lo sfacelo si era già inoltrato fino al di sopra dell'articolazione dell'omero, e tutto il braccio esalava un odore cadaverico. Contuttociò il Chirurgo incoraggiato dal malato, e pieno di fiducia nel suo sapere, preferì un rimedio dubbioso ad una morte certa, e gli amputò il braccio immediatamente al di sotto dell'articolazione. Ajutando indi la natura con de' rimedj convenienti, separò ciò che rimaneva di parti corrotte, e rese la salute all'infermo in capo a tre mesi.

OS.

(1) *Observ. Anatom. Chirurg.*

(2) *Traité Complet. de Chirurg.*

## O S S E R V A Z I O N E XLIX.

UN Soldato del reggimento di Diesbach Svizzero, ricevè all' assedio di Mons un' archibugiata sopra i seni sopracciliari, al di sopra della radice del naso, che fracassava la parte anteriore di queste cavità, la parte superiore degli ossi del naso, ed anche una porzione dell' orbita dal lato destro al luogo del gran angolo. Il ferito cadde in terra, vomitò, poco tempo dopo perdè la cognizione, e gli uscì del sangue dal naso. Il Sig. POMEYES avendo fatto un' incisione in croce, e avendo distaccato il pericranio, levò via assai facilmente la porzion d' osso, che forma la parete anteriore de' seni sopracciliari, non lasciando che gli ossi, che formano la parte superiore del naso, e la porzion dell' orbita, che era vacillante; la parte posteriore de' seni non era fratturata. La ferita fu subito medicata colle fila asciutte; il delirio essendo sopravvenuto accompagnato da letargo, il ferito fu in conseguenza salassato otto volte dal piede, e gli accidenti cessarono. Si medicò in appresso la ferita col balsamo del *Fioravanti*, e con de' piumaccioli leggermente ricoperti di balsamo d' *Asceo*. Le porzioni vacillanti si saldaron, e la cura fu terminata nello spazio di due mesi, e mezzo.

*T R A T T A T O*  
*D E L L E*  
*F A S C I A T U R E .*



*All' Eccellentiss. Signore*

**BARTOLOMEO MESNY**

*Dottore di Medicina, Medico della Casa di S. M. I., Direttore degli Ospedali Militari, e delle Farmacie in Toscana, associato all' Accademia Reale di Nancy, all' Accademia Etrusca di Cortona, ec. ec. ec.*

**S I G N O R E .**



*I dà oggi al Pubblico questo Trattato delle Fasciature, e a V. S. Eccellentiss. a cui lo debbo, poichè fu ella, che ne diede la prima idea, quando portossi in Livorno, circa un anno fa; facendomi osservare l' utilità, che ne ritrarrebbero i Giovani Chirurghi, che non sono ancora sufficientemente versati in una materia sì necessaria; poichè non vi è quasi Operazione di Chirurgia, che non abbia bisogno dell' applicazione di una fasciatura. Che un Chirurgo faccia un' Operazione con tutta la destrezza possibile, e*  
*ch*

*ch' egli manchi in appresso all' applicazione della fasciatura, tutti i suoi sforzi per pervenire alla guarigione del malato saranno inutili, poichè il successo, che deve aspettarsi dalla sua operazione, ne dipende.*

*Che posso io far di meglio, Signore, che di offerirle un' Opera, in cui Ella ha tanta parte? La riceva, ne la prego, Signore, come un pegno della mia viva riconoscenza, per tanta bontà, che Ella ha avuto per me, da tanti anni, che ho l' onor di conoscerla. Aggiungerò questa obbligazione a tante altre, che già le professo, e delle quali ne conserverò perpetua la memoria. Compiacciassi, Signore, accettare questo piccolo frutto del mio lavoro, come un debole tributo del profondo rispetto, col quale mi protesto*

*Di V. S. Eccellentiss.*

*Umiliss. e Devotiss. Servitore*  
Pietro Paolo Tanaron.

TRAT.

# T R A T T A T O

## D E L L E F A S C I A T U R E

### I N G E N E R A L E .

**S**i intendono per fasciature, delle circonvoluzioni di fascie, fatte con metodo, e destrezza intorno a qualche parte del corpo, all' occasione di qualche Operazione, di una ferita, di una frattura, di una lussazione, ec. per contenere le compresse, e i medicamenti, che vi si applicano sopra, o per mantenere quella tal parte nel suo sito naturale.

Se l' autorità d' **IPPOCRATE**, di **GALENO**, e di molti altri Autori non bastasse per provare l' utilità, ed anche la necessità delle fasciature, non vi vorrebbe, per ravvedersi dell' errore, in cui si fosse su tal proposito, che far attenzione, che non v' è quasi Operazione in Chirurgia, che non abbia bisogno di esse. Faccia pure il Chirurgo un' operazione con tutta la diligenza, e la destrezza possibile, e manchi poi nell' applicar la fasciatura, tutti i suoi sforzi saranno inutili, trattandosi di amputazioni, di ferite, di fratture, di lussazioni, ec. Spesso si osserva dopo aver fatto la riduzione delle parti nelle fratture, e nelle lussazioni, che la cura dipende più dall' applicazione della fasciatura, che dall' uso de' medicamenti; nell' emorragie anche le più grandi la conveniente applicazione delle compresse, e delle fasciature è il più pronto, e il più efficace rimedio, che l' arte abbia, il che accorderanno tutti i Periti di Chirurgia.

Non senza ragione adunque si mette nel numero delle qualità di un buon Chirurgo quella di saper fare, ed applicare dovutamente le fasciature; non essendovi cosa più capace di conciliargli la stima, degli assistenti, e la fiducia del malato, i quali giudicano della sua abilità

*Tam. III.*

O

lità

lità dalla destrezza, che ei mostra nell' applicare una fasciatura.

Le fasciature sono semplici, o composte. La fasciatura semplice è uguale, o ineguale. L' uguale chiamasi *Circolare*, perchè la fascia si avvolge ugualmente sulle medesime circolazioni senza scoprirle; si applica questa nelle fratture semplici per istringere ugualmente. La fasciatura ineguale è quella, in cui le circonvoluzioni sono obbligue; ve ne sono di quattro specie; cioè, la *Doiabra*, o sia *Fascia parumper obliqua*, cioè fasciatura alquanto obliqua, chiamata da' Francesi *Dobaire*, e da' Latini *Ascia*, asce, a ragione delle sue circonvoluzioni, che rappresentano l' obbliguità del tagliente di quest' istrumento, che si fanno intorno ad una parte applicando la fascia a schiancio, di modo che ogni giro della fascia cuopra i due terzi di quello, che è immediatamente al di sotto a guisa di vite. La seconda specie si chiama *Ottusa*, nella quale i due terzi delle circonvoluzioni della fascia sono scoperte. La terza si nomina *Serpeggiante*, nella quale le circonvoluzioni della fascia lasciano qualche piccola distanza fra loro a guisa di spirale intorno alla parte. La quarta specie è chiamata la *Rovesciata*, per essere obbligati di rovesciare la fascia, quando la parte non è di una uguale grossezza per tutto, come in quelle, che si applicano sulle gambe, o altre parti del corpo, di grossezza ineguale, perchè la fascia non lasci vacuo.

Le fasciature composte son quelle, che si fanno con più fascie cucite insieme, o con una sola fascia tagliata in più capi. Questa si mette ordinariamente in uso nelle fratture della mascella, delle clavicole, e della rotola del ginocchio. Di tale specie son quelle da quattro capi, alle quali si dà il nome di *Fromba*; la fasciatura a diciotto capi, la quale serve per le fratture complicate. Le fasciature prendono ancora il nome di *Contentive*, quando non servono, che a contenere i medicamenti applicati sulla parte malata; di *Unitive*, o di *Incarnative*, quando si fanno, per riunire le ferite semplici; e di *Divisive*, quando se ne vuole impedire la riunione. Finalmente ve ne sono, che portano il nome di quelli, che le hanno inventate, come il *Fesso d' Amintas*, il *Berretto d' Ippocrate ec.*, o delle parti, alle quali si applicano, come al *Copri - Capo*, l' *Occchio semplice*, e *doppio ec.*, o della  
figu-

figura , che rappresentano , come la cappellina , la fromba , ec.

Le fasciature non devono essere nè troppo lente , nè troppo strette ; ma devono avere una basilevole tensione ; perchè essendo troppo lente , non sono di verun uso nelle fratture , o nell' emorragie violenti ; ed essendo troppo strette causano de' violenti dolori , de' tumori , delle infiammazioni , delle cancrene , ed anche lo sfacelo della parte . E' facile conoscere se la fasciatura è stretta abbastanza , poichè ciò presto si vede col cacciarvi sotto le dita , dall' effetto , che fa alla sensazione del malato , e dall' apparenza della parte . Se il malato non si lamenta nè di gonfiezza , nè di dolore alcuno è un segno , che la fasciatura è troppo lenta ; al contrario se la parte offesa si gonfia troppo , e che vi si sente un gran dolore , questo è un segno , che ella è troppo stretta .

Abbiamo già indicati alcuni usi generali delle fasciature ; ma acciocchè si intenda meglio questa materia , daremo la spiegazione di alcuni de' loro usi particolari . Diciamo dunque in primo luogo , che le fasciature sole terminano qualche volta la cura , e che in questo modo suppliscono al difetto de' medicamenti nelle fratture , nelle lussazioni , e nelle grandi emorragie . Si usano ancora spesse volte per contenere i rimedi , ed il restante dell' apparecchio sulle parti affette . Si adoprano talvolta per ripercuotere le gonfiezze de' piedi , e chiamansi allora *Fasciature Espulsive* : il modo di applicarle a tal effetto è di principiare dall' estremità , e di ascendere gradatamente ad ogni giro . L' uso di queste fasciature espulsive è non solo nella gonfiezza delle gambe ; ma ancora per evacuare le materie nocive delle fistole .

### *Delle Fasciature per la Testa.*

#### *Del piccolo Copri-Capo in triangolo per tutte le ferite della Testa.*

Per fare questa fasciatura si prende un fazzoletto , o una salvietta , o tal altro pezzo di panno lino , che si piega in triangolo , e di cui si applica il mezzo sulla fronte .

te . Si attaccano in appresso i due capi dietro la testa , come si pratica comunemente ne' gran calori dell' estate; quanto n'è facile l'applicazione , numerosi altrettanto ne sono gli usi . Questa fasciatura è propria non solamente per le ferite ; ma ancora per la maggior parte delle malattie della testa . Serve parimente per tenere stabili gli apparecchi , che si mettono sopra gli occhi . Se per caso il nodo incomodasse il malato , si attaccherà dietro la testa la fasciatura con degli spilli .

### *Del Gran Copri - Capo .*

La maggiore di tutte le fasciature della testa è il *Gran Copri - Capo* , si applica ordinariamente dopo l'operazione del trapano , e per tutte le gran ferite del capo .

Per fare una tal fasciatura si prende una salvietta più lunga , che larga , ripiegata in mezzo , in maniera , che avanzi più da una parte , che dall' altra due buoni pollici ; poi vi si fa un' altra piega , tanto però che serva a lasciare un segno della metà della salvietta ; si applica in seguito sulla testa tenendola con ambedue le mani , restando i pollici di sopra , e le altre dita di sotto , ed osservando , che la metà della salvietta segnata dalla piega fattavi , resti dirimpetto alla dirittura del naso . Si fanno in oltre tener da un astante i due capi esterni della salvietta , o pure si fermano per un momento con uno spillo sotto il mento . Dopo di questo si piglia l' estremità della salvietta , che avanza di due buoni pollici , e che deve restare sulla fronte , e si ripiega sull' altra estremità , tirando insensibilmente ognuno dalla sua parte i due capi verso la nuca , dove si fermeranno con uno spillo , finchè cogli altri due capi dell' altra estremità , che si facean tener dall' astante , o che si eran fermati sotto il mento , se ne fa il nodo chiamato il *Nodo della Ciovatta* . Si alzano dipoi le punte della salvietta , che son pendenti dalle parti , e che chiamansi *Zampe d' Oca* , per attaccarle in cima alla testa dirimpetto al naso con degli spilli . Si ripiega ancora quella porzione della salvietta , che resta dietro alla nuca , per fermare ancor essa con degli spilli sopra la testa ; e quindi si mette

te

te al di sopra un berretto assai ampio, per contenere tutto l'apparecchio. Questa fasciatura, quando è ben fatta, sta come incollata sulla testa, e la difende dalle ingiurie dell'aria esterna; il che la rende oggi giorno di un uso rilevante.

*La Cappellina a due capi, o sia il Berretto di Ippocrate per gli scostamenti delle suture del Cranio, e per l'Idrocefalo.*

Per fare questa fasciatura si prende una fascia larga tre dita, e lunga quattordici braccia, che si avvolge in due capi; si applica nel mezzo della fronte, e poi si portano da ciascun lato i due capi fino alla nuca, facendoli passare l'uno sull'altro, e quello, che rimane sotto si rivolta subito per farlo passare sulla testa lungo la sutura sagittale, fino alla radice del naso, fermandosi un momento, finchè se gli faccia passar sopra l'altro capo, che si è fatto girare intorno alla testa, e si fa arrivare fino all'orecchio opposto; allora l'altro capo, che si trova alla radice del naso si rivolta nuovamente, e si fa passare un'altra volta sulla sutura sagittale, sovrappo-  
nendolo alquanto sopra la parte della fascia, che si trova sulla detta sutura, conducendolo fino alla nuca, per fermarlo di nuovo coll'altro capo, che si fa girare intorno alla testa, e così si continua alternativamente sovrappo-  
nendo sulla testa la fascia a destra, ed a sinistra, finchè resti coperto tutto il cranio, ed il restante della fascia che avanza, si impiega con avvolgerlo intorno alla testa.

*La Fromba a quattro capi per le Ferite Semplici della Testa.*

Per fare questa fasciatura si prende un pezzo di panno lino lungo un braccio in circa, e largo sei, o otto dita trasverse, che si fende dalle due estremità in maniera, che il panno lino, che resta intiero nel mezzo, non ecceda la larghezza di un mezzo piede. Rignardo alla sua applicazione, essa è differente, secondo la situazione

delle ferite, perchè si adopra sopra tutte le ferite semplici del capo; bisogna, che il mezzo della fromba trovi sempre sul mezzo della ferita. Se per esempio si vuol applicarla sopra una ferita situata sulla fronte, si pone il mezzo della fromba sopra la parte offesa, e si fa tenere da un assistente, per tema che sdruciolli, e si conducono di poi i due capi inferiori intorno la testa, intrigandoli l'uno sull'altro, e i due altri capi vanno medesimamente, e obbliquamente alla nuca. Per una ferita sulle vertebre, si pone la fromba sopra il male, si conducono i due capi posteriori sotto il mento, per attaccarveli, si prendono in appresso i due capi anteriori, e si conducono obbliquamente alla nuca, incrociandoli, e si attaccano in appresso sulle parti laterali della testa. Se la ferita sia situata sull'occipitale, si pone la fromba sopra il male; si conducono i due capi superiori intorno la fronte, e i due capi inferiori, sulla parte superiore del coronale per attaccarveli con degli spilli. Per la ferita della nuca, si applica la fromba di modo che il mezzo di essa si trovi sempre sul male, i capi superiori montino obbliquamente intorno la testa, e vengano ad attaccarsi sulla fronte, e i due capi inferiori siano condotti intorno al collo per attaccarli sotto il mento.

*Della fasciatura di Galeno, o sia de' Poveri,  
chiamata la fromba a sei capi per tutte le  
malattie della testa.*

Per fare questa fasciatura si prende un pezzo di panno lino lungo più di un braccio, e largo dodici, o quindici dita traverse, che si taglia a sei capi, cioè, tre per parte. Si comincia per applicarla sulla testa in maniera che l'orlo anteriore della fromba venga sopra i cigli, e vi si fa tener da un assistente. Si prendono in appresso i due capi del mezzo per attaccargli sotto il mento, indi si prendono i due capi anteriori, e si conducono dal davanti all'indietro intorno la testa, passandoli per di sotto i capi posteriori fino all'occipitale, e dove si attaccano, intrigandoli l'uno sull'altro. Indi si prendono i due capi posteriori, e si conducono sulla fronte, intrigandoli l'uno sull'altro sopra gli orli de' cigli, e vi si attaccano. Dopo di  
ciò

ciò si prendono i due capi, che si erano attaccati sotto il mento per rivolgerli sulla testa, nell' istessa maniera, che fanno le donne, quando rilevano le barbe delle loro cuffie. Questa fasciatura è molto atta per mantenere gli apparecchi sopra qualsivoglia parte della testa, e vi si applica così bene, che non convien rigettarla.

*Della fasciatura unitiva, o incarnativa a due capi, per riunire tutte le ferite longitudinali, ed oblique, che possono succedere sopra tutte le parti del corpo.*

Per fare questa fasciatura si prende una fascia della lunghezza, e larghezza, che sarà proporzionata alla grandezza della parte, e della ferita; questa è ordinariamente lunga otto piedi in circa, e larga due pollici. Bisogna, che detta fascia sia tagliata nel mezzo della lunghezza di tre, o quattro dita trasverse, e che sia ruotolata a due capi. Si comincia con applicare speditamente [ dopo medicata la ferita con de' balsami, e de' cerotti convenienti ] due piccole compresse alquanto più lunghe della ferita, ad ogni lato di essa, ed in appresso si pone la fasciatura alla parte opposta alla ferita, per esempio, se la ferita si trova alla fronte, bisogna applicare la fasciatura alla nuca, e mettere la fessura della fascia sulla ferita, per passarvi dentro uno de' capi; dopo di che si stringono tutt' e due i capi della fascia alzandoli alquanto, per avvicinar le labbra della ferita l' una dall' altra, e si conducono intorno la testa, o altre parti dove si trova la ferita. Se la ferita fosse così lunga, che non si trovasse coperta dal primo giro della fascia, bisognerebbe fare una seconda fessura alla fascia per passarvi dentro una seconda volta uno de' capi della fascia, e si finisce poi la fasciatura facendo de' giri circolari intorno alla parte malata uno in su, e l' altro in giù, e se ne sermano le loro estremità con degli spilli, o alcuni punti di ago. Questa fasciatura contribuisce moltissimo alla consolidazione della ferita, e all' uniformità della cicatrice. Essa non deve esser levata, che in capo a sei, o otto giorni, se qualche accidente straordinario non obbligasse a levarla più presto.

*Della fasciatura chiamata l' Occhio semplice per le malattie , che attaccano un sol occhio .*

Per fare questa fasciatura si prende una fascia lunga sei braccia, e larga un pollice, e mezzo avvoltata a un capo, tenendolo colla mano opposta all' occhio infermo, e l' estremità della fascia toll' altra mano. Si applica la fascia sulla fronte, e si conduce dietro la testa, per fermare l' estremità della fascia, che si trova sulla nuca, e venire di poi colla fascia dalla parte dell' occhio infermo, passarla sull' angolo della mascella inferiore, salendo poi obliquamente lungo la guancia per arrivare alla radice del naso; ed indi sul parietale opposto, per discendere all' occipitale, e così si continua a voltarla, per ritornare nell' istessa maniera sull' angolo della mascella inferiore, ma un poco più alto della prima volta, soprapponendola in maniera, che vada in angolo fino alla radice del naso; dopo aver fatto il medesimo giro tre volte di seguito, la quarta si volterà in giro intorno la testa per terminar la fascia. Questa fasciatura si fa ancora con un fazzoletto piegato in triangolo.

*Della fasciatura chiamata l' Occhio doppio a un capo per le malattie d' ambedue gli occhi .*

Questa fasciatura si fa anch' essa con un fazzoletto piegato in triangolo, o con una fascia lunga otto braccia, e larga tre dita traverse avvoltata a un capo. Si principia ad applicare la fascia sulla fronte, e si conduce intorno la testa, per fermare l' estremità della fascia, che si trova alla nuca; indi si viene colla fascia a passare sotto l' angolo della mascella inferiore, salendo obliquamente sulla parte inferiore degli ossi del naso, e indi si passa sull' occhio dall' altro lato, e indi sulla parte media del parietale, e si va intorno la testa per discendere, e incrociare sulla parte inferiore degli ossi del naso, scendendo poi lungo l' altra guancia, si viene a passare per di sotto l' angolo della mascella per andare alla nuca. Dopo di che si ritorna colla fascia dall' altro  
la-

lato per davanti , e si sale lungo la guancia , formando-  
vi una dolabra . Si continua sempre lo stesso ; seguitando  
la medesima strada , che si è detto , sino che si sieno for-  
mate tre dolabre salendo lungo le guancie , e tre incro-  
cchiate sulla parte inferiore degli ossi del naso ; fat-  
to ciò si sale obliquamente per finire il restante della fascia  
intorno la testa con de' giri circolari .

*Del Monocolo per la Fistola lacrimale , e per  
tutte le malattie degli occhi .*

Questa fasciatura è di due sorte , una chiamata *Mo-  
nocolo* , o piuttosto *Monofialmo* , e l' altra nominata *Binoco-  
lo* . Il *Monocolo* si fa con una fascia dieci braccia lun-  
ga , e larga tre dita avvoltata a un capo . Si lascia cader  
sul petto dalla parte infera l' estremità della fascia alla  
lunghezza di un braccio , e mezzo in circa , tenendola fer-  
ma sulla base della mascella inferiore con una mano ,  
mentre che col' altra si monta verso il grand' angolo dell'  
occhio infero per dare di volta alla testa , e scendere  
obliquamente alla nuca , passare intorno al collo , e ve-  
nire sull' angolo della mascella inferiore dalla parte in-  
ferma . Allora si ferma un momento in tanto , che si ro-  
vescia sulla prima voltata fatta sulla guancia , l' estre-  
mità della fascia , che pendeva sul petto . Si continua di poi  
a montar sulla guancia , e sul parietale opposto , per ve-  
nire a soprapporla tre volte , come si fece nella fasciatura  
dell' *Occhio semplice* , e si termina la fascia con delle  
voltate in giro intorno alla testa , e si ferma con de' pun-  
ti d' ago . Un fazzoletto , o una salvietta possono servire  
a quest' uso al par del *Monocolo* .

*Del Binocolo .*

Questa fasciatura inantiene l' apparecchio sopra am-  
bidue gli occhi ; per farla si prende una fascia lunga ot-  
to braccia , e larga due , o tre pollici in circa ; e si ap-  
plica differentemente secondo , che a uno , o due capi . Se  
la fascia è avvoltata a un capo , se ne pone l' estremità  
sull' occipitale , e si conduce il capo della fascia obliqua-  
men-

mente sull' orecchio , e sull' occhio , e si ritorna al luogo dove si è principiato , per ascendere sulla fronte , e discendere sull' occhio , incrociando la fascia sulla radice del naso in forma di X , si continua di nuovo seguendo sempre la medesima strada , fin tanto che si siano fatti tre giri circolari obliqui , o siano dolabre , salendo lungo alle guancie , e tre incrociature sulla radice del naso ; dopo ciò fatto si monta obbliquamente intorno alla testa per impiegar il rimanente della fascia facendovi de' giri circolari .

Quando la fascia è avvoltata a due capi , se ne pone il mezzo sull' occipitale , si fanno de' giri circolari , e vi si incrociano sul naso in forma di X ; poscia cambiando capi , si fan ritornar per di sopra le tempie sull' occipitale , ove di nuovo si cambiano , e incrociano per farli ritornar sull' orecchie , sugli occhj , e sulla fronte . Dopo aver fatto così tre giri circolari , si conduce ciò che resta per direzioni circolari , per tener tanto più ferma la fasciatura . Si può supplire a questa fasciatura con una salvietta , quando anche sono tutt' e due gli occhj malati , annodando i capi sull' occipitale , o incrociandoveli per venir a fermarli presso le tempie .

*Della Fromba pel Naso , per le fratture del Naso , o per contenere l' apparecchio nelle Ferite di questa parte , e dopo l' estirpazione del Polipo .*

Per fare questa fasciatura si prende una fascia lunga quattro braccia , e larga due , o tre dita in circa , la quale si fende ad ogni estremità , lasciando due dita traverse della tela intiera . Si fa nel mezzo delle due fessure una piccola apertura , per passarvi la punta del naso . Si pone il mezzo della fascia sulla punta del naso , e si conducono alquanto obbliquamente i due capi superiori della fascia da ciascun lato sulla nuca , dove dopo averli incrociati , si conducono circolarmente attorno la fronte , dove li si fermano con un nodo , o con degli spilli al berrettino del malato . Indi si prendono i capi inferiori , e si conducono alquanto obbliquamente sulle guancie , e sulle

le tempie , e vanno ad attaccarsi come i primi sulla testa , o sulla fronte con un nodo , o con degli spilli al berrettino del malato .

*Della fasciatura chiamata lo Sparviere per le ferite , e le fratture degli ossi del Naso .*

Per far questa fasciatura , si prende un pezzo di panno lino a doppio , tagliato in triangolo , con due cartoncini a proporzion del naso , da applicarsi alle parti laterali di esso ; uno degli angoli di questo pezzo di panno lino resta alla radice del naso , e gli altri due alle ale del naso , ed a ciascun degli angoli è attaccata una piccola fascia larga un dito , e lunga tre braccia , a riserva di quella , che resta attraccata all' angolo superiore , che non è più lunga di due . Alla base di questo pezzo di tela , fra i due angoli inferiori , che restano verso la bocca , si fa un piccolo taglio a traverso , per lasciar libero il passo all' aria nel naso , e quando si lega la striscia , che resta sotto di questo taglio , viene a posar sul labbro superiore della bocca . Le due fasciuole de' due angoli inferiori si fan passar dietro la testa per incrociarsi alla nuca , sulla fasciucela dell' angolo superiore , che si sarà fatta passar di sopra la testa fino alla nuca ; indi si fan passare le dette due fasciuole sotto gli angoli della mascella inferiore , e salendo su per le gote , si portano a incrociarsi di nuovo alla radice del naso sulla terza fascia , che si sarà rivolta dalla nuca , per farla tornare sulla fronte ; indi si fanno passare sulla parte media de' parietali , e si finiscono con avvolgerle intorno alla testa .

Il Sig. *Dionis* , a riguardo di questa fasciatura , ci raccomanda d' osservar bene , nel farla , di non tirar più un capo , che l' altro , per scansare di rendere il naso storto , perchè una volta che sia cicatrizzato in una cattiva situazione , non v' è più rimedio .

*Del Capestro semplice per la frattura della  
mascella inferiore , o quando è lussata  
dall' uno , o dall' altro lato .*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga otto braccia in circa, e larga tre dita traverse avvoltata a un capo. Dopo aver rassettata, o rimessa la mascella, si applica sulla parte offesa un cerotto glutinoso, con un' ascella di cartone grosso, ricoperto di molte compresse bagnate nel vin caldo; si applica la fascia sulla fronte, osservando di tenere il globo della fascia dal lato della malattia, si conduce la fascia attorno alla testa, e si ferma alla nuca; si viene in appresso a passare sotto il mento, per salire lungo la guancia malata, vicino al piccolo angolo dell' occhio, e si va obliquamente sopra la sommità della testa per discendere per di dietro l' orecchio dal lato opposto alla malattia, e si ritorna di nuovo per di sotto il mento, per risalire una seconda volta lungo la guancia inferma, formandovi una dolabra sino sopra la sommità della testa; si va in appresso obliquamente alla nuca, per ritornare per davanti dal lato infermo, a passare sopra il mento lungo il labbro inferiore, andando per l' altro lato alla nuca, per ritornare una seconda volta per davanti sopra il mento lungo il labbro inferiore, ed indi risalire lungo la guancia opposta alla malattia, vicino al piccolo angolo dell' occhio, andando obliquamente sulla sommità della testa, per andare per di dietro. Dopo ciò si conduce la fascia per davanti dal lato opposto alla malattia, si passa sotto il mento, formandovi una terza dolabra, montando sulla sommità della testa, si va per di dietro, e si finisce il rimanente della fascia per de' giri circolari intorno alla testa.

*Del Capestro doppio a un capo per la mascella  
inferiore fratturata da' due lati .*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga dieci braccia, e larga tre dita traverse. Si comincia con

con applicar la fascia sotto il mento, si ascende ugualmente lungo la guancia vicino al piccolo angolo dell'occhio, per fermar la fascia sulla sommità della testa; si conduce in seguito la fascia obliquamente verso la nuca, per ritornare per davanti a passar di nuovo sotto il mento, e ascendere lungo l'altra guancia, per formarvi anche lì una dolabra; si va in appresso sulla sommità della testa per discendere alla nuca, e ritornare per davanti a passare sopra il mento all'orlo del labbro inferiore, e si ritorna ancora per di dietro per ritornare per davanti a passare una seconda volta sul mento all'orlo del labbro inferiore; indi si va una terza volta per di dietro, per ritornare per davanti a passare sotto il mento, e ascendere lungo la guancia, formandovi una terza dolabra sino sulla sommità della testa, e discendere per di dietro, e ritornare per davanti dall'altro lato, a passare sotto il mento, e ascendere lungo l'altra guancia, formandovi anche lì una terza dolabra sino sulla sommità della testa; si va in appresso per di dietro, e si termina il rimanente della fascia, per de' giri circolari attorno la testa.

*Del Capestro doppio a due capi per le  
medesime fratture .*

Per fare questa fasciatura, si prende la medesima fascia, che la precedente; ma avvoltata a due capi uguali. Si comincia con applicarla sotto il mento, come la precedente, si fanno i medesimi giri colla fascia, e le medesime dolabre, che si sono praticate nella fasciatura precedente. Questa fasciatura non è più usitata oggidì; il capestro semplice servendo ugualmente alle medesime intenzioni.

*Della Fromba a quattro capi per la lussazione,  
e per la frattura obliqua della mascella  
inferiore .*

Per fare questa fasciatura, si prende un pezzo di panno lino lungo un braccio, e largo sei dita traverse,  
che

che si taglia a quattro capi; si fa una piccola fessura nel mezzo della tromba, osservando, che nell'applicare la fasciatura, questa fessura si trovi nel mezzo della base della mascella inferiore, tenendo i due capi inferiori, che si applicano sotto il mento, fra il pollice, e l'indice di ambedue le mani; si fanno ascendere i due capi lungo le guancie, vicino a' piccoli angoli degl'occhi, per venire ad incrociare sulla sommità della testa. Si prendono in appresso i due capi superiori, ripiegandoli sul mento all'orlo del labbro inferiore, e si conducono dietro alla nuca, e doro di averli incrociati, si fanno ritornare per davanti, per fermarli sulla fronte. Questa fasciatura è comoda assai per ogni ferita del mento, e del labbro della mascella inferiore. Alcuni Chirurghi si servono di questa fasciatura, in vece de' due capestri, la quale, quantunque più semplice, è ugualmente utile.

### *Del Solare per l'apertura dell' Arteria temporale.*

Questa fasciatura chiamasi *Nodata*, perchè s'incrocia più volte sulla tempia, e chiamasi *Solare*, e ancora *Stellata*, perchè la sua figura si accosta a quella del sole, o di una stella.

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga dodici braccia, e larga tre dita traverse, avvoltata a due capi. Avanti d'applicarla si mettono sopra l'incisione tre compresse graduate, cioè, una più grossa dell'altra, e si puone il mezzo della fascia sulla tempia ferita, con l'ucondo i due capi alquanto obliquamente intorno la testa, di maniera che uno de i capi faccia un giro circolare sulla fronte, e l'altro sopra l'occipitale, e si ritorna sopra la parte affetta, ove i capi si incrociano, e formano una specie di nodo, simile a quello, che fanno i legatori. Di poi si conduce uno de i capi per di sotto il mento, e l'altro sopra la sommità del capo per discendere dal lato opposto sotto il mento; ed in appresso ascendere sulla parte offesa; l'altro capo, che era stato condotto sotto il mento dal lato della parte offesa, si fa ascendere dal lato opposto sulla testa, per venire

nire sopra la parte affetta, faryi un secondo nodo di legatore accanto al primo; si fanno in seguito molti giri circolari attorno la testa per finire il rimanente della fascia, osservando di comprimere alquanto sopra i nodi.

### *Del Retentivo del collo pel salasso della vena jugulare.*

Questa fasciatura chiamasi *Retentivo del Collo*, comechè ella ritiene l'apparecchio, che si puone su questa vena, dopo fatta l'operazione.

Per fare questa fasciatura, si prendono ordinariamente due fascie, una delle quali è lunga un braccio, e larga due dita trasverse, e l'altra lunga cinque braccia, e larga tre dita trasverse. Applicato l'apparecchio, si pone la fascia più corta sopra la sommità della testa, in maniera che le due estremità pendano sopra le spalle. Si applica in appresso la fascia più lunga circolarmente intorno al collo, facendovi due giri, per ritenere l'apparecchio, e la prima fascia, in tal guisa però, che lasci al malato la libertà del respiro, e poi la si ferma con uno spillo. Si rovesciano in appresso le due estremità della fascia, che pendevano sulle spalle, e si conducono presso le orecchie, ove si firmano con degli spilli, acciocchè le circonvoluzioni, o i giri circolari della fascia lunga non vengano a discendere; si fa in appresso un terzo giro circolare attorno al collo, e si conduce la fascia obbliquamente per terminarla con due giri circolari attorno la testa.

### *Del Divisivo del collo per le ferite della parte anteriore, e posteriore del collo.*

Per fare questa fasciatura, si prende una piccola fascia, che si puone sulla testa lungo la sutura sagittale, di modo che un' estremità penda sul naso, e l'altra per di dietro. Dopo ciò si prende un'altra fascia lunga sette, o otto braccia, e larga tre dita trasverse, avvolta a due capi. Si applica il mezzo della fascia sopra

pra la fronte, e si va ad incrociarla alla nuca, poi si conduce uno de' capi sotto l'ascella destra, e l'altro sotto la sinistra, e si fanno tre circonvoluzioni attorno il petto, se è necessario di cuoprire un apparecchio sopra lo sterno, e per tener dritta la testa, vi si incrocia la fascia, ascendendo per disopra ogni spalla, per ritornare per di sotto ogni ascella a incrociare la fascia una seconda volta, osservando di fare una dolabra da ogni lato; indi si risale su ogni spalla, per andare a incrociare tra le scapule, e ritornare per davanti sotto ogni ascella, e finire con de' giri circolari attorno il petto.

Se non v'è apparecchio a cuoprire sullo sterno, e che non vi sia altro bisogno, che di tener dritta la testa; allora non è necessario d'incrociare la fascia sul petto. Dopo aver applicato la fascia sulla fronte, avendo prima posta la piccola fascia sulla testa lungo la sutura sagittale (come si è detto di già) si va co' due capi discendendo alla nuca per incrociarvi, si conducono in appresso ogni capo sotto ognuna ascella, si risale per davanti sopra ogni spalla, per venire a incrociare fra le due scapule, e ritornare per davanti sotto le ascelle, per finire con de' giri circolari intorno al petto. Questa è quella fasciatura, che chiamasi il *Divisivo Semplice*. Bisogna osservare di rilevare in full' estremità della fascia, che pendeva sul naso avanti d'incrociare fra le scapule.

### *Del Sospensorio a quattro capi pel Cancro della mammella.*

Per fare questa fasciatura, si prende un pezzo di panno lino di dodici dita in circa in quadro, attaccandovi a ciaschedun degli angoli una fascia lunga un braccio, e mezzo in circa, e larga un pollice. Si lega questo panno lino sotto la mammella, fermando due de' capi dietro il corpo, e poi rivoltando in su il detto panno lino a coprir tutto l'apparecchio, si girano gli altri due capi, cioè i due capi superiori sulle spalle, e di là si fan passare sotto l'ascelle per legarli davanti al di sopra della mammella inferma.

Al-

Ancuni preferiscono la fasciatura da corpo collo scapolare.

*Della fasciatura da corpo collo scapolare, per le malattie del Petto, e del Bassoventre.*

Questa fasciatura consiste in una salvietta più lunga, che larga, piegata in tre, e avvoltata da due capi, uno de' quali sarà più grosso, di maniera che il pieno della salvietta si trovi applicato sull'apparecchio, osservando di porre il piccolo capo della salvietta al lato opposto alla malattia, e che il capo più grosso fasci quasi tutto il giro intorno al corpo, e venga a soprapponersi sull'altro, appuntandolo con degli spilli, oppure fermandolo a punti d'ago. Per tener questa fasciatura in situazione si faccia sostenere da uno scapolare, che non è altro, che un pezzo di panno lino lungo due braccia, e largo otto dita in circa, con un taglio in mezzo tanto da farvi passare la testa del malato, in maniera che uno de' capi resti per dinanzi, e l'altro per di dietro, e questi poi si fermano con degli spilli, o si cuciono all'orlo della fasciatura da corpo.

*Degli Scapolari.*

Vi son di tre sorte scapolari; il primo è il più comune, ed è un pezzo di panno lino lungo due braccia, e largo otto dita in circa, con un taglio in mezzo tanto per farvi passare la testa del malato ec., ed è il medesimo, che abbiain descritto di sopra.

Il secondo è un pezzo di panno lino fesso da una estremità; si applica al collo del malato in maniera, che i due capi pendano per davanti, e quell'estremità, che non è fessa si trovi fra le due spalle, dove s'attacca alla salvietta con degli spilli. Si prendono indi i due capi pendenti per davanti, per incrociarli sul petto, e attaccarli alla salvietta con degli spilli.

Il terzo si adopra per li poveri, che sono scarsi di panno lino; si prende una fascia da salasso piegata in due, s'applica sul collo del malato, le due estremità pendenti

per davanti s' incrociano sul petto , e s' attaccano alla fal-  
vietta con degli spilli .

*Dello Spica per la lussazione dell' Omero ,  
e per la frattura dell' Acromion .*

Per fare questa fasciatura , si prende una fascia lun-  
ga dieci, o undici braccia , e larga tre dita traverse , av-  
voltrata a un capo ; e dopo aver rassettata la parte offe-  
sa si mette sotto l' ascella una pallottola di fila, o di pan-  
no lino , e sopra una compressa lunga mezzo braccio , e  
larga quattro, o cinque dita , divisa in quattro capi , ba-  
gnandola nel vin caldo , o nell' acquavite , e applicando-  
la di maniera , che i quattro capi ascendano sulla spalla ,  
si applica la fascia sotto l' ascella opposta alla malattia  
per davanti , avendola prima guarnita d' una-grossa com-  
pressa , acciocchè la pelle non si scorticchi ; si sale indi  
sulla testa dell' omero , si scende sotto l' ascella del me-  
desimo lato , si risale sulla medesima spalla , incrociando  
sopra la parte superiore , ed esterna del braccio . Dopo ciò  
si conduce la fascia per di dietro , si fa passare sotto l' a-  
scella del lato opposto al male , per ritornare per davanti  
a passare sullo sterno formandovi una dolabra . Si conti-  
nua passando sopra la spalla malata per discendere , e pas-  
sare sotto l' ascella del medesimo lato , osservando di fa-  
re una dolabra sulla spalla ; si scende in appresso per di  
dietro formando una dolabra , per venire a passare sotto  
l' ascella opposta alla malattia ; si fanno ancora due al-  
tri giri in dolabra , seguitando la medesima strada , offer-  
vando di fare tre dolabre per davanti , e altrettante per  
di dietro , e che sieno tutte uguali , e farle sempre sa-  
lendo , e d' incrociare sulla parte superiore , ed esterna del  
braccio malato , per formarvi *lo Spica* .

Fatto ciò si conduce la fascia per di dietro , per  
passarla sotto l' ascella opposta alla malattia , e si viene  
per davanti a formare una quarta dolabra , andando a  
passar sopra la spalla malata , e discendere sotto l' ascella  
del medesimo lato , si viene a passare attorno al brac-  
cio alla parte inferiore dello spica , per formarvi un tri-  
angolo . Si fa indi un giro circolare attorno al braccio ,  
e nel salire si cuopre il triangolo , e lo spica sulla spalla .

Si va

Si va in appresso per di dietro, e si finisce il restante della fascia con de' giri circolari intorno al corpo; indi si sostiene il braccio del malato, per mezzo d'una fascia attaccata al collo.

*Dello Spica rovesciato per la frattura  
della Clavicola.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga quattordici, o quindici braccia, e larga tre dita traverse, avvoltata a un capo. Si comincia ad applicare la fascia sotto l'ascella opposta alla malattia, si sale sopra la frattura, andando sulla spalla malata per discendere sotto l'ascella dal medesimo lato; indi si sale sull'istessa spalla, incrociando sopra la parte laterale, e inferiore del collo, ed è in quel luogo, dove si forma lo spica; dopo ciò si va per di dietro sotto l'ascella opposta al male per risalire sullo sterno, indi si fanno due, o tre giri nell'istessa maniera, formando tre dolabre per davanti, e per di dietro, facendole piccole, e uguali, e si osservi nel discendere di ben incrociare ogni volta, che si passa sulla spalla per formare lo spica. Indi si passa sotto l'ascella opposta al male, si risale sulla stessa spalla per tirarla all'indietro, si va per di dietro a passare sotto l'ascella del lato della malattia, si risale sulla medesima spalla, per tirarla medesimamente all'indietro; si va per di dietro per passare sotto l'ascella opposta al male, si fa ancora un simil giro sopra ogni spalla, per tirarle all'indietro, e tenerle ferme; indi si conduce la fascia sotto l'ascella opposta al male, e si sale lungo lo sterno, formandovi una quarta dolabra più grande dell'altre; si passa indi sulla spalla malata, per discendere verso la parte posteriore del braccio dal medesimo lato, si fa un giro sul ventre del muscolo, bicipite, si va in seguito per di dietro attorno al corpo per ritornare per davanti a passare sopra il braccio malato, affine di tenerlo accostato fermo contro le costole, e si termina la fascia per de' giri circolari attorno al corpo, passando per di sopra il braccio malato.

*Del Quadriga, o Catafratta per le fratture,  
e lussazioni delle Costole.*

Per farlo, quando la frattura è semplice, la fasciatura da corpo è bastante; ma se la frattura è completa, e che la tela della costola sia lussata per davanti, si farà questa fasciatura, osservando di mettere delle compresse graduate sopra lo sterno, affinchè la compressione della fasciatura sia più uguale.

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga dodici braccia, e larga tre, o quattro dita traverse avvoltata a due capi. Si comincia ad applicare la fascia sotto una delle ascelle, e si ascende incrociando sulla spalla dello stesso lato, conducendo un capo per davanti, e l'altro per di dietro per andar sotto l'ascella opposta; donde parimente si ascende incrociando sopra questa spalla; si conduce un capo per davanti, e l'altro per di dietro a incrociare i capi sotto l'ascella per dove si è principiato, osservando d'intrigare il capo, che va dall'innanzi all'indietro, sotto quello, che viene dal di dietro all'innanzi; si rovescia il capo di sotto sopra il dorso il più alto, che sia possibile, per andar sotto l'ascella dell'altro lato, si conduce parimente l'altro capo dell'altro lato per davanti sotto la stessa ascella, incrociandovi i capi, intrigando quello, che viene dall'innanzi all'indietro, sotto quello, che va dal di dietro all'innanzi; indi si va intorno al corpo, osservando di rovesciare il capo di sotto per formare una dolabra sopra il dorso, se ne forma similmente una per davanti; si continua la medesima strada, finchè si sia passato sopra il lato malato, osservando sempre di rovesciare il capo di sotto, cioè a dire, quello dinanzi all'indietro, e di fare le dolabre uguali tanto per davanti, che per di dietro, e indi terminare la fascia con de' giri attorno al corpo.

*Del-*

*Della Fascia del Braccio colla Salvietta  
per le malattie del Braccio, del Cubito,  
e della Mano.*

Per farla si prende una grande salvietta fina, la quale si piega in maniera, che il mezzo della salvietta sostenga il gomito del braccio malato, e si attraccano i due angoli superiori sopra la spalla sana. Se la salvietta fosse troppo lunga, si ripiega per di dentro, di maniera che non sia più alta, che il capo dell' omero, indi si conducono i due altri angoli della salvietta sulla spalla opposta al male per attraccarli sopra gli angoli superiori; si prende in appresso il di dietro della salvietta, e si conduce lungo il braccio malato, al di sotto del gomito, per sostenerlo, e si attacca sopra la spalla.

*Della Fascia col Fazzoletto per le  
medesime malattie.*

Per farla, si piglia un fazzoletto, che si piega in triangolo, si prende l'angolo superiore da una mano, e l'angolo del mezzo dall'altra, si applica sotto l'ascella dal lato malato, osservando, che l'angolo del mezzo si trovi posteriormente; si conduce l'angolo superiore sopra la spalla opposta al male per attaccarglielo; indi si prende l'angolo inferiore, e si rileva sul braccio fino alla spalla dal lato malato, per attaccarglielo, osservando di fare piegar il cubito del malato, e che la sua mano sia più alta, che il gomito; finalmente si piglia l'angolo posteriore per rovesciarlo sopra il braccio, e attaccarglielo.

Per fare la fascia ordinaria chiamata la *Barretta*, si piglia un pezzo di panno lino, o di taffetà quadro, piegato in quattro per passarvi dentro il cubito, e la mano, e s'attacca con un nastro, o con un cordoncino al vestito del malato per mezzo di uno spillo, o di un bottone.

*La Stella semplice per le fratture delle scapole,  
e per le ferite dello sterno.*

Per fare questa fasciatura, prendesi una fascia lunga sei, o sette braccia, e larga tre dita traverse, quando è per le scapole, si comincia ad applicare la fascia avvoltata a un capo, per di dietro sotto una delle ascelle, e si sale sulla spalla del medesimo lato, passando sopra le vertebre, si scende per dinanzi, per passare sotto l'ascella del medesimo lato, si risale per di dietro a incrociare fra le scapole sino sulla spalla dall'altro lato, per discendere per dinanzi, e venire sotto l'ascella del medesimo lato, ed in appresso venire per di dietro sopra le vertebre; si continua la medesima strada sino che si sia formato uno spica fra le scapole, osservando di fare le dolabre per di dietro nel salire. Lo spica essendo formato si ascende sulla spalla, per discendere per davanti, e venire sotto l'ascella dell'istesso lato, si ascende di nuovo sulla medesima spalla, per andare per davanti a passare sullo sterno; e di là sotto l'ascella del lato opposto, si risale per di dietro sopra la stessa spalla, per venire per davanti a incrociare sullo sterno, e finire con de' giri circolari attorno al corpo.

Quando si applica la fasciatura sullo sterno, si pone la fascia per davanti, lo spica, che s'è fatto per di dietro, si farà per davanti sullo sterno, vi si incrocia lo stesso, e si fanno le medesime dolabre, che nell'altra fasciatura.

*La Stella doppia per la lussazione dell'Omero,  
per le fratture delle Clavicole, e per le  
ferite, che traversano il petto nella  
sua parte superiore.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga dodici braccia, e larga tre dita traverse; si comincia con applicare la fascia per davanti sotto una delle ascelle, e si sale sulla spalla dall'altro lato passando sul-

sullo sterno, si scende sotto l'ascella del medesimo lato per venire davanti a incrociare sopra lo sterno, ascendendo sopra l'altra spalla, e discendendo per di dietro sotto l'ascella del medesimo lato opposto; indi si sale per davanti sopra la medesima spalla, incrociando sulla parte superiore, ed esterna del braccio, andando per di dietro a passare sulle vertebre per andare sotto l'ascella dell'altro lato, e risalire anche sopra questa spalla incrociando sulla parte superiore, ed esterna del braccio, per andare per di dietro a incrociare sulle vertebre, andando sotto l'ascella dell'altro lato, per venire per davanti, salire lungo lo sterno fino sulla spalla, per continuare sempre la stessa strada, finchè si siano formati quattro spiche; cioè, uno sopra lo sterno, un altro sopra ciascheduna spalla, ed il quarto fra le scapule, osservando di formar bene da ogni parte le dolabre; facendo vi è una cosa da osservare, che è, che a tutti i luoghi degli spichi bisogna incrociare; cioè a dire, che tutti i giri seguitino gli stessi sensi. Avendo formati i quattro spica, si termina la fascia con de' giri circolari attorno al corpo; ma in caso, che le clavicole fossero fratturate, allora bisognerebbe tenere le due braccia legate lungo i fianchi colla fascia.

### *Della fasciatura per le fratture semplici dell' Omero.*

Per fare questa fasciatura, si adoprano ordinariamente due fascie, la prima deve essere lunga otto, o nove braccia, e larga tre dita; e la seconda lunga sei braccia, e larga similmente tre dita trasverse, si comincia, avanti ogni cosa, a prendere una compressa semplice, e fessa, inzuppata in un defensivo, per applicarla sopra la frattura, indi si prende la prima fascia, e si applica sulla frattura, facendovi tre giri circolari; si sale in appresso per dolabra fino alla spalla, e se la frattura è alla parte superiore dell'omero, si fa un giro attorno al corpo; indi si scende serpeggiando fino sopra la frattura, dove si fanno due giri circolari, indi si scende per dolabrè fino alla piegatura del gomito; se la frattura è alla parte media, o inferiore dell'omero, si

farà un giro circolare alla parte superiore del cubito; si ritorna in appresso con delle piccole dolabre attorno al braccio, per finire la fascia, riempiendo il vuoto, che è alla parte inferiore del braccio, dopo ciò si prendono quattro ascelle di legno sottile, o di cartone, lunghe sei, o otto dita traverse, e larghe due, e si applicano lungo il braccio, e sulla frattura a eguale distanza l'una dall'altra, osservando di non porle mai sopra il tragitto dell'arteria, e dopo averle tuffate nel defensivo, o nel vin caldo. Si prende indi la seconda fascia, e si applica attorno la frattura, facendovi due giri circolari, dopo di ciò si scende fino all'estremità inferiore delle ascelle per terminarvi la fascia.

Se il braccio fosse fratturato in più pezzi, o che fosse fracassato, in tal caso si prendono due gran pezzi di cartone, che si applicano attorno al braccio per di sopra l'apparecchio, legati con tre nastri di filo, cominciando a legare quello di mezzo: finita la fasciatura si pone il braccio in ciarpa, cioè a dire al collo per mezzo di una salvietta, come si è detto di sopra.

La fasciatura per la frattura del cubito è la stessa che pel braccio, col medesimo apparecchio, senza altra differenza, se non che bisogna ricordarsi, che avanti di applicare la prima fascia, bisogna prendere delle compresse lunghe, e applicarle lungo il cubito l'una alla parte interna, e l'altra alla parte esterna.

### *Della Dolabra per la lussazione del cubito.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga cinque braccia, e larga tre dita traverse; si comincia per applicare la fascia intorno alla parte inferiore del braccio, si fanno due giri formando una dolabra salendo, si ritorna per la piegatura del gomito attorno al braccio, formando ivi una seconda dolabra scendendo. Indi si discende per la piegatura del gomito per fare un giro attorno al cubito, formando ivi salendo una terza dolabra; si continua sempre così, finchè si trova ricoperto il gomito, si termina in appresso il rimanente della fascia per dolabre salendo attorno al braccio.

*Del.*

*Della Dolabra per l' Aneurisma.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga sei, o sette braccia, e larga tre dita traverse avvolta a un capo. Si comincia ad applicare l' estremità della fascia al di sopra del condile esterno dell' omero, e si scende obliquamente per la piegatura del gomito, per fare un giro attorno la parte superiore del cubito; indi si ritorna per la piegatura del gomito attorno alla parte inferiore del braccio; si continua sempre così, finchè si siano fatte tre, o quattro incrociature sopra la malattia, per farvi una forte compressione. Dopo ciò vi si applica una compressa alquanto lunga lungo il tragitto dell' arteria brachiale, si sale in appresso attorno al braccio per dolabre sino alla sua parte superiore dove si termina la fascia.

Bisogna osservare, che avanti l' applicazione della fasciatura, conviene mettere sull' apertura dell' arteria un pezzetto di foglio masticato, e per di sopra delle compresse graduate.

*Della Dolabra per la lussazione del pugno.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga quattro braccia, e larga tre dita traverse avvolta a un capo. Si comincia ad applicare la fascia attorno al pugno, ponendo l' estremità della medesima dal lato della parte esterna, si fanno tre giri circolari sopra il male; indi si va obliquamente per di sopra il metacarpo a passare fra il pollice, e l' indice conducendo la fascia per di sotto la mano, per venire dalla parte esterna attorno al pugno, si continua a fare due altri simili giri, formando uno spica sul pugno, e delle dolabre nel discendere. Dopo ciò si ritorna attorno al pugno, e si sale per dolabre sino alla parte media del cubito per ivi terminar la fascia.

Det.

*Della Dolabra per la frattura del Carpo,  
e del Metacarpo.*

Per far questa fasciatura, si prende una fascia lunga otto braccia, e larga tre dita traverse avvoltata a un capo. Si comincia ad applicare la fascia attorno al pugno; si fanno due altri giri simili, formando, come nella precedente fasciatura, uno spica sul carpo; indi si va intorno alla mano per discendere per dolabre fino all' estremità delle dita; indi si prende una paletta di legno, o un cartone, sopra il quale si pone la mano, per impedire la flessione delle dita; dopo di ciò si sale per dolabre fino al pugno, formando una incrociatura sopra il carpo, e si finisce la fascia intorno al pugno.

*Del mezzo Guantelletto per la lussazione  
delle prime falange delle dita,  
cogli ossi del metacarpo.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga sei braccia, e larga un pollice per ciascun dito lussato. Si principia ad applicare l' estremità della fascia dal lato della parte esterna del carpo, facendo ivi due giri; indi si va obliquamente per di sopra il metacarpo, per fare un giro abbracciando il dito malato, principiando dal lato del pollice, e si ritorna per di sopra il metacarpo alla parte interna del pugno, per ritornare alla parte esterna, e si ritorna una seconda volta per di sopra il metacarpo, per fare un secondo giro attorno al dito malato per di sopra il primo, si ritorna per la medesima strada attorno al pugno. Se vi sono dell' altre dita malate, vi si fanno due giri nell' istessa maniera. Dopo di ciò si termina la fascia attorno al pugno.

*Del*

*Del Guantelletto intero per le lussazioni, per le fratture, e per le scottature delle dita.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga quattro braccia, e larga un pollice per ciascun dito malato. Si comincia ad applicare la fascia attorno al pugno, ponendo l'estremità della fascia dalla parte esterna; indi si conduce obliquamente la medesima per di sopra il metacarpo, andando serpeggiando attorno al dito malato sino alla sua estremità; si sale in appresso per dolabre sino all' articolazione del dito col metacarpo, osservando di fare due giri circolari sopra il male; indi si ritorna per di sopra il metacarpo alla parte interna del pugno, e se vi sono dell' altre dita malate, vi si fanno de' giri simili a quelli, che venghiamo a fare. Quando le dita sono lussate, o bruciate, si finisce la fascia attorno al pugno; ma quando sono fratturate, si ritorna attorno alle dita, discendendo per dolabre sino alla loro estremità, osservando di prendere colla fascia le dita vicine a quello, che è fratturato, per servirgli di sostegno, e applicarvi delle piccole compresse lunghe fra ciascun dito; indi si applica una paletta di legno, guarnita di una compressa graduata sotto le dita, e la mano. Si termina in appresso la fascia nel salire sino al pugno per mantenere la paletta, e dove si finisce con de' giri circolari.

*Del mezzo Guantelletto per le malattie del pollice.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga quattro braccia, e larga un pollice avvoltata da un capo; si comincia con fermar la fascia intorno al pugno, come nelle precedenti; indi si viene serpeggiando intorno al pollice sino sopra il male, si risale in appresso per dolabre nell' istessa maniera, che per le altre dita, andando intorno al pugno dalla parte interna. Allora si deono fare molti giri intorno al pollice sopra il Tenare, principiando dal suo attaccagnolo superiore, di  
mo-

modo che si deono fare delle dolabre nel discendere , e incrociare alla parte interna del pugno ; bisogna ancora osservare , che ad ogni giro si vada intorno al pugno , dove si termina la fascia .

### *Del Rovesciato pel Salaffo della Salvatella .*

Per fare questa fasciatura , si prende una fascia lunga due braccia , e larga un pollice ; si comincia ad applicar la fascia sull' articolazione del dito mignolo col metacarpo , lasciando calcare un' estremità della fascia sotto la mano . Dopo ciò si va per di sopra il metacarpo intorno al pugno per farvi un giro , di là si va a fare un giro abbracciando il dito mignolo , si ritorna in appresso per di sopra il metacarpo alla parte interna del pugno , per ritornare all' esterna , ardando ad aggiungere il dito annulare , per farvi ancora un giro abbracciandolo , e si ritorna al metacarpo , ed al carpo , per fermare la fascia nel finire intorno al pugno . Si ripetono tre volte quelle circonvoluzioni attorno dell' annulare , e del carpo , e si fanno intorno al pugno tanti giri , quanti ne permette la lunghezza della fascia , avanti di fermarla .

### *Del Sospensorio dello Scroto .*

Per fare questa fasciatura , si prende un pezzo di panno lino tagliato per lo lungo , e grande secondo l' esigenza de' casi , in guisa di un berretto di bambino atto a ricevere lo scroto , e i medicamenti ; vi si fa un' apertura nella sua parte media , e superiore , per passarvi la verga ; da ogni lato si attacca una fascia lunga in circa un braccio , e mezzo , e due altre alla sua parte inferiore . Si comincia a porre lo scroto , e l' apparecchio nel sospensorio , si passa la verga nell' apertura suddetta , e si conducono le due fascie superiori intorno alla cintura per attaccarvele ; indi si conducono le altre due fascie cucite alla parte inferiore per di sotto le coscie per attaccarle sopra i fianchi alla cintura .

*Del.*

*Della Fasciatura pel Bubone, e le malattie  
delle Anguinaglie .*

Per farla, si prende un pezzo di panno lino tagliato in triangolo, o in piramide, si cuce una fascia ad ogni angolo . Si comincia ad applicare la fasciatura sull' inguine, di maniera, che la piramide si trovi alla parte inferiore dal lato della rima del perineo, e i due altri angoli alla parte superiore ; osservando, che la linea retta della fasciatura sia dal lato dello scroto, e la linea obliqua dal lato della coscia . Indi si conducono le due fasce superiori intorno alla cintura per attaccarvele, si passa in seguito l' altra fascia sotto la coscia malata per venire per di sopra la sua parte esterna ad attaccarla sul male .

*Del T doppio per la Lirotomia, e le  
malattie del Perineo .*

Per far questa fasciatura, si prende una fascia larga tre dita, e lunga quanto basti per cingerla intorno al corpo ; nel mezzo di questa fascia se ne cuce un' altra larga quattro dita, e poco men lunga dell' altra, la quale si taglierà in mezzo fino a quattro dita distante dalla fascia, che si avvolge intorno al corpo . Si comincia ad applicare questa fasciatura sotto le natiche, e si conducono i due capi superiori intorno al corpo, per annodarli per davanti, dopo averne fatto passar uno in un semiscapolare, che chiamasi il *Collare di Misericordia*, nel quale s' è fatto passare la testa del malato ; indi si pigliano i due capi inferiori, facendoli passare fra le coscie, i quali s' incrocicchiano sul perineo, conducendoli sopra l' inguine uno da una parte, e l' altro dall' altra, per attaccarli alla cintura . Bisogna osservare di non turar l' ano colla detta fasciatura, eccettuato il caso della fistola all' ano .

*Del-*

### *Dello Spica del Bubbonocelo, e per la Castrazione.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga 14. braccia, e larga tre dita, che si avvolge intorno alla cintura, di maniera che il capo della fascia venga a restare per dinanzi dal lato opposto alla parte inferma, si fa passare in seguito per di sopra la parte superiore, e anteriore della coscia dal lato della malattia per discendere interiormente per di sotto la coscia per farla ritornare in su fra le pieghe dell' inguine, e lo scroto; sicchè venga a incrociarsi sulla parte superiore, e anteriore della coscia malata, laddove si deve formare lo spica; si conduce in appresso la fascia sul fianco dalla parte del male, facendola passare intorno alla cintura, per ritornare dalla parte sana obbliquamente sulla parte malata, sicchè venga a sovrapporsi; si fanno due altri giri simili per formare lo spica, osservando di fare delle dolabre nell' ascendere; si osserverà in oltre, che il giro, che deve terminare lo spica, e che è passato fra le coscie, deve salire in linea retta fino alla cartilagine *Xifoide*, per poi rivoltarla dopo averle data una volta intorno al corpo, piegandola in due, o tre doppi, in forma di compressa, e s' impiegherà il restante della fascia avvolgendola attorno al corpo.

### *Dello Spica per la lussazione del Femore.*

Per far questa fasciatura, si prende una fascia lunga venti braccia, e larga quattro dita traverle avvoltata a un capo. Cominciassi dall' applicarla, attorno alla cintura, ponendo l' estremità della fascia dal lato malato, e si fanno due giri attorno al corpo, per venire per la parte posteriore della coscia dal lato malato, a passare sul grande trocantere per formar ivi lo spica. Si sale indi sull' inguine per andare intorno alla cintura, e ritornare una seconda volta per la parte posteriore della coscia dal lato malato; si fanno due altri giri simili per formare lo spica, osservando di farlo sul grande trocan-

te.

tere : formato che è lo spica , si ritorna per un quarto giro alla parte posteriore della coscia malata discendendo per la parte interna , per fare un giro alla parte media della coscia al di sotto dello spica , e si va in appresso per di sopra l'inguine per terminare la fascia intorno la cintura .

### *Della Dolabra per la lussazione del Ginocchio .*

Per far questa fasciatura , si prende una fascia lunga otto braccia , e larga tre dita trasverse avvoltata a un capo ; si comincia dall' applicarla intorno la parte inferiore della coscia , dove si fanno due , o tre giri , formando una dolabra nel discendere ; indi si va obbliquamente sotto il garretto , per fare due giri al di sotto del ginocchio formando ivi una dolabra nell' ascendere . Si continua sempre lo stesso , sino che il ginocchio sia ricoperto , e si finisce il rimanente della fascia salendo con delle dolabre .

### *Della fasciatura unitiva per la frattura longitudinale della Rotola .*

Per farla , si prende una fascia lunga cinque braccia , e larga tre dita trasverse , fendendola nel suo mezzo , e avvoltata a due capi , in maniera che la fessura sia tutta sopra un capo . Si comincia ad applicare due piccole compresse a più doppi sulle parti laterali della rotola , indi si pone la fascia sotto il garretto , e si conducono i due capi da' due lati nel mezzo del ginocchio , in maniera che la fessura si trovi sopra la rotola ; si passa uno de' capi nella fessura si stringe sollevando alquanto ; dopo ciò si discende per di sotto il garretto , per ritornare nel mezzo del ginocchio , stendendovi i capi l' uno dopo l' altro ; indi si termina la fascia , un capo salendo , e l' altro discendendo con fare delle dolabre .

### *Della fasciatura chiamata Testuggine per la lussazione della Rotola.*

Per far questa fasciatura, si prende una fascia lunga otto braccia, e larga tre dita traverse avvolta a un capo. Si comincia ad applicarla attorno la parte inferiore della coscia, ponendo l'estremità della fascia dalla parte della lussazione, e vi si fanno due giri circolari; dopo ciò si scende obliquamente per di sotto il garretto per andare a fare due giri circolari attorno la parte superiore della gamba. Indi si fanno due altri giri circolari nel mezzo del ginocchio, e due altri per riempire i vuoti, che si trovano fra i giri superiori, e i giri inferiori. Indi si pone un cartone sulla parte del ginocchio, dove si trova la lussazione, si fanno in appresso diversi giri attorno il ginocchio per comprimere sopra il cartone, e si termina la fascia nel montare con delle dolabre.

### *Della fasciatura chiamata il Chiastro per la frattura trasversale della Rotola.*

Per fare questa fasciatura, si comincia a porre sopra il ginocchio una compressa per lo lungo, tagliata dalle due estremità a guisa di fromba a quattro capi, e fessa nel suo mezzo per passarvi la rotola. Si abbia cura di avvicinare i due pezzi della rotola l'uno accanto all'altro; si pongono al di sopra, e al di sotto della rotola due piccole compresse a più doppi per mantenere i pezzi fratturati accostati l'uno all'altro. Indi si pone un pezzo di cartone sotto il garretto, per impedire, che la gamba non possi piegarsi, e sopra una salvietta piegata a più doppi per lo lungo, e avvolta a due capi in maniera che essi si trovino alle parti laterali del ginocchio. Indi si prende una fascia lunga quattordici braccia, e larga due dita, avvolta a due capi uguali. Si comincia ad applicare la fascia sulla compressa superiore, conducendo i capi sotto il garretto per di sopra la salvietta, dove s'incrociano per venire per di sopra la parte inferiore della salvietta sopra la compressa inferiore, mutando i capi

pi di mano , indi s' incrociano , e si scende obbliquamente sotto il garretto per ritornare sul primo giro al di sopra della rotola , e si continua così finchè sia terminata tutta la fascia . Si mette sul ginocchio una compressa imbevuta in un defensivo , e si rovesciano i quattro capi della fromba sopra la rotola , incrociandoli obbliquamente per riaccostare esattamente i due pezzi fratturati , e per mantenere la fasciatura . Si applica un' altra salvietta nel modo di sopra detto , e si assicura con un' altra fascia per mantenere sempre la gamba tesa .

*Della Dolabra per la lussazione del tarso,  
e del metatarso.*

Per fare questa fasciatura , si prende una fascia lunga sei braccia , e larga tre dita traverse avvoltata a un capo . Si comincia ad applicarla alla parte inferiore della gamba , si fanno ivi due giri , formando nel discendere una dolabra . Dopo ciò si va obbliquamente alla parte posteriore del calcagno , per ritornare dall' altra parte attorno alla gamba sopra i malleoli formandovi una dolabra nel discendere , e si rifale in appresso attorno al piede formando ivi nel discendere una dolabra ; si continua sempre nell' istessa maniera finchè il piede sia tutto coperto , osservando di formar delle dolabre nel discendere , e di incrociare sul tarso per finire la fascia attorno alla gamba .

*Della Staffa pel salasso del piede.*

Per far questa fasciatura , si prende una fascia lunga tre braccia , e larga due dita traverse avvoltata a un capo . Si comincia a porre l' estremità della fascia sotto il calcagno del malato , e se ne lascia pendere un piede in circa . La si tien su la compressa , che si è messa sopra l' incisione col pollice , si fanno due , o tre circonvoluzioni in forma di staffa sulla compressa , e si vien per di sopra il tarso a i malleoli . La si conduce un' altra volta obbliquamente sulla compressa attorno al piede per ritornar a i malleoli . Si fanno più giri nell' istessa maniera

fiuchè si abbia impiegata tutta la fascia ; finalmente si rovescia l'estremità della fascia posta sotto il calcagno del malato sopra la compressa , per annodare i due capi della fascia insieme sopra il malleolo esterno . Vi sono molte altre maniere di applicar questa fasciatura ; ma tutte hanno qualche rassomiglianza con una stassa , il che gliene ha fatto dare il nome .

*Della Fasciatura circolare per le fratture complete , e incomplete della gamba .*

Avanti di procedere all'applicazione di questa fasciatura conviene preparare tutti i pezzi , che compongono l'apparecchio , ponendoli sopra un bacino in maniera , che l'ultimo pezzo, che si deve adoperare, sia posto il primo sul bacino , e gli altri disposti via via di seguito .

Per far questa fasciatura , si adoprano per l'ordinario tre fascie , le due prime lunghe ognuna cinque braccia , e larghe tre dita trasverse , e la terza venti braccia di lunghezza , e larga anch'essa tre dita trasverse . Fatta la riduzione della frattura , si prende una compressa semplice , e fessa inzuppata in un defensivo , e si applica sulla frattura , incrociando i suoi capi . Vi si fanno tre giri circolari colla prima fascia , la quale si termina montando sempre per dolabre , osservando di rovesciare la fascia a cagione dell'ineguaglianza della gamba , sino al di sopra del ginocchio senza coprirlo . Dopo ciò si prende la seconda fascia , che si applica medesimamente sulla frattura facendovi sopra due giri circolari , indi si discende per dolabre sino a i malleoli , i quali si cuoprono , se è necessario , andando attorno al piede , per ritornare attorno alla gamba , osservando medesimamente di rovesciare la fascia per le sopraddette ragioni , e si termina la fascia . Ciò fatto , se la gamba sia ineguale , si prende una compressa graduata , la quale si applica intorno alla gamba nella sua parte inferiore , ponendo la sua parte più grossa all'ingù ; indi si prendono quattro pezzi di cartone alquanto lunghi , o quattro assicelle sottili , che si applicano lungo la gamba , di maniera che non posino mai sul capo della tibia , nè sopra il tendine d'Achille . Fatto ciò si prende la terza fascia , la quale si applica sul-

fulla frattura, dove si fanno due giri circolari; dopo si scende fino all' estremità de' pezzi di cartone, o delle afficelle, dove essendo arrivato, si sale per dolabre bene uguali fino alle estremità superiori delle dette afficelle, dove si termina la fascia.

Allora si prende la gamba con una mano al di sotto del ginocchio, e coll' altra al tarso, e si pone nel luogo dove deve restare. Si chiude la gamba tra due bendoni posti lungo la gamba, e si prendono quattro grosse compresse in forma di guancialetti, i quali si mettono due alla parte superiore della gamba, e due alla parte inferiore, per riempire i vuoti de' bendoni; si pone indi una grande compressa lungo la tibia, si legano indi i bendoni con tre, o quattro cordoni di refe, principiando ad annodare quello del mezzo, si pone indi un carello di panno lino a guisa di una ciambella sotto il calcagno, e una compressa attorno al piede. Indi si prende una suola di legno guarnita di una compressa, alla quale suola devono essere due buchi, per passarvi due nastri; si pone detta suola sotto la pianta del piede, laddove si ferma co' nastri nel salire lungo alla gamba, attaccandoli con degli spilli, o passandoli ne' cordoni, che legano i bendoni. Dopo fatta la fasciatura si pone la gamba in maniera, che il calcagno sia alto quanto il ginocchio, e che il pollice corrisponda alla rotola; badando, che il piede sia alquanto morbido.

La fasciatura per la frattura della coscia si fa nella medesima maniera, eccettuato, che i bendoni devono essere alquanto più lunghi, e l' esterno, più lungo dell' interno; il bendone esterno deve stendersi dal piede fino alla cresta degli ossi degl' ilei, e qualche volta anche fino alle costole spurie; il restante dell' apparecchio è tutto l' istesso.

### *Della Fasciatura a 18. capi per le fratture complicate della gamba.*

Per farla, si prendono tre pezzi di panno lino, d' una lunghezza, e larghezza proporzionata alla parte offesa, i quali si pongono l' uno sull' altro, per cucirli insieme. Indi si taglia ogni pezzo per le due estremità

ogn' una in tre capi, in maniera, che i tre pezzi formeranno 18. capi. Si pone indi la fasciatura sotto la gamba, che farà difesa, sopra la quale si avrà cura di mettere una gran compressa, per impedire, che la marcia non insudici la fasciatura; si pone la gamba in situazione, e si medica la ferita; fatto ciò, si rovesciano le compresse sulla gamba, e si prende in appresso il capo di mezzo dal lato della ferita, e applicasi sulla gamba, si fa lo stesso dal lato opposto, e si continua sempre ad aggiustar nella medesima maniera tutti i capi, osservando di condurre i tre ultimi dal lato opposto alla ferita alquanto obliquamente per fermarli col mezzo di un solo capo. Fatto ciò, si finirà nella medesima maniera, che nella precedente fasciatura, cioè a dire, bisognerà avvolgere i bendoni, riempire i vuoti de' bendoni, il carello di panno lino a guisa di ciambella, la suola, e così di tutto il rimanente, come nella precedente fasciatura.

### *Della fasciatura pel salasso del braccio.*

Per farla, si prende una fascia lunga due braccia, e mezzo, e larga due dita traverse, la quale si pone in varie guise; ma il miglior metodo è quello di applicare il capo della fascia sulla compressa, che cuopre l' incisione fatta alla vena, lasciandone pendere di fuori un palmo in circa sotto la curvatura del gomito. Si discende poi obliquamente nel di dentro del braccio, andando sotto la piegatura del gomito, si sale poi con delle dolabre, e si va dove si è principiato, di maniera che i giri della fascia formino la figura di un 8, osservando, che i giri s' incrocino gli uni cogli altri sulla compressa nel mezzo della piegatura del gomito. Ripetonsi le medesime circonvoluzioni finchè si abbia impiegata tutta la fascia, e si fermano l' estremità al di sopra del gomito nel di fuori. Vi è chi costuma di cucire un cordone ad ogni estremità della fascia, il che fa, che i nodi siano molto più piccoli, e che una fascia lunga un braccio, e mezzo sia più che sufficiente.

### *Della Cappellina a un capo per l' amputazione del braccio.*

Avendo applicato l' apparecchio sul troncone, consistente in vari gruppi di fila asciutte, e de' piumacciuoli mezzi fatti, su questo si mette una compressa doppia a guisa di *Croce di Malta*, badando di tener sempre una mano sul troncone, per pigiar leggermente i vasi in faccia, il che conviene osservare in tutte le amputazioni. Sulla compressa a *Croce di Malta* si mette una piccola compressa quadrata, bagnata nell' acquavite, indi le fasciuole, che si fanno incrociare sul troncone, osservando di raddoppiare l' estremità della fasciuola, che trovasi alla parte interna del braccio, per comprimere alquanto il tragitto de' vasi, e fermandole con una terza fasciuola circolare, che si avvolgerà attorno all' orlo del troncone fermando il tutto colla fasciatura nominata la *Cappellina doppia*.

Per far questa fasciatura, si prende una fascia lunga dodici, o quattordici braccia, e larga tre dita trasverse, posandone il capo all' estremità del troncone, e si sale per dolabre attorno al braccio sino all' articolazione, per andare per di sopra la spalla attorno al corpo passando sotto l' ascella opposta al male, e ritornare sull' acromion dal lato malato per discendere per le parti laterali del braccio sino all' estremità del troncone; e risalire sino all' articolazione, per andare di nuovo per di sopra la spalla attorno al corpo passando sotto l' ascella opposta, e ritornare, per discendere sino all' estremità del troncone, dove si fa un' incrociatura per di sotto, e si ritorna per di sopra, e si sale sino sulla spalla, rovesciando ivi la fascia per discendere all' estremità del troncone per formare un' altra incrociatura, osservando di coprir bene gli angoli della croce, con che viene a formarsi la *Cappellina doppia*. Si risale un' altra volta sulla spalla, rovesciando ivi per la terza volta la fascia per discendere serpeggiando attorno al braccio sino all' estremità del troncone; indi si sale per dolabre sino sulla spalla per andare attorno al corpo, passando sotto l' ascella opposta, e ritornare sull' acromion dal lato malato per terminare

la fascia attorno al braccio. Quando è per la medicatura ordinaria, non è necessario fare tutti questi giri; basta solamente, che quando si è salito per dolabra attorno al braccio fino all' articolazione, si rovesci la fascia sulla spalla per discendere in appresso all' estremità del troncone senza andare intorno al corpo.

La stessa fasciatura si fa per l' amputazione del cubito, se non che allora non si passa la fascia intorno al corpo.

### *Della Cappellina a due capi per l' amputazione del braccio.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia simile alla precedente, che si avvolta a due capi, uno piccolo, e uno grosso; vi saranno tre braccia di fascia nel piccolo capo, e nel grosso tutto il restante. Si adopra questa specie di cappellina al braccio, e alla coscia, solo nel caso di necessità, come quando si vuol trasportare il malato da un luogo a un altro per timore di emorragia. Si applica questa fasciatura sopra la precedente; cioè a dire, si comincia ad applicare la cappellina doppia a un capo, e su questa la presente; cominciando spedatamente ad applicare la fascia nel mezzo del troncone, e si sale dalle parti laterali sulla spalla, conducendo il capo grosso intorno al corpo per ritornare sulla spalla per di sopra il capo piccolo; indi si rovescia il piccolo capo, e si conduce in linea retta all' estremità del troncone, incrociando ivi la fascia; si risale in appresso sulla spalla, e si conduce il capo grosso intorno al corpo; si continua sempre il medesimo, finchè sia terminato il piccolo capo, osservando di rovesciarlo all' estremità del troncone, ed il capo grosso girarlo attorno al corpo. Dopo terminato il piccolo capo, si rovescia il grosso sulla spalla malata, e si discende serpeggiando intorno al braccio fino all' orlo del troncone, e indi si sale per dolabra attorno al braccio fino sulla spalla, per finire intorno al corpo.

### *Della Cappellina a due capi per l'estirpazione del braccio.*

Dopo l'amputazione del braccio alla sua giuntura si applichi l'apparecchio, che consiste, in mettere su i due brani di pelle accostati bene insieme, molte fila asciutte, per ben accomodarli l'uno contro l'altro, come ancora in fondo alla cavità della giuntura, e in quella dell'ascella, per fare un'esatta compressione su i vasi. Sopra queste fila si metterà un cerotto tagliato a *Croce di Malta*, e una compressa della medesima figura, fermandoli con tre fasciuole, due delle quali s'incrociano sulla malattia, e vanno fino all'altra spalla, e l'altra alquanto più larga, i di cui capi vadano ad incrociarsi sulla spalla opposta, e il tutto si sostenga dalla fasciatura chiamata *la Cappellina a due Capi, per l'estirpazione del braccio*.

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga sedici braccia, e larga quattro dita, che si avvolta a due capi; da una parte alla lunghezza di tre, o quattro braccia, e dall'altra per tutto il restante della fascia. Si comincia ad applicarla sotto l'ascella sana, e passandola attorno al corpo, si soprappongono i capi sotto l'ascella della parte inferma, in maniera, che il piccolo capo della fascia resti di sotto, il quale si rivoltata passandolo sul mezzo del male, mentre l'altro capo si avvolta intorno al corpo per farlo passare sulla spalla inferma, e soprapporlo al piccolo capo, il quale di nuovo si rivoltata sul male, soprapponendosi a se stesso, e si ritorna coll'altro capo sotto l'ascella per passargli sopra un'altra volta; e di nuovo si rivoltata in su il piccolo capo sicchè venga a soprapporli a se stesso dall'altra parte della prima passata, e così si continua, finchè non sia coperto tutto il luogo del male, impiegandosi il capo piccolo sopra il male, e il grosso intorno al corpo.

*Della Cappellina a un capo, e a due, per  
l' amputazione della coscia.*

Questa fasciatura s'assi nell' istessa maniera, che si fa pel braccio, e non differisce da essa, che perchè questa fascia deve avere sedici braccia di lunghezza, e quattro dita traverse di larghezza.

*Della Cappellina a un capo, per l' amputazione  
della gamba.*

Per far questa fasciatura, dopo aver messo l' apparecchio, che consiste nel mettere sulla legatura de' vasi delle piccole compresse a più doppi, e de' piumacciuoli in gran quantità per fare un risalto al di sopra degli ossi; sul resto della carne si mettono de' piumacciuoli ben grossi, o delle fila asciutte; dopo di questo vi si applica sopra una compressa quadrata a più doppi, poi una compressa a croce semplice, che venga co' capi ad abbracciare il ginocchio, e dopo un' altra compressa quadrata più grande della prima, e finalmente una seconda compressa a croce doppia, ed una terza compressa circolare intorno al troncone per contenere il tutto. Indi si prende una fascia lunga dodici braccia, e larga tre dita traverse, avvoltata a un capo, si comincia ad applicarla all' estremità del troncone, e si sale per do-  
labre fino al ginocchio, per andare al di sopra de' condili, e discendere per la parte laterale fino all' estremità del troncone, per risalire da capo al di sopra del ginocchio, e discendere per incrociare sopra al troncone; si sale in appresso anteriormente al di sopra della rotola, e si rovescia la fascia per discendere al troncone per di sopra gli angoli della croce, e si forma un' altra incrociatura, e si risale al ginocchio, facendo un giro circolare attorno al garretto, e si rovescia ancora la fascia per discendere all' estremità del troncone, terminando di coprire gli angoli della croce; e formando un' altra incrociatura si sale al di sopra del ginocchio, dove si fa un altro giro circolare attorno al garretto;  
in:

indi si scende serpeggiando colla fascia all' estremità del troncone, e si risale per dolabre per terminare la fascia attorno al ginocchio.

### *Della fasciatura unitiva pel labbro leporino.*

Dopo aver posto sopra la cucitura i due capi del filo annodati una piccola compressa, si pone un piccolo piumaccio di disteso un balsamo glutinoso, su questo un cerotto; indi una piccola compressa, il tutto sostenuto colla fasciatura unitiva. Per farla, si prende una fascia lunga quattro braccia, e larga un dito, avvolta a due capi eguali. Si comincia ad applicare il mezzo della fascia sulla nuca, e poi si conducono i due capi dinanzi alla bocca, facendone passare uno dentro l'altro per una fessura, che a questo effetto sarà fatta a un capo della fascia, ed in seguito stringendo alquanto la fascia, si fanno riaccostare i labbri della ferita, e si finisce la fasciatura con delle voltate in giro attorno alla testa.

### *Fasciatura molto atta per la fistola all' ano.*

Per fare questa fasciatura, si prende una salvietta la quale si piega per lo lungo a quattro doppi, e si mette intorno al corpo del malato in forma di una cigna, sostenendola per mezzo di uno scapolare, che vi si cucirà per di dietro, dove si cuciono ancora tre, o quattro capi di nastro, che serviranno anch' essi a qualche uso. Dopo di questo si prende una fascia larga cinque, o sei dita, e lunga due braccia in circa, la quale si taglia nel mezzo per lo lungo, in maniera che resti la lunghezza di otto, o dieci dita senza tagliare da un capo, e da quel capo vi si cuciono tre, o quattro capi di nastro per legarli con quelli, che son dietro alla salvietta, fermando gli altri due capi della fascia alla cintura davanti. Con questo metodo si può cambiar la fasciatura quando si voglia, e ristingerla ancora senza muovere il malato dalla sua positura. Il punto d' appoggio di questa fasciatura resta sulle spalle, e per questo ella è eccellente, per-

perchè essendo stabile la fascia, viene a premere maggiormente l' apparecchio ..

### *Della Fasciatura per le malattie della Verga .*

Dopo fatta qualche incisione alla verga , e lasciato scolare alquanto il sangue per iscaricarne la parte , si medica con un piumacciuolo coperto di qualche medicamento , e sopra un cerotto fatto a croce di Malta con un buco nel mezzo per l' esito dell' orina , e sopra piccola compressa della stessa figura , e inzuppata nella posca , o nell' acquavite ; indi si prende una piccola fascia lunga un braccio , e larga un dito , la quale si avvolge intorno alla verga ; si mette la verga in appresso in un piccolo sosensorio , fermandolo alla cintura con una fascia circolare .

### *Delle fasciature non usitate .*

#### *Del Descrimen pel salasso della fronte .*

Per fare questa fasciatura , si prende una fascia lunga quattro braccia , e larga due dita avvoltata a un capo . Si comincia ad applicare la fascia sulla fronte nel luogo del salasso , lasciando pendere l' estremità della fascia sul viso ; si conduce in seguito il capo della fascia lungo la futura sagittale , fino alla nuca , e si termina la fascia con de' giri circolari intorno alla testa , avendo osservato di rovesciar l' estremità pendente sul viso sopra la testa , soprapponendovi la fascia co' giri circolari .

#### *Dello Scafa pel medesimo salasso .*

Per fare questa fasciatura , si prende una fascia simile alla precedente , lasciandone pendere similmente l' estremità sul viso , ed in appresso in vece di andare sulla futura sagittale , si va sulla parte media del parietale destro , per fare un giro circolare intorno alla testa , si ro-  
ve-

vescia indi l'estremità della fascia, che pende sul viso sulla parte media del parietale sinistro, di maniera che si forni uno spica sulla testa, e si finisce il restante della fascia con de' giri circolari intorno alla testa.

*Dell' Occhio doppio a due capi per le  
malattie degli occhi .*

Questa fasciatura non differisce da quella, che abbiamo descritta di sopra, che perchè la fascia è avvoltata a due capi, in vece che l'altra non è che a un solo; le dolabre deono essere similmente sulle guancie, e le incrociature sul naso.

*Del Fosso d' Amintas a due capi per le  
malattie del naso .*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga sei braccia, e larga un dito traverso, che si avvolge a due capi uguali. Si comincia ad applicar la fascia trasversalmente sull'estremità del naso, indi si conducono i due capi alla nuca dove s'incrociano, per venire per davanti passando sotto gli angoli della mascella inferiore, si sale lungo le guancie per venire a incrociare sulla radice del naso, di maniera che il capo, che viene dal lato destro, passa sulla parte media del parietale sinistro, e quello, che viene dal lato sinistro, passa sulla parte media del parietale destro, e si finisce con de' giri circolari intorno alla testa.

*La medesima Fasciatura a un capo .*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga, e larga quanto la precedente avvoltata a un capo. Si comincia ad applicare l'estremità della fascia sul naso, e si conduce fino alla nuca, passando lungo la sutura sagittale; si segna il luogo della fascia, che tocca la nuca, e si viene a ricominciare all'estremità del naso, lasciando pendere la lunghezza della fascia, che si è misu-

ra-

rata sopra lo sterno, e si continua dall'estremità del naso, passando la fascia fino alla parte media del parietale destro, o sinistro, e indi si passa per di dietro l'orecchio, e sull'estremità del naso, facendo due giri trasversalmente. Si viene indi a passare sotto l'angolo della mascella, osservando di rovesciare l'estremità della fascia, che pende sopra lo sterno, e si sale indi colla fascia, che è passata sotto l'angolo della mascella, sulla radice del naso, intrigando l'estremità della fascia, che è stata rovesciata, e si continua lungo la parte superiore del parietale opposto, per andare alla parte posteriore della testa, e ritornare indi per davanti a passare sulla radice del naso per formarvi una incrociatura, e indi discendere lungo la guancia per passare sotto l'altro angolo della mascella, e indi finire con de' giri circolari intorno alla testa.

### *Del Sospensorio delle Mammelle a un capo.*

Per fare questa fasciatura, si prende una fascia lunga otto braccia, e larga quattro dita traverse. Si comincia ad applicar la fascia intorno alle mammelle; indi si sale sulla testa dal lato malato, e si scende sotto l'ascella del medesimo lato per venire a sospendere la mammella malata salendo sulla spalla dal lato opposto, e poi discendere sotto l'ascella del medesimo lato, per venire a passare per davanti sopra la mammella sana, e fare un'incrociatura dalla medesima parte sullo sterno. Si passa in appresso sulla spalla del medesimo lato della malattia, e si ritorna sotto l'ascella del medesimo lato per sospendere una seconda volta la mammella malata, salendo sulla spalla dal lato opposto, e venire per davanti, passando sotto l'ascella, si rimonta sopra la spalla dal medesimo lato, per incrociare per di dietro fra le spalle, indi si passa sotto l'ascella dal lato opposto alla malattia, per venire per davanti, conducendo la fascia trasversalmente sopra le due mammelle, si passa sotto l'ascella dal lato della malattia, per finire con de' giri circolari intorno al corpo.

*Del*

### *Della Cappellina per le fratture della Clavicola.*

Per fare questa fasciatura, si prende la medesima fascia, che per lo spica rovesciato per la medesima frattura, della quale abbiain già parlato di sopra; che si avvolta a due capi, cioè un piccolo di due braccia in circa, e un grosso col restante della fascia; si comincia ad applicare la fascia per davanti, in maniera, che il piccolo capo si trovi sotto l'ascella opposta alla malattia; si sale col capo grosso lungo lo sterno per di sopra la spalla dal lato malato per discendere sotto l'ascella del medesimo lato, e risalire sulla spalla per incrociar la fascia, andando per di dietro ad aggiungere l'ascella opposta alla malattia, si va sempre attorno al corpo col capo grosso, passando sopra il piccolo capo, il quale si rovescia sulla frattura, formando una dolabra per passare sulla spalla, e discendere in seguito sopra l'angolo inferiore della scapula dal lato malato, e si scende col capo grosso per di dietro per venire a passar sotto l'ascella dal lato malato, e passare sul piccolo capo, il quale si rovescia sul petto, formandò una seconda dolabra per giungere alla spalla opposta al male; il capo grosso, che si trova per di dietro, si conduce per davanti, passando sotto l'ascella opposta al male, passando sul piccolo capo, il quale si rovescia di nuovo sul petto, formandò ancora una dolabra, per giungere alla spalla dal lato malato, dove il piccolo capo deve terminare; e col capo grosso si risale sulla spalla opposta al male; per discendere per di dietro, e passare sotto l'ascella dal lato malato, si risale sopra la medesima spalla per tirarla all'indietro, e poi discendere per di dietro, e passare sotto l'ascella dal lato malato, si rimonta sulla medesima spalla, per tirarla similmente all'indietro; si scende per di dietro per andare a passare sotto l'ascella opposta al male, e venire per davanti a passare sul petto, formandò una dolabra più grande dell'altre; si sale sopra la spalla dal lato del male per discendere alla parte posteriore del braccio, si fa un giro circolare attorno al braccio, passando sul ventre del muscolo bicipite, si va per di dietro at-

tor.

torno al corpo , per venire per davanti a passare sul braccio dal lato della malattia per tenerlo fermo , e accosto lungo le costole , ed indi si termina la fascia con de' giri circolari attorno al corpo passando sempre sopra il braccio dal lato malato .

### *Della Fromba per la Litotomia .*

Per far questa fasciatura , si prende una fascia lunga tre braccia , e larga cinque , o sei dita traverse , la quale si fende ad ogni estremità , formando quattro capi . Si comincia ad applicarla per lo lungo sopra le nariche accanto all' ano , e si conducono i due capi superiori attorno alla cintura per annodarli per davanti , dopo averne fatto passar uno nel collare di miseria , nel quale il malato vi ha passato il capo . Indi si conducono gli altri due capi fra le coscie per incrociarli sul perineo , conducendoli al di sopra dell' inguine da ogni lato per attaccarli alla cintura , cioè a dire , a' due capi superiori .

### *Del Sospensorio dello Scroto colla fascia .*

Per farlo , si prende una fascia lunga quattro braccia , e larga quattro dita traverse . Si comincia ad applicar la fascia attorno alla cintura , dove si fanno due giri , indi si va sull' inguine per discendere in linea diritta per di sotto lo scroto , e si risale dall' altro lato , sospendendo lo scroto , e ascendendo in linea diritta sino alla cartilagine Xifoide ; si rovescia la fascia per discendere pel medesimo giro sotto lo scroto , e si risale dall' altra parte al di sopra dell' inguine , si rovescia la fascia per andare per la parte posteriore a finire attorno alla cintura ; il giro , che si è fatto salire sino alla cartilagine Xifoide , serve per alzare , o abbassare lo scroto , secondo il bisogno . Questa fasciatura non si adopra , che in caso di una grande infiammazione , e che il malato resti nel letto .

NOMI DEGLI AUTORI  
CITATI NEL  
MANUALE DI OPERAZIONI  
DI CHIRURGIA.

- A**ccad. Reale delle Inscrizioni.  
 Acquapendente [Fabricio d'].  
*Aët. Med. Berolinens.*  
 Albino.  
 Albucasis.  
 Alessandro Benedetto.  
 Alghisi.  
 Anel.  
 Antonio Maltre Jan.  
 Aranzio.  
 Arnaud.  
 Assaggi di Med. d' Edimb.  
 Avicenna.  
 Barbeta.  
 Bartolini ( Tommaso ).  
 Bauhino.  
 Bernardo Suavo.  
 Bertrandi.  
 Bidloo.  
 Bienaïse.\*  
 Bineau.  
 Binninger.  
 Blasio.  
 Blegny.  
 Boerhaawe.  
 Bonet.  
 Borelli [ Petr. ].  
 Botal.  
 Branca Siciliano.  
 Brisseau.  
 Brunner.  
 Camerario [ R. J. ].  
 Catherwood.  
 Celso [ Cornelio ].  
 Cheselden.  
 Collot.  
*Commercium litterarium.*  
 Cortesio [ Gio. Batista ].  
 Crollo.  
 Daviel.  
 Decker.  
 Denis.  
 Deobelio.  
 Dethardingio.  
 Diemerbroeck.  
 Dionis.  
 Divoux.  
 Douglas.  
 Duverney.  
*Efemeridi d' Alemagna.*  
 Egineta [ Paolo ].  
 Eistero.  
 Elia Cols de Vilars.  
 Elvezio.  
 Elwigio.  
 Erasistrato.  
 Favelet.

Feh-

Febrio [ Joh. Mich. ].  
 Fernelio.  
 Fieno.  
 Fontano.  
 Foresto.  
 Foubert.  
 Fra Jacobo Beaulieu.  
 Franco. [ Pietro ].  
 Freind.  
 Galeno.  
 Garegeot ( de ).  
 Gio. de Romanis.  
 Giorgio Lothus.  
 Giornali d' Alemagna.  
 Giornali de' Letterati.  
 Giulio Alessandrino.  
 Giulio Cesare Claudino.  
 Gormelino.  
 Goulard.  
 Gourfaud.  
 Greenfield.  
 Griston [ Gio. ].  
 Gruelingio.  
 Guenin.  
 Guidone.  
 Guido da Gauliaco.  
 Guillemean.  
 Gunzio.  
 Habicot.  
 Hagendorn.  
 Helmont [ Gio. B. ].  
 Heurnio [ J. ].  
 Houllier.  
 Hoorn.  
 James. *Dist. univ. de Med.*  
 Ildano [ Fabr. ].  
 Ippocrate.  
*Istoria dell' Acad. R. delle Sc.*  
 Junckers.  
 Jussieu.  
 Kerkeringio.  
 La Charriere [ de ].

La Faye [ de ].  
 Lambert.  
 La Motte [ de ].  
 Lancisi.  
 Langio.  
 Lankisch.  
 Lasnier.  
 Le Dran.  
*Le Novità giornaliere.*  
 Levret.  
 Maggio [ Bartol. ].  
 Malaval.  
 Manget. *Bibliot. Chir.*  
 Mariano Santo Bartolitano.  
 Marchetti [ Pietro de ].  
 Mauriceau.  
 Meekren.  
*Mem. dell' Acad. R. delle Sc.*  
*Mem. dell' Acad. R. di Chir.*  
 Mercuriale.  
 Mery.  
*Miscell. Natur. curios.*  
 Mizaldo.  
 Moinichen.  
 Monro.  
 Montuus.  
 Morand.  
 Muralte [ J. ].  
 Musa Brasavole [ Ant. ]  
 Musgrave.  
 Musitano ( Carlo ).  
 Muys.  
 Niccola Fiorentigo.  
 Nuck ( Antonio ).  
 Offmanno ( Federigo ).  
 Olao - Rudbeck.  
 Orazio Augenio.  
 Palfin ( J. ).  
 Pareo ( Ambr. ).  
 Pavonio ( Bald. ).  
 Pechlini.  
 Perchet.

Pe-

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Petit .                  | Sharp .                          |
| Peu .                    | Simbaldi .                       |
| Pigray .                 | Solingen .                       |
| Pinet .                  | Stahl .                          |
| Platneri .               | Stalpart - Wander - Wiel .       |
| Plinio .                 | Suetone .                        |
| Plutarco .               | Tagliacozio .                    |
| Pozzis ( Ant. ) .        | Teichmeiero ( H. F. ) .          |
| Quesnay .                | Tertulliano l' Africano .        |
| Rau .                    | Thevenin .                       |
| Reinaud ( Teofilo ) .    | Thibaur .                        |
| Reneaume de la Garence . | Thonero .                        |
| Rhodio .                 | Tolet .                          |
| Riedlino .               | Tornamira .                      |
| Riolano .                | <i>Trasfazioni filosofiche</i> . |
| Riviera .                | Tryphon .                        |
| Roderico - a - Castro .  | Tulpio .                         |
| Roger Hempfing .         | Tyzon .                          |
| Rolfincio .              | Vacher .                         |
| Rondelet .               | Vanhorne .                       |
| Roonhuijer .             | Van - Swieten ( de ) .           |
| Rouffeto .               | Vatero .                         |
| Ruffo .                  | Verdier .                        |
| Ruleau .                 | Verduc .                         |
| Ruyfchio .               | Verduin .                        |
| Sabourin .               | Vesalo ( And. ) .                |
| Sala ( Gio. Dom. ) .     | Veschio ( Giorgio ) .            |
| Saviard .                | Volteri .                        |
| Schenckio -              | Voolhouse .                      |
| Schroeckio .             | Wedelio .                        |
| Schurrigio .             | Welschio .                       |
| Scipio Mercurio .        | Wepfher ( J. Jac. ) ♦            |
| Scultet .                | Wiero .                          |
| Sennert .                | Willisio ( Tom. ) .              |
| Severino .               | Winslow .                        |

## I N D I C E

*De' Capitoli contenuti in questo Tomo, e delle  
Osservazioni, e cose notabili, che si  
trattano in essi.*

---

## CAPITOLO I.

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>D</b> ell' operazione della Litotomia, o Cystotomia. | 1. |
| Del piccolo Apparato, o Hypo - Kisteo - tomia.          | 3. |
| Del grande Apparato, o Urethro - tomia.                 | 4. |
| Dell' Apparato Laterale, o Urethro - Kisteo - tomia.    | 7. |

## O S S E R V A Z I O N E I.

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Dell' estrazione delle pietre di una enorme grossezza. | 12. |
|--------------------------------------------------------|-----|

## O S S E R V A Z I O N E II.

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Sopra il medesimo soggetto. | 13. |
|-----------------------------|-----|

## O S S E R V A Z I O N E III.

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dell' estrazione di 24. pietre trovate nella vescica di una donna di anni 81. | ivi. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|

## O S S E R V A Z I O N E IV.

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Di molte pietre ritenute nella vescica, e involuppate ciascuna d' una membrana, e aderenti alla vescica. | 14. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## O S S E R V A Z I O N E V.

*Sopra il medesimo soggetto .* 15.

## O S S E R V A Z I O N E VI.

*Sopra il medesimo soggetto .* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E VII.

*Sopra il medesimo soggetto .* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E VIII.

*Sopra il medesimo soggetto .* 18.

*Dell' alto apparato , o Epi - Kysteo - tomia .* 18.

## O S S E R V A Z I O N E I.

*Di un Giovane , a cui gli fu fatta l' operazione della Lisotomia all' alto apparato , con prospero successo .* 20.

## C A P I T O L O II.

*Della maniera di estrarre il calcolo fuori dell' uretra .* 22.

## C A P I T O L O III.

*Della maniera di estrarre la pietra alle donne .* 24.

## O S S E R V A Z I O N E I.

*Di una soppressione d' orina a una giovane , onde il Chirurgo ignorante per siringarla , introdusse la siringa nella vagina , in vece di introdurla nel meato urinario .* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E II.

*Sopra l'imperizia di un Chirurgo , che prese il meato urinario per una fistola nella vulva .* 25.

## O S S E R V A Z I O N E III.

*Sopra l'ignoranza d'un praticante , che amputò la Clitoride , le Ninfe , e le Caruncole mirtiformi , avendo prese le dette parti per dell' escrescenze carnosè contro natura .* 26.

## O S S E R V A Z I O N E IV.

*Di una pietra cavata dalla vescica per la vagina .* 29.

## C A P I T O L O IV.

*Dell' Operazione della Nefrotomia .* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E I.

*Di un uomo ferito al dorso nella regione del Rene destro ; ed usciva dalla ferita , e dall' uretra del sangue , e dell' orina sanguinosa , felicemente guarito .* 30.

## O S S E R V A Z I O N E II.

*Di un tumore nella region lombare , in conseguenza d'una total soppressione d' orina , il quale venne a suppurazione , e si estrassero per mezzo di un' incisione due pietre , con felicissimo successo .* 31.

## O S S E R V A Z I O N E III.

*Sopra il medesimo soggetto .* 32.

## O S S E R V A Z I O N E IV.

*Sopra il medesimo soggetto .* 35.

OS-

## OSSERVAZIONE V.

*Sopra il medesimo soggetto.* 36.

## OSSERVAZIONE VI.

*Sopra il medesimo soggetto.* 37.

## OSSERVAZIONE VII.

*Sopra il medesimo soggetto.* 39.

## CAPITOLO V.

*Dell' Operazione dell' Acrotetriasmo , o dell' amputazione,  
e tie' casi, che la richiedono .* 42.

## OSSERVAZIONE I.

*D' una riunione di un colpo d' asce , che aveva tagliato  
obliquamente , ed affatto l' osso , e tutt' i muscoli .* 47.

## OSSERVAZIONE II.

*D' una separazione di una gamba dal ginocchio , cagio-  
nata dallo Sfascio .* 49.

## OSSERVAZIONE III.

*Sopra il medesimo soggetto.* 50.

## OSSERVAZIONE IV.

*Di una separazione de' due subiti , da' gemiti , cagionata  
da una cancrena .* 51.

## OSSERVAZIONE V.

*Di una cancrena venuta al piede di un uomo , e che s'  
avan-*

*avanzò fino nel mezzo della gamba, ove si terminò,  
e il piede si distaccò da se.*

51.

## OSSERVAZIONE VI.

*Sopra il medesimo soggetto.*

ivi.

## OSSERVAZIONE VII.

*Di uno Sfascio allo scroto cagionato dal terrore.*

52.

## OSSERVAZIONE VIII.

*Di un braccio paralitico, accompagnato di attacchi d'apoplezia, cagionati dalla collera.*

ivi.

*Dell' amputazione della gamba.*

53.

*Dell' amputazione della coscia.*

62.

## OSSERVAZIONE I.

*Intorno a un risalto d'osso, che era rimasto dopo l'amputazione d'una coscia.*

65.

*Dell' amputazione del braccio.*

66.

*Dell' amputazione del cubito.*

68.

*Dell' amputazione del braccio nell' articolazione.*

70.

## CAPITOLO VI.

*Dell' Operazione dell' Aneurisma.*

73.

## OSSERVAZIONE I.

*Di un Aneurisma dell' aorta.*

75.

OS.

## O S S E R V A Z I O N E II.

*Di un Aneurisma al braccio destro , cagionato da una fioccata .* 80.

## C A P I T O L O VII.

*Dell' Operazione della sutura del tendine ,* 87.

## C A P I T O L O VIII.

*Dell' Operazione del Panariccio .* 91.

*, Dell' Estrazione de' corpi estranei , e de' differenti mezzi , de' quali uno si serve ordinariamente per estrarli quando sono rimasti nell' esofago , e nella trachea , dove si fa conoscere il buon effetto degli uni , ed il cattivo esito de'ii altri .* 98.

## O S S E R V A Z I O N E I.

*Di un giovane , che ingoliò un piccolo osso , il quale si fermò nell' esofago .* 99.

## O S S E R V A Z I O N E II.

*Di un calzolaio , che nel ridere inghiottì un pezzetto di cuojo , che teneva in bocca , e si fermò nell' esofago .* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E III.

*Di un lavorante di un sarto , che ebbe a restar soffogato da un pezzo di trippa , che non avea finito di masticare .* 100.

## O S S E R V A Z I O N E IV.

*Di un bambino , che giocando con delle monete d' argento ne ingoliò due , o tre , che egli rese per siccio .* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E V.

*Di un uomo sdentato affatto, che ingollò un pezzo grosso di corteccia di pan duro, che rimase in fondo all'esofago.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E VI.

*Di una donna gravida, che mangiò delle meluzzi acerbissime, e durissime, delle quali alcuni pezzi le restarono al di sotto della faringe.* 103.

## O S S E R V A Z I O N E VII.

*Di un bambino, che ingollò un confetto, il quale gli restò in gola.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E VIII.

*Di un uomo, che inghiottì un boccone un po troppo grosso d'una spalletta di montone, che gli restò nell'esofago.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E IX.

*Di un uomo, che prese a ingollare un uovo di gallina intero; gli restò nell'esofago, e premè sì forte la trachea, che restò istantaneamente soffogato.* 104.

## O S S E R V A Z I O N E X.

*Di una ragazza, che nel vomitare, un pezzo di polmone di bue, che avea mangiato avanti, nello sforzo, che ella faceva nel vomitare, fu rispinto nell'esofago, dove si fermò, e cagionò de' pericolosi sintomi.* 105.

## O S S E R V A Z I O N E XI.

*Di un bambino, che morì per avere inghiottito una moneta ben piccola, che turava affatto il piloro.* 106.  
OS-

## O S S E R V A Z I O N E XII.

*Di una donna , che avea in gola una spina lunga due dita , la quale fu tirata fuori colle dita .* 108.

## O S S E R V A Z I O N E XIII.

*Di un uomo , che ingollò un pezzo d' osso ben lungo , e appuntato alle due estremità , il quale restò intrigato nell' alto dell' esofago .* 109.

## O S S E R V A Z I O N E XIV.

*Sopra il medesimo soggetto .* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E XV.

*Sopra il medesimo soggetto .* 110.

## O S S E R V A Z I O N E XVI.

*Di un contadino , che nel mangiar la zuppa con troppa ingordigia , inghiottì un grosso spillo , che gli restò nell' esofago .* 112.

## O S S E R V A Z I O N E XVII.

*Di un giovane , che nel mangiar de' cavoli , ingollò un piccolo osso , il quale si fermò nel esofago .* 113.

## O S S E R V A Z I O N E XVIII.

*Di un bambino , che ingollò un nocciolo di pesca , il quale si fermò nella faringe .* 114.

## O S S E R V A Z I O N E XIX.

*Di una Dama , che ingollò molti spilli , che aveva in bocca , i quali cagionarono acutissimi dolori nell' esofago , e de' dolori pungentissimi in senao allo stomaco , ed in qualche parte del ventre ; e non ne restò libe-*

ra di questi accidenti , che dopo sei anni, che ella rese gli spilli . ivi.

### • OSSERVAZIONE XX.

Di una ragazza , che rese per secesso più di cinquanta aghi di differenti lunghezze , che ella avea ingollati cinque, o sei anni avanti . 115.

### • OSSERVAZIONE XXI.

*Di un uomo , che nel fumare , cadde colla faccia innanzi in terra , se gli ruppe la pipa, ed un pezzetto della canna gli restò in fondo alla gola .* 116.

### • OSSERVAZIONE XXII.

*Di un pastore , a cui alcuni ladri fecero ingollare per forza un coltello lungo mezzo piede , col manico di corno .* ivi.

### • OSSERVAZIONE XXIII.

*Di un contadino , che aveva dato un po di volta al cervello , il quale ingoldò il ferro da affilare d' uno strascino , che i macellaj soglion tener sempre a cinto .* ivi.

### • OSSERVAZIONE XXIV.

Di una Signorina , che avendo inghiottito uno spillo , si fece sentire più di un anno dopo vicino all' articolazione delle clavicole collo sterno ; tre mesi dopo il detto spillo si avanzò nella sostanza adiposa sotto la pelle , che copre la punta della spalla , e per mezzo d' una piccola incisione fu estratto lo spillo . 118.

### • OSSERVAZIONE XXV.

Di un bambino , che ruzzando ingoldò un ago da resta più di due dita lungo , il quale rese per il canale dell' uretra coli' orina , cinque anni dopo . 119.  
OS-

## O S S E R V A Z I O N E XXVI.

*Di una Signora , che nel mangiare ingollò uno spillo mediceo , il quale rese per urina tre giorni dopo .* 120.

## O S S E R V A Z I O N E XXVII.

*Di un uomo , che avendo ingollato de' piccoli officini , gli rendè tutti per l' uretra .* 121.

## O S S E R V A Z I O N E XXVIII.

*Di un giovane sonando il flauto ricevè uno schiaffo da un suo compagno , che glielo fece entrare in gola ; restò qualche tempo nell' esofago , e cadde in appresso nello stomaco , dove si sentiva dal lato destro a traverso degli integumenti , s' incanalò per la via degli intestini , e lo rese per secesso .* 124.

## O S S E R V A Z I O N E XXIX.

*Di un ballerino , che ingollò una lama di spada lunga due braccia , che egli fracassò avanti in più pezzi : qualche tempo dopo ingollò in presenza del Re a' Inghilterra due coltelli , ed un rasoio ; questi istrumenti furono resi per l' ano tre giorni dopo .* 125.

## O S S E R V A Z I O N E XXX.

*Di un buffone , che ingollò un pezzo di punta di spada tagliente , lungo tre dita in circa , e dodici giorni dopo lo rese per secesso .* 126.

## O S S E R V A Z I O N E XXXI.

*Di un epilettico , che in un accesso della sua malattia ingollò un pajo di cesoje moltissimo appuntate , lunghe quattro dita , e più di due dita larghe , che gli erano state messe fra i denti , affinchè non si mordesse la lingua , le quali uscirono per l' ano in capo a 9. giorni .* 126.

O S .

## O S S E R V A Z I O N E XXXII.

*Di un Ufficiale Spagnuolo, che ingollò na forchetta d' argento, nell' atto che col manico di essa si stava nettando la radice della lingua, la quale rese per l' ano quattordici mesi dopo .*

ivi.

## O S S E R V A Z I O N E XXXIII.

*Di un uomo ubbriaco, che nel mangiar del latte ingollò un cucchiajo, essendogli dato un colpo nel tempo che lo teneva in bocca, il quale uscì il giorno appresso per l' ano .*

127.

## O S S E R V A Z I O N E XXXIV.

*Di un osso, che essendosi fermato nel basso dell' esofugo, fu spinto nello stomaco, il quale si presentò verso l' orifizio del retto, e fu estratto colle mollette .*

ivi.

## O S S E R V A Z I O N E XXXV.

*Sopra il medesimo soggetto .*

128.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVI.

*Sopra il medesimo soggetto .*

ivi.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVII.

*Di un uomo, che ingollò un coltello, che si mise nella gola molto avanti, per eccitare il vomito, il quale si estrasse per mezzo di un' incisione, che si fece agl' integumenti del ventre, e allo stomaco .*

130.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVIII.

*Di una ragazza, che mangiando delle susine, ingollò un nocciolo, che per disgrazia le sdrucchiò nella trachea, il quale uscì per mezzo di un rimedio acrimonio-*

nio-

nioso, e irritante, che le risvegliò una tosse violentissima. 269  
134.

### OSSERVAZIONE XXXIX.

Di un giovanetto, a cui fu gettato in bocca un pisello, che gli entrò nella laringe, il quale uscì per mezzo del vomito. ivi.

### OSSERVAZIONE XL.

Di un bambino, che ingollò un piccolo oggetto, il quale gli entrò nella trachea, ed uscì per mezzo degli starnuti violenti. 135.

Trattato del Salasso, o sia cavata del sangue. 137.

Dell' Origine del Salasso. ivi.

Due sorte di cavata di sangue vi sono. 138.

Dell' Arteriotomia nell' arteria temporale. ivi.

Della Flebotomia. 139.

Del Salasso evacuativo. 141.

Del Salasso Revulsivo. ivi.

Del Salasso Derivativo. ivi.

Del Salasso Spoliativo. 142.

Della cavata di Sangue della fronte. ivi.

Della cavata di Sangue delle Ranule. ivi.

Della cavata di Sangue della Jugulare. 143.

Del-

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>Della cavata di Sangue del Braccio .</u>                                                    | <u>144.</u> |
| <u>Della cavata di Sangue della Mano .</u>                                                     | <u>145.</u> |
| <u>Della cavata di Sangue del Piede .</u>                                                      | <u>146.</u> |
| <u>Degli accidenti , che possono seguire il Salasso .</u>                                      | <u>147.</u> |
| <u>Del Trombus .</u>                                                                           | <u>ivi.</u> |
| <u>Dell' Ecchimoma .</u>                                                                       | <u>ivi.</u> |
| <u>Del tumore Linfatico .</u>                                                                  | <u>148.</u> |
| <u>Della puntura dell' aponeurosi del muscolo Bicipite .</u>                                   | <u>ivi.</u> |
| <u>Raccolta d' Osservazioni molto curiose , ed istruttive per la pratica della Chirurgia .</u> | <u>155.</u> |

### OSSERVAZIONE I.

*Di una soluzione del continuo , che arrivava dalla fronte fino all' occipitate ; e la pelle pendeva da' lati fino sulle spalle .* ivi.

### OSSERVAZIONE II.

*Di un sonno letargico , e perdita della memoria , cagionato da una caduta in dietro dall' altezza di dodici piedi .* ivi.

### OSSERVAZIONE III.

*Di un calcio di un asino ricevuto un pollice in circa sopra l' orbita dell' occhio sinistro , con una ferita considerabile .* 156.

## O S S E R V A Z I O N E IV.

*Di una frattura dell' osso parietale destro, con lesione alla sostanza del cervello, che diventò nera, e corrotta, e n' uscì fuori tutta quella gran porzione, che era cancerenata.* 157.

## O S S E R V A Z I O N E V.

*Di un colpo di pistola, dove una, o due palle trapassarono la trachea, e cagionarono uno spurgo di sangue, e un enfisema, che si stendeva sotto gl' integumenti del collo, della testa, delle braccia, del petto, e del basso ventre.* 158.

## O S S E R V A Z I O N E VI.

*Di una sciabolata sul naso, che lo tagliò dalla radice fino alla commissura delle labbra.* 159.

## O S S E R V A Z I O N E VII.

*Di un colpo di coltello sul naso, che lo staccò quasi affatto.* 160.

## O S S E R V A Z I O N E VIII.

*Di un naso tagliato interamente, il quale fu rifatto, pigliando dal braccio del malato una quantità di carne bisognevole.* 163.

## O S S E R V A Z I O N E IX.

*Di una cascata, nella quale la lingua restò tagliata quasi affatto.* 164.

## O S S E R V A Z I O N E X.

*Di un' archibufata al braccio, seguita da varj accidenti.* 165.

## O S S E R V A Z I O N E X I.

Di un' infiammazione erefiperatosa , che occupava tutta la parte capelluta della testa, e la fronte, che si terminò per suppurazione, seguita di varj accidenti. 167.

## O S S E R V A Z I O N E X I I.

*Di un gran colpo ricevuto all' osso occipitale , che penetrava fino alla sostanza del cervello, del quale uscì fuori una piccola porzione.* 169.

## O S S E R V A Z I O N E X I I I.

*Dell' apertura di un cadavere di un bambino morto d' un idrocefalo, a cui furono trovate nel cervello molte cose notabili.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E X I V.

Di una gamba fracassata, con un' eccessiva contusione, e stracciamento degli ossi, accompagnata da varj accidenti, perfettamente guarita senza la minima deformità. 170.

## O S S E R V A Z I O N E X V.

*Di una stoccata nella parte media inferiore, ed interna del braccio destro, accompagnata da cancrena, ed altri accidenti.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E X V I.

Di un uomo, che si diede diciotto coltellate nel ventre, le quali otto penetravano nella sua cavità con lesione di alcune parti, che rui son contenute, accompagnate di gravi accidenti, nulladimeno il malato guarì perfettamente. 175.

## O S S E R V A Z I O N E XVII.

*Di una donna gravida, che cadde violentemente sulla punta di una palizzata, e si fece una ferita larga due dita, al di sotto dell' ombilico, accompagnata da varj accidenti rimarcabili.* 177.

## O S S E R V A Z I O N E XVIII.

*Di un' ernia formando un tumore, il quale si estendeva dall' inguine sinistro fino nel mezzo della coscia.* 178.

## O S S E R V A Z I O N E XIX.

*Di una ritenzione di urina, che obbligò di fare, al di sopra degli ossi del pube, una puntione nel corpo della vescica col troicart.* 183.

## O S S E R V A Z I O N E XX.

*Di una sfoccata nello stomaco, accompagnata da varj accidenti.* 184.

## O S S E R V A Z I O N E XXI.

*Sopra il medesimo soggetto.* 185.

## O S S E R V A Z I O N E XXII.

*Di un' archibufita nel basso ventre, con lesione dell' arteria ipogastrica, del fondo della vescica, e dell' osso sacro, accompagnata da varj accidenti gravissimi.* 186.

## O S S E R V A Z I O N E XXIII.

*Sopra il medesimo soggetto,* 187.

## OSSERVAZIONE XXIV.

*Di un pezzo di legno di una carretta, la quale rovesciandosi entrò nella testa di una fanciulla, che vi era sopra, sicchè ruppe in varj pezzi il cranio, lacerò la dura, e la pia-madre, e cagionò un' effusione della sostanza del cervello,* 188.

## OSSERVAZIONE XXV.

*Di una caduta sulla testa, nella quale la metà del coronale, i due parietali furono spogliati della cosenna capelluta, e del pericranio, la pelle totalmente sollevata, ed il tutto trovavasi nel cappello del ferito.* ivi.

## OSSERVAZIONE XXVI.

*Di una caduta di molto alto, nella quale la tibia forando gl' integumenti, non solamente uscì della lunghezza di 3., o 4. dita; ma s' affondò nella terra. La fibula si ruppe due dita in circa distante dall' articolazione.* 190.

## OSSERVAZIONE XXVII.

*Di un braccio rotto in due luoghi, nel volere il malato mettere un guanto dalla parte in, cui era da due mesi travagliato da un dolore ottuso, per il quale non avea fatto verun rimedio.* ivi.

## OSSERVAZIONE XXVIII.

*Di una caduta, nella quale la parte media della gamba urtò vivamente, e vi si fece un tumore lungo la sua parte anteriore con ecchimoma, e qualche tempo dopo, il malato credendo esser guarito, gli apparì una frattura in lungo molto distesa.* 191.

## OSSERVAZIONE XXIX.

*Di un giovine, a cui una ruota di carretta ruppe la gam-*

*gamba sinistra, verso la sua parte inferiore, con fe-*  
*vra.* 275.  
192.

### OSSE R VA Z I O N E XXX.

*Di un calcio d' un cavallo ricevuto verso la parte media della gamba, che fu seguito incontenente da un dolore vivissimo, ed acutissimo, e la pelle della detta parte diventò arida, secca, di color di limone, durissima, ed insensibile, la quale fu portata via come cancrena secca.* ivi.

### OSSE R VA Z I O N E XXXI.

*Di una donna, che avendole fatte le unzioni mercuriali, le sopravvenne un' ulcera alla gengiva, sopra uno de' lati della mascella inferiore; una porzione di quest' osso era allo scoperto, e si separò dalla parte sana la metà della mascella.* 193.

### OSSE R VA Z I O N E XXXII.

*Di un pittore, che cadde da un calesse; la ruota gli passò sopra tutta l' estensione del petto dal lato destro, e gli fratturò la clavicola, tutte le vere costole, e le prime delle spurie.* 194.

### OSSE R VA Z I O N E XXXIII.

*Di un particolare, che volendo fermare i cavalli di una carrozza, fu rovesciato in terra, e la ruota anteriore gli passò sulla parte media della gamba, onde i due ossi furono fratturati, donde ne seguirono varj accidenti.* 195.

### OSSE R VA Z I O N E XXXIV.

*Di una frattura all' omero distante due dita trasverse dalla sua articolazione col cubito, accompagnata da varj accidenti.* 196.

## O S S E R V A Z I O N E XXXV.

*Di un vetturino, che ebbe il condile esterno del femore separato totalmente per lo lungo da una ruota di una carretta, con ferita, rottura de' ligamenti, e di molti tenaini; il che cagionò de' pericolosissimi accidenti.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVI.

*Di un tumore frigido al cubito.* 197.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVII.

*De' dolori alle braccia, accompagnati da diversi accidenti.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E XXXVIII.

*Dell' osso parietale destro forato nel mezzo da una freccia armata di un ferro molto acuto, il quale avendo voluto ritirare, egli restò nella ferita, il legno essendosi rotto vicino al ferro.* 198.

## O S S E R V A Z I O N E XXXIX.

*Di una fioccata ricevuta alla gola, che tagliò una parte della trachea, e una delle vene jugulari.* 199.

## O S S E R V A Z I O N E XL.

*Di un calcio di un mulo, onde la fronte ebbe frattura, e sfondamento.* 200.

## O S S E R V A Z I O N E XLI.

*Di una sciabolata, la quale tagliò una porzione dell' osso frontale di circa tre dita di lunghezza, e altrettanto di larghezza, di modo che si vedeva tutta scoperta la dura-madre.* ivi.

OS-

## OSSERVAZIONE XLII.

*Di una ragazza, che ricevette diciotto stoccate al capo, senza contare molte altre alle braccia, e al corpo.* 201.

## OSSERVAZIONE XLIII.

*Di una caduta sul capo, in conseguenza della quale sopravvennero la febbre, il delirio, ed altri terribili accidenti.* ivi.

## OSSERVAZIONE XLIV.

*Di un colpo di una palla di legno ricevuto alla parte sinistra dell' osso coronale, accompagnato da varj accidenti.* ivi.

## OSSERVAZIONE XLV.

*Di un colpo di una palla di ferro, che pesava più di una libbra, e mezza, ricevuto all' osso parietale sinistro; il cranio ne fu considerabilmente sfondato, e fratturato.* 202.

## OSSERVAZIONE XLVI.

*Di un colpo ricevuto all' osso parietale destro, il quale vi fece una contusione accompagnata da frattura, e da sfondamento dell' osso.* ivi.

## OSSERVAZIONE XLVII.

*Di una cura ardita d' un canchero alla lingua.* 203.

## OSSERVAZIONE XLVIII.

*Di un braccio totalmente fracassato.* ivi.

## O S S E R V A Z I O N E XLIX.

- Di un' archibugiata ricevuta sopra i seni sopraciliari, ad  
disopra della radice del naso, che fracassò la parte  
anteriore di questa cavità, la parte superiore degli ossi  
del naso, ed anche una porzion dell' orbita dal lato  
destro, al luogo del gran angolo.* 204.
- Trattato delle fasciature in generale.* 209.
- Delle fasciature per la Testa.* 211.
- Del piccolo Copri-Capo in triangolo, per tutte le ferite  
della testa.* ivi.
- Del gran Copri-Capo.* 212.
- Della Cappellina a due capi, o sia Berretto d' Ippocrate  
per gli scostamenti delle suture del cranio, e per l'  
aducefalo.* 213.
- Della Fromba a quattro capi, per le ferite semplici della  
testa.* ivi.
- Della fasciatura di Galeno, o sia de' poveri, chiamata la  
Fromba a sei capi, per tutte le malattie della testa.* 214.
- Della fasciatura unitiva, o incarnativa a due capi, per  
riunire tutte le ferite longitudinali, ed oblique, che  
possono succedere sopra tutte le parti del corpo.* 215.
- Della fasciatura chiamata l' occhio semplice, per le malat-  
tie, che attaccano un sol occhio.* 216.
- Della fasciatura chiamata l' Occhio doppio a un capo,  
per le malattie d' ambedue gli occhi.* ivi.

Del

Del Monocolo per la fistola lacrimale, e per tutte le malattie degli occhi. 217.

Del Binocolo, per tutte le malattie degli occhi. ivi.

Della Fromba per le fratture del naso, o per contenere l'apparecchio nelle ferite di questa parte, e dopo l'estirpazione del polipo. 218.

Della fasciatura chiamata lo Sparviere, per le ferite, e le fratture degli ossi del naso. 219.

Del Capestro semplice per la frattura della mascella inferiore, o quando è lussata dall'uno, o dall'altro lato. 220.

Del Capestro doppio a un capo per la mascella inferiore fratturata da' due lati. ivi.

Del Capestro doppio a due capi, per le medesime fratture. 221.

Della Fromba a quattro capi, per la lussazione, e per la frattura obliqua della mascella inferiore. ivi.

Del Solare per l'apertura dell'arteria temporale. 222.

Del Retentivo del collo pel salasso della vena jugulare. 223.

Del Divisivo del collo per le ferite della parte anteriore, e posteriore del collo. ivi.

Del Sospensorio a quattro capi pel canchero della mammella. 224.

Della Fasciatura da corpo collo Scapolare per le malattie del petto, e del basso ventre. 225.

Degli Scapolari. ivi.

Del-

- \* Dello Spica per la lussazione dell' omero, e per la frattura dell' acromion. 226.
- Dello Spica rovesciato per la frattura della clavicola. 227.
- Del Quadriga, o Catafratta per le fratture, e lussazioni delle costole. 228.
- Della fascia del braccio colla salvietta per le malattie del braccio, del cubito, e della mano. 229.
- Della fasciatura col fazzoletto per le medesime malattie. ivi.
- Della Stella semplice per le fratture delle scapole, e per le ferite dello sterno. 230.
- Della stella doppia per la lussazione dell' omero, per le fratture delle clavicole, e per le ferite, che traversano il petto nella sua parte superiore. ivi.
- Della fasciatura per le fratture semplici dell' omero. 231.
- Della dolabra per la lussazione del cubito. 232.
- Della Dolabra per l' aneurisma. 233.
- Della Dolabra per la lussazione del pugno. ivi.
- Della Dolabra per la frattura del carpo, e metacarpo. 234.
- Del mezzo Guantelletto per la lussazione delle prime falange delle dita cogli ossi del metacarpo. ivi.
- Del Guantelletto intiero per le lussazioni, per le fratture, e per le scottature delle dita. 235.
- Del mezzo Guantelletto per le malattie del pollice. ivi.
- Del

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Del Rovesciato pel Salasso della salvatella.</u>                                     | 236. |
| <u>Del Sospensorio dello scroto.</u>                                                    | ivi. |
| <u>Della fasciatura pel bubbone, e le malattie delle anguinalie.</u>                    | 237. |
| <u>Del T doppio per la Litotomia, e le malattie del perineo.</u>                        | ivi. |
| <u>Dello Spica del bubbonocelo per la castrazione.</u>                                  | 238. |
| <u>Dello Spica per la lussazione del femore.</u>                                        | ivi. |
| <u>Della Dolabra per la lussazione del ginocchio.</u>                                   | 239. |
| <u>Della fasciatura unitiva per la frattura longitudinale della rotola.</u>             | ivi. |
| <u>Della fasciatura chiamata Testuggine per la lussazione della rotola.</u>             | 240. |
| <u>Della fasciatura chiamata il chiasstro per la frattura trasversale della rotola.</u> | ivi. |
| <u>Della Dolabra per la lussazione del tarso, e del metatarso.</u>                      | 241. |
| <u>Della Staffa pel salasso del piede.</u>                                              | ivi. |
| <u>Della fasciatura circolare per le fratture complete, e incomplete della gamba.</u>   | 242. |
| <u>Della fasciatura a 18. capi per le fratture complete della gamba.</u>                | 243. |
| <u>Della fasciatura pel salasso del braccio.</u>                                        | 244. |

• Del-

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Della Cappellina a un capo per l' amputazione del braccio .</i>                   | 245.        |
| <i><u>Della Cappellina a due capi per l' amputazione del braccio .</u></i>           | <u>246.</u> |
| <i><u>Della Cappellina a due capi per l' estirpazione del braccio .</u></i>          | <u>247.</u> |
| <i><u>Della Cappellina a un capo , e a due per l' amputazione della coscia .</u></i> | <u>248.</u> |
| <i>Della Cappellina a un capo per l' amputazione della gamba .</i>                   | ivi.        |
| <i><u>Della fasciatura omittiva pel labbro leporino .</u></i>                        | <u>249.</u> |
| <i><u>Di una fasciatura molto atta per la fistola all' ano .</u></i>                 | <u>ivi.</u> |
| <i><u>Della fasciatura per le malattie della verga ,</u></i>                         | <u>250.</u> |
| <i><u>Delle fasciature non usitate .</u></i>                                         | <u>ivi.</u> |
| <i><u>Del Descrimen pel salasso della fronte .</u></i>                               | <u>ivi.</u> |
| <i><u>Dello scafa pel medesimo salasso .</u></i>                                     | <u>ivi.</u> |
| <i><u>Dell' occhio doppio a due capi per le malattie degli occhi .</u></i>           | <u>251.</u> |
| <i><u>Del Fosso d' Amintas a due capi per le malattie del naso .</u></i>             | <u>ivi.</u> |
| <i>Della medesima fasciatura a un capo .</i>                                         | ivi.        |
| <i>Del Sospensorio delle mammelle a un capo .</i>                                    | 252.        |

*Del.*

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Della Cappellina per le fratture della clavicola.</i>                    | 253. |
| <i>Della Fromba per la Litotomia.</i>                                       | 254. |
| <i>Del Sospensorio dello scroto colla fascia.</i>                           | ivi. |
| <i>Nomi degli Autori citati nel Manuale d' Operazione di<br/>Chirurgia.</i> | 255. |

I L F I N E.

ER.

## ERRATA ITA CORRIGITO.

*Pag. lin.*

|      |     |                  |                 |
|------|-----|------------------|-----------------|
| 7.   | 28. | Beauliere        | Beaulieu        |
| 31.  | 31. | latus            | latus           |
| 64.  | 4.  | o portare        | e portare       |
| 75.  | 34. | <i>Ipre</i>      | <i>Ipre</i>     |
| 77.  | 38. | Tom. 1. art. vi. | Tom. vi. in 12. |
| 81.  | 17. | de la Fage       | de la Faye      |
| 84.  | 1.  | piegati          | pigiati         |
| 130. | 4.  | Comprimenti      | ontondenti      |
| 144. | 15. | è passata        | è posata        |
| 150. | 11. | fermava          | formava         |